HISTOIRE DE L'INOCULATION ET DE LA VACCINATION

SOUVENIR DU

CONGRÈS MÉDICAL INTERNATIONAL

LONDRES 1913

22101562171

WELLCOME
HIST. MED. MUSEUM

CE LIVRE
APPARTIENT A
PRIÈRE A CELUI QUI TROUVERAIT CE
LIVRE DE LE FAIRE PARVENIR LE PLUS
TÔT POSSIBLE A L'ADRESSE INDIQUÉE

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES
Table Alphabétique	5
Histoire de l'Inoculation et de la Vaccination	i
Idées et Achèvements	9
Cultures 'Wellcome' de Materia Medica	15
Notes Thérapeutiques	21
Maladies et Traitement	65
Tables Posologiques	111
Empoisonnements et Antidotes	116
Analyse d'Urines	119
Analyse d'Eaux	127
Colorants 'Soloid' pour la Microscopie	130
Équipements Médicaux Historiques	147
Équipements Médicaux Modernes	177
PRIX-COURANT	203
Boîtes et Trousses 'Tabloid' et 'Soloid'	205
Premiers-Secours 'Tabloid'	214
PRODUITS 'WELLCOME'	311

HYGIE

La Déité Grecque de la Santé

Hygie était considérée par les anciens comme la personnification de la santé morale et physique. Les Grecs croyaient en elle comme en la fille d'Asclépios (leur déité de la Médecine).

Elle fut toujours associée à d'autres dieux guérisseurs et surtout à Asclépios (Esculape), dans les Temples de la Guérison.

Hygie est représentée sur une foule de monuments figurés, sous les traits d'une jeune et belle femme empreinte de dignité et pleine de grâce. Elle est généralement debout, le buste ou l'un de ses bras enlacé par un serpent à qui elle offre la pâture sur une patère. Les serpents sacrés étaient confiés à sa garde et elle veillait sur eux avec tendresse et sollicitude, prenant le soin de les nourrir.

Hygie était considérée comme la " fille d'honneur " de la Médecine et elle était adorée dans les Asclépieion d'Argos, d'Athènes et de Corinthe. Elle était vénérée comme représentant l'incarnation féminine de tout ce qui est doux et qui peut calmer dans l'art de guérir.

Elle fut adorée par les Romains sous le nom de Salus et un temple fut érigé en son honneur sur le Mont Quirinal à Rome. Ici elle était représentée assise sur un trône, le front ceint d'une couronne d'herbes de la guérison et tenant dans la main un globe.

Vénérée comme le sauveur de l'Empire, elle figurait conséquemment en effigie sur les médailles romaines.

On exécutait dans son temple l'Augurium Salutis, une cérémonie ancienne ravivée par Auguste.

Au jour fixé pour le rite, les Romains suppliaient leurs dieux par divination afin de s'assurer si le peuple devait prier pour la paix. Dans ces occasions, il était défendu aux armées romaines de se mettre en marche ou de se battre.

Les prêtres du Temple d'Hygie possédaient le privilège absolu d'offrir des supplications pour la santé des individus aussi bien que pour le bien de l'État.

Hygie était quelquefois représentée par les Romains sous l'aspect d'une femme voilée, et les matrones romaines lui faisaient souvent l'offrande de leurs chevelures.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/b24862046

FSC (2)

Table Alphabétique

PAGES

'Alaxa,' Liqueur Aromatique de Cascara Sagrada 21, 203
Analyses, Boîtes et Trousses 'Soloid' pour ... 197, 213
Analyse des Eaux Potables 127, 261
Analyses d'Urines 119, 261
Antitoxine Diphthérique Concentrée 'Wellcome' 251
'Aol' 'Tabloid' 267
Bandage Ajustable 'Tabloid' pour la Tête 240
Bandes Hygiéniques 'Tabloid,' Pliées et Comprimées 23, 204
'Bivo,' Vin Ferrugineux à l'Extrait de Viande 205
Boîtes et Trousses 'Tabloid' et 'Soloid' 177, 205
'Borofax,' Onguent à l'Acide Borique 215
Cascara Sagrada 'Tabloid' 25, 272
Chloroforme 'Wellcome' 26, 315
'Coffee-Mint' 'Tabloid' 27, 273
Colorants 'Soloid' pour la Microscopie ... 27, 130, 262
Coton Plié et Comprimé 'Tabloid' 241
Crème 'Hazeline' 40, 223
Cultures 'Wellcome' de Materia Medica 15
Eaux et Effluences d'Égout, Examen des 129
Eaux, Produits 'Soloid' pour l'Analyse des ... 261, 262
Empoisonnements, Antidotes et Traitement 116
'Enulc,' Suppositoires Rectaux 28, 218
'Epicaine' 220
'Epinine' 29, 220, 275
Équipements Médicaux Historiques 147
Équipements Médicaux Modernes 177
'Ergamine' 34, 230
'Ernutin' 35, 220
Extrait de Malt 'Kepler' 37, 234
'Fairchild,' Produits Digestifs 221
Gaze au Bismuth 'Tabloid' 242
'Hazeline' et ses Préparations 40, 223
Huile de Foie de Morue avec Extrait de Malt 'Kepler' 42, 235
Hypodermiques, Appareils 225
Hypodermiques, Produits 'Tabloid' 43, 228
Indicateurs de Réactions Chimiques... ... ... 129, 262
Indice Opsonique, Détermination de l' 139
Inhalateur 'Vaporole' au Chlorhydrate d'Ammoniaque ... 310
Inoculation et de la Vaccination, Histoire de l' i
Jus Wyeth de Viande de Bœuf 310
'Kepler,' Produits de Malt 37, 42, 234
'Lodal' 46, 283
Maladies et leur Traitement, Index des 65

PAGES
'Mamos' 'Tabloid' 283
Menthol, Composé de, pour Priser (B. W. & Cie) 46, 236, 284
Milieux de Culture Bactériologique 137, 263
"Neige 'Hazeline'"... ... ... 41, 224, 237
'Nizin' 48, 237, 259
Notes Thérapeutiques 21
'Opa,' Dentifrice Liquide 237
Ophthalmiques, Produits 'Tabloid' et 'Soloid' 49, 237, 239
Pansements Pliés et Comprimés 'Tabloid' ... 49, 239
'Paroleine' 242
Pastilles 'Tabloid' 243
'Pepana' 51, 287
'Pepule,' Produits marque 222
Pharmacies Portatives 'Tabloid' 188, 210
'Phenofax,' Onguent à l'Acide Phénique 244
Photographie, Produits 'Tabloid' pour la 245
'Pinol' 250
Poids Atomiques et Symboles Chimiques 64
Prix-Courant des Produits fins de B. W. & Cie 203
Produits 'Soloid' 55, 254
Produits 'Tabloid' 58, 264
Produits 'Vaporole' 61, 308
Produits 'Wellcome'... 311
Quinine 'Tabloid' et 'Wellcome' 53, 291, 324
Révélateurs Photographiques 'Tabloid' 245
Sels d'Eaux Minérales 'Tabloid' 295
Sérums 'Wellcome' 251
'Soamin' 54, 254, 295
Soda-Mint 'Tabloid' 295
'Soloid,' Colorants pour la Microscopie ... 27, 130, 262
'Soloid,' Colorants pour la Photographie 248
'Soloid,' Produits pour Analyses, etc. 261
Suppositoires Rectaux 'Enule' 28, 218
Symboles Chimiques et Poids Atomiques 64
Table Obstétrique 145
Tables Posologiques 111, 114
'Tabloid,' Pastilles 243
'Tabloid,' Produits Hypodermiques 43, 228
'Tabloid,' Produits Ophthalmiques 49, 237
'Tabloid,' Produits Photographiques 245
Thé 'Tabloid' 301
Tuberculines 'Wellcome' 302
'Tyramine' 60, 233
Vaccins 'Wellcome' 305
'Valoid' et 'Valule,' Produits marque 307
'Vana,' Vin Tonique 61, 307
Vaporisateur 'Paroleine' 307
'Vaporole,' Produits marque 61, 308
'Wellcome,' Produits marque 311
'Xaxa' 'Tabloid' et 'Xaxaquin' 'Tabloid' ... 62, 63, 300

BURROUGHS WELLCOME & CIE

LONDRES (ANGLETERRE)

NEW-YORK MONTRÉAL SYDNEY CAPE TOWN MILAN
SHANGHAÏ BUENOS AIRES BOMBAY

Bureaux et Magasins Centraux—SNOW HILL BUILDINGS, E.C.
Salle d'Exposition à Londres—54, WIGMORE STREET, W.
Usines et Laboratoires—DARTFORD, près LONDRES

États-Unis de l'Amérique du Nord :
35, 37 & 39, West Thirty-third Street (near Fifth Avenue), NEW-YORK CITY

Canada :
101-109, Coristine Building, St. Nicholas & St. Paul Sts., MONTRÉAL
Australie—481, Kent Street, SYDNEY
Afrique du Sud—5, Loop Street, CAPE TOWN
Italie—26, Via Legnano, MILAN
Chine—44, Szechuen Road, SHANGHAÏ
République Argentine—Calle Piedras 334, BUENOS AIRES
India—Cook's Building, Hornby Road, BOMBAY

QUELQUES DÉPÔTS SPÉCIAUX À L'ÉTRANGER

AMSTERDAM—Kerkhoff & Co., Leidschestraat 77

BÂLE—Nadolny & Co., Spitalstrasse 9

BANGKOK—The British Dispensary

BARCELONE—Vicente Ferrer y Cia., Calle del Comercio 60-64 ;
Farmacia Escrivá, Fernando VII 7

BERLIN—Linkenheil & Co. Genthinerstrasse 19

BEYROUT—Gédéon Frères & Cie

BOMBAY—Thomson & Taylor

BRUXELLES—Ch. Delacre & Cie, Pharmacie Anglaise, 50-52, Rue Coudenberg

BUCAREST—Stéphane Zapissesco, Str. Frumoasa 24

CALCUTTA—Smith, Stanistreet & Co.

COLOMBO—Cargills, Ltd.

CONSTANTINOPLE—La Fontaine Brothers, Ltd., Stamboul

COPENHAGUE—Alfred Benzon ;
Gammeltorvs Apotek, Frederiksbergs 1

GENÈVE ET ZURICH—Uhlmann Eyraud, S.A.

GIBRALTAR—Dr. Patron's Pharmacy

KHARTOUM—G. N. Morhig, The English Pharmacy

LE CAIRE, ALEXANDRIE ET PORT SAÏD—E. Del Mar

LISBONNE—F. Freire d'Andrade e Irmão, Rua do Alecrim 123-127 ;
José Pereira Bastos e Ca., Rua de S. Julião 124

MADRID—Francisco Gayoso, Arenal 2 ;
Martín y Durán, Capellanes 10 ;
Pérez Martín y Cia., Alcalá 9

MARSEILLE—The Anglo-American Pharmacy (L. Perrand), Rue Cannebière 8 ;
Pharmacie Manuel, Cours Pierre Puget 25

MEXICO—Emilio Kentzler, Avenida de San Francisco 21

PARIS—Scott & Cie, 38, Rue du Mont Thabor

RANGOON—E. M. de Souza & Co.

RIO DE JANEIRO—King, Ferreira e Ca., Rua 1° de Março 19

SIMLA—F. Bliss & Co.

STOCKHOLM—Apoteket Vasens Droghandel

TAURIS—Ziegler & Co.

TÉHÉRAN—E. Bonati, Pharmacie Centrale

VALPARAISO—Daube y Cía.

VARSOVIE—R. Fürst & Co., Rue Kaliksta 22

VIENNE—M. Kris, Brandstätte 1

Londres—Téléphone : "CITY SIX THOUSAND" (8 fils)

Londres—Adresse pour Télégrammes et Radiotélégrammes :
"TABLOID, LONDON"

Codes Télégraphiques : ABC *et* LIEBER

Histoire de l'Inoculation et de la Vaccination

pour la

Prévention et le Traitement des Maladies

Table des Matières

Chapitre I — page

La Pratique de l'Inoculation dans l'Ancien Temps i

Chapitre II

De l'Inoculation de la Petite Vérole aux Dix-Septième et Dix-Huitième Siècles ... ix

Chapitre III

La Genèse de la Vaccination xiii

Chapitre IV

Découverte de la Vaccination xix

Chapitre V

Progrès des Principes de Vaccination et d'Inoculation xxxiii

Chapitre VI

De la Bactériologie et de son Influence en Médecine Préventive xlv

Chapitre VII

Développement Moderne de l'Inoculation et de la Sérothérapie xlix

EDWARD JENNER. M.D.

L'AUTEUR DE LA DÉCOUVERTE DE LA VACCINATION

Né en 1749 Mort en 1823



CHAPITRE I

LA PRATIQUE DE L'INOCULATION DANS L'ANCIEN TEMPS

LA pratique de l'inoculation pour la prévention des maladies remonte à l'antiquité. On se perd en conjectures sur l'époque de cette découverte, mais cela fait peu de doutes que, depuis les temps reculés, l'homme a reconnu que certaines maladies ne font apparition qu'une seule fois pendant le cours de la vie d'un individu, et qu'après sa guérison il était généralement immunisé contre les nouvelles attaques de la même maladie. L'homme a remarqué aussi très probablement que même les cas de forme bénigne conféraient souvent une certaine protection contre une attaque nouvelle du mal.

L'ancienneté de l'inoculation

Les premiers essais pour utiliser à bon escient cette action protective de la nature consistait, sans aucun doute, à exposer les enfants au mal, et notamment dans le cas d'une maladie telle que la rougeole sous forme légère, dans le but de les protéger dans l'avenir contre des cas plus sévères de la maladie—coutume qui était pratiquée d'ailleurs jusqu'à une époque relativement récente.

Ainsi, il est probable qu'une vague appréciation des principes d'immunisation existait à une époque très primitive. De cette connaissance il n'y avait qu'un pas restreint à la production artificielle de certaines maladies ; surtout lorsqu'il fut découvert, comme dans le cas particulier de la petite vérole, que cette maladie peut être produite sous une forme bénigne par l'inoculation du contenu

d'une pustule chez un sujet sain, et qu'une inoculation de ce genre était jusqu'à un certain point une sauvegarde contre la possibilité de contracter une attaque sérieuse de la maladie.

Selon les rapports enregistrés par les explorateurs, il appert qu'un genre d'inoculation a été pratiquée parmi les tribus sauvages et les peuples barbares des diverses parties du monde, et ce depuis une époque inconnue.

Quoiqu'il en soit, il est probable que la coutume prit naissance aux Indes et dans le Grand Orient et s'étendit de là ensuite à l'Ouest jusques vers l'Afrique et l'Europe.

L'inoculation contre l'empoisonnement par le venin des serpents

Le Colonel Serpa Pinto, le voyageur portugais, trouva que certaines races du nord-est de l'Afrique pratiquaient un genre d'inoculation contre les morsures de serpents venimeux. Il relate que le venin de serpents était mélangé avec certains sucs de végétaux, et que la pâte brune ainsi composée était frottée sur les incisions faites sur l'épiderme du bras. Bruce, dans son "Voyage aux Sources du Nil," 1790, relate qu'il trouva que l'inoculation comme préventif de la petite vérole avait été pratiquée en Nubie depuis un temps immémorial par les négresses, les femmes Arabes, Nubiennes, Shillooks et autres natifs des tribus. L'opération était dénommée par eux "*tishjerée*" et "*tidderé*," ou, comme parmi d'autres nations de l'Afrique, "acheter la petite vérole."

"Achats de petite vérole"

Bruce ajoutait que "personne n'était connu, soit à Sennaar ou en Abyssinie, ayant eu la petite vérole plus d'une fois."

L'inoculation contre la petite vérole et les maladies vénériennes

L'inoculation a titre de préventif de la petite vérole était connue des Ashantis, et Bowditch nous dit qu'une méthode d'inoculation a été connue et pratiquée parmi les tribus Maures et Arabes de l'Afrique du Nord depuis les temps anciens afin de les protéger contre la petite vérole. Felkin, dans ses "Voyages parmi les Baris de Lado," 1882, dit que "la petite vérole

est souvent à l'état endémique dans ces régions, ainsi que les maladies vénériennes. A un moment donné, ces fléaux étaient si intenses que l'inoculation fut pratiquée, et depuis elle est devenue de régle générale. On en fait l'application sur le côté gauche de la poitrine et les natifs disent qu'ils croient que la maladie sera conjurée avec le temps, tant de bien ayant résulté de cette pratique."

Dans d'autres parties de l'Afrique, également, les explorateurs ont enregistré que l'inoculation est connue et appliquée par les indigènes.

Épizootie du bétail

De Rochebrune relate que les Maures et les Pouls de la Sénégambie ont, depuis un laps de temps considérable, inoculés leurs bestiaux contre la pleuro-pneumonie. "La pointe d'un couteau ou poignard de forme primitive est plongé dans le poumon d'un animal qui est mort à la suite de la maladie ; et une incision suffisante est faite dans la région sus-nasale pour permettre au virus de pénétrer sous la peau de l'animal sain."

Il est dit qu'à Berne, Suisse, au dix-huitième siècle, un genre semblable d'inoculation fut appliqué contre la pleuro-pneumonie.

Méthode Boer

Selon Sternberg, les indigènes des bords du Zambèze faisaient avaler aux animaux atteints de pleuro-pneumonie une certaine quantité de liquide provenant de la cavité pleurale d'un animal récemment mort. Cependant, la méthode qui est employée d'une façon extensive est celle dite découverte par les Boers. Celle-ci consiste dans l'inoculation des animaux à la queue au moyen d'une seringue ou d'un fil tordu, et ce avec le sérum provenant des poumons d'un animal mort récemment, ou avec le virus obtenu à la suite de la tuméfaction produite par semblable inoculation à la queue.

Il résulte de l'évidence des faits recueillis de diverses parties du monde que la pratique de l'inoculation semble ressortir de la petite vérole, maladie dont l'histoire ancienne reste quelque peu obscure.

DESSINS FAISANT VOIR LES PUSTULES DE LA VACCINATION

D'après un ouvrage chinois sur la vaccination

Il est, par conséquent, intéressant de procéder brièvement à la récapitulation de ce qui est connu concernant son origine.

L'ancienneté de la maladie dans le Grand Orient paraît ne faire l'ombre d'aucun doute ; par contre, les rapports documentaires se référant à sa première apparition sont ténébreux et incertains. D'après la tradition, la petite vérole semble avoir pris naissance aux Indes, où l'inoculation, dit-on, a été pratiquée pendant plus de mille années avant l'ère chrétienne.

L'origine de la petite vérole et de l'inoculation

Dhanwantari, père Védique de la médecine, et médecin Hindou le plus anciennement connu, et que l'on suppose avoir vécu environ 1500 av. J.-C., a, dit-on, été le premier ayant pratiqué l'inoculation contre la petite vérole.

King repète ce qui suit et que l'on admet comme étant une traduction des écrits de Dhanwantari ; à savoir :

" Recueillir sur la pointe d'une lancette le fluide de la pustule, soit sur la tétine d'une vache, soit sur le bras d'un sujet humain (entre l'épaule et le coude), et donner des coups de lancette dans les bras, entre les épaules et les coudes jusqu'à ce que le sang fasse apparition ; puis, mélanger ce fluide au sang, alors la fièvre occasionnée par la petite vérole fera son apparition."

Bien qu'il ait été dit par certains que l'usage de l'inoculation fut importé des Indes environ 200 ans av. J.-C., on attribue souvent son lieu d'origine en Chine. Cependant, cette thèse est aujourd'hui combattue : un doute persiste, et on ne peut l'attribuer qu'à la difficulté que l'on éprouve à identifier l'idéogramme, ou caractère d'écriture chinois, exprimant le nom de la maladie.

Wylie, en 1631, nous dit : " Depuis le commencement de l'ère chrétienne, la petite vérole a attiré l'attention des Chinois ; l'inoculation a été pratiquée chez eux depuis mille ans ou plus." Cette déclaration est apparemment basée sur un traité chinois concernant les taches de la petite vérole et qu'on a supposé avoir été publié en 1323 et republié ensuite en 1542, mais il nous a été impossible de

L'inoculation en Chine

REPRÉSENTATION DRAMATIQUE RELIGIEUSE DE LA PUISSANCE DE LA DÉESSE HINDOUE, DE LA PETITE VÉROLE

D'après une gravure orientale ancienne

La déesse est debout. tenant en l'air deux poignards tordus avec lesquels elle tente de frapper à droite et à gauche. Devant elle se trouve une bande d'exécuteurs de sa vengeance. Deux d'entre eux sont affublés de masques rouges grimaçants. et munis de boucliers noirs. brandissant des cimeterres nus. Des lignes blanches comme des rayons émanent des corps des autres individus afin d'indiquer l'infection. Sur la gauche, un groupe d'hommes aux corps couverts de taches. souffrant de la maladie. Des clochettes sont suspendues à leurs ceintures et certains d'entre eux agitent des plumes noires. Ils sont précédés par des musiciens avec tambours. qui implorent la pitié de la déité furieuse. Derrière la déesse. sur la droite. s'avancent quelques jeunes femmes souriantes. portant sur leurs têtes, avec grâces. des paniers d'offrandes de remerciements. en gratitude. leur vie et leur beauté ayant été épargnées. Il y a. en outre. un garçonnet. muni d'une clochette à sa ceinture. qui a l'air de transmettre quelque chose du bras droit de la déesse. Il est possible que cette action soit emblématique à l'inoculation. Dans un pays où toutes les pensées, les paroles et les faits ne sont que la répétition de ceux des ancêtres. une composition de ce genre porte le sceau d'une grande antiquité.—(Moore.)

découvrir cet ouvrage afin de reconnaitre le bien fondé de cette assertion.

On dit qu'au Thibet, l'inoculation a été mise en pratique depuis des temps reculés, et voici d'ailleurs la méthode que l'on employait : on faisait tremper un faisceau d'aiguilles dans une solution formée d'eau, de virus de la petite vérole et de croûtes sèches, puis on piquait le bras avec les aiguilles en question.

Au Siam, on emploie une méthode d'inoculation ressemblant à celle pratiquée en Chine, d'où probablement elle fut tirée. On recueille le pus des pustules et on l'introduit dans les narines en l'insufflant ; on dit que cette opération protégeait l'individu ainsi inoculé contre l'attaque de cette maladie.

Première apparition de la petite vérole en Europe

C'est vers la fin du sixième siècle que remonte l'époque de la première apparition de la petite vérole en Europe. Elle a du se diriger vers l'ouest à travers l'Arabie, l'Éthiopie et les pays environnants et fut apportée en Égypte par les Arabes. Elle était évidemment inconnue des Grecs et des Romains, et, d'après les anciens historiens, les nations civilisées, engagées dans les guerres ou dans le commerce en pays étrangers, ne semblent pas avoir été atteints par cette maladie avant la fin du sixième siècle ou le commencement du septième.

Les récits précis les plus anciens concernant cette maladie nous viennent d'Arabie, et selon un manuscrit arabe, se trouvant actuellement dans la bibliothèque de Leyde, le premier témoignage de petite vérole date de l'année de la naissance de Mahomet, 572. Des extraits suivants, provenant de passages tirés de la Chronique de l'évêque Marius, qui mourut en 590, il est permis de supposer cependant que la petite vérole date d'une époque un peu plus ancienne que celle indiquée dans le manuscrit de Leyde.

"En 570 une grande épidémie contagieuse avec symptômes diarrhéiques et de vérole se propagea d'une manière étendue sur l'Italie et la France, et les bœufs dans les pays en question étaient . . . . ."

"En 571 une abominable maladie dénommée morve avec pustules a fait mourir un nombre considérable de personnes dans les pays mentionnés plus haut."

Un autre historien écrit que la petite vérole se répandit dans Alexandrie lors du saccagement de cette ville par les Arabes en l'an 640. De là, elle se propagea, par l'intermédiaire des pèlerins et du commerce, à travers l'Égypte, la Palestine, la Syrie et la Perse ; on dit même qu'elle se répandit le long des côtes de l'Afrique du Nord.

Au commencement du huitième siècle, la petite vérole était connue en Mauritanie, et de là, traversant la Méditerranée, passa en Italie. Ce fut aussi vers cette époque que les Arabes et les Maures, lorsqu'ils s'établirent à Cordove, l'introduisirent en Espagne. Par la suite elle passa en Portugal, en Navarre, en Languedoc et en Guyenne, d'où elle fut transportée dans les contrées de l'ouest et du nord de l'Europe.

Le plus ancien médecin qui fit une description de la petite vérole fut, sans contredit, Ahrun, Égyptien de naissance et prêtre chrétien, qui vivait à Alexandrie sous le règne d'Héraclius (610-641). Son ouvrage, dont l'original est écrit en grec, fut traduit en syriaque par Gosius vers 680 et en arabe par Maserjawaih vers l'an 683, avec addition de quelques observations relatives au traitement des maladies des yeux conjointement à la petite vérole.

Le premier traité complet sur la maladie fut écrit en syriaque par Rhases, vers 920. Cet ouvrage fut traduit par la suite et en grec et en latin. En syriaque la petite vérole était dénommée "chaspe," lequel mot fut traduit en grec Επφλογόιν.

Le traducteur latin le nomma d'abord "incendium." Le mot "variolæ" est un dérivatif du mot hébreu כדם, qui signifie tache ou point. De là, nous avons les mots latins "varus" ou "variolæ," italien "vajolo," français "vérole" et anglais "smallpox."

CHAPITRE II

De l'Inoculation de la Petite Vérole aux Dix-Septième et Dix-Huitième Siècles

La pratique de l'inoculation de la petite vérole, émanant d'Asie et d'Afrique, pénétra en Europe en passant par la Grèce et les côtes du Bosphore. Elle était connue à Constantinople à la fin du dix-septième siècle. Lorsqu'en 1701, une grave épidémie de ce mal éclata dans cette ville, Timoni et Pylarini, deux médecins, recommandèrent l'application de l'inoculation.

C'est à Constantinople que Timoni vit le premier l'inoculation pratiquée par deux femmes, et il décrit l'opération avec force détails.

Inoculation par les femmes à Constantinople

" Les Circassiens, Géorgiens et autres Asiatiques," dit-il, " ont introduits cette façon de communiquer la petite vérole pour une période de temps d'environ quarante années et ce par une sorte d'inoculation. Les symptômes éprouvés par ceux qui subissent l'inoculation sont si légers, que certaines personnes se sentent à peine indisposées ou souffrantes. On opère par la méthode suivante : Ayant fait choix d'un champ de contagion convenable, on doit communiquer le pus des pustules à la personne que l'on destine à prendre l'infection. De là ressort métaphoriquement le nom d'insertion ou inoculation.

" Dans ce but, des enfants ou jeunes gens sont choisis d'un tempérament sain et vigoureux et atteints de petite vérole commune (celle avec taches, pas du genre purulent) au douzième ou treizième jour de la déclaration de la maladie ; avec une aiguille, on pique les tubercules (principalement ceux qui se trouvent en avant du tibia et sur les mains) et on en exprime le pus qui sort et que l'on recueille dans quelque vase, verre ou autre récipient convenable. Une quantité suffisante de ce pus étant ainsi recueillie, il doit être bien conservé bouché et tenu au chaud sur la poitrine de la personne qui le porte, et

aussitôt que possible apporté à la demeure du prochain patient en expectative. Celui-ci étant donc dans une chambre chaude, l'opérateur doit lui faire plusieurs petites piqûres avec une aiguille dans un, deux ou plusieurs endroits de la peau, jusqu'à l'apparition de quelques gouttelettes de sang, et alors immédiatement on laisse tomber du verre quelques gouttes de pus que l'on mélange bien avec le sang qui s'échappe. Une goutte de pus est suffisante pour chaque endroit piqué. Ces ponctions sont faites indifféremment dans n'importe quelle partie charnue, mais réussissent mieux dans les muscles du bras ou radius. L'aiguille doit être une aiguille de chirurgien à trois tranchants. On peut procéder de même avec une lancette. La plaie est recouverte avec la moitié d'une coquille de noix ou un réceptacle concave de même forme et bandé ensuite pour que la matière ne puisse pas être enlevée lors du frottement des vêtements ; le tout est enlevé après quelques heures."

Description de leur méthode

Les Danois paraissent avoir pratiqué l'inoculation contre la petite vérole dès le dix-septième siècle, et, d'après Bartholin, écrivant à Copenhague en 1673, "la pratique était commune au Danemark." En 1758, deux maisons d'inoculation furent établies dans la capitale par le roi, et, en 1760, l'un des princes royaux était inoculé avec succès.

Au Danemark

Un chirurgien anglais, Kennedy, explique dans un essai écrit en 1715, la méthode de greffer la petite vérole selon la manière dont elle est pratiquée dans le Péloponèse, dénommé de nos jours la Morée. Il dit : "Au moment présent, elle est très employée en Turquie et en Perse, où on l'administre afin de prévenir ses plus funestes effets dès la connaissance de sa venue et aussi probablement pour éviter que le sujet soit inquiété une seconde fois par la maladie."

En 1726, le docteur Russell (un médecin résidant alors à Alep) a trouvé que la pratique de l'inoculation chez les Arabes remontait à une date ancienne ; les vieillards même, âgés de plus de soixante-dix

Connue des Arabes

ans, se souvenaient fort bien avoir entendu parler de cette coutume parmi leurs ancètres.

Dans l'ouest de l'Europe, d'après Schwenk, l'inoculation fut pratiquée à Meurs en France ainsi qu'à Clèves, et à une date aussi ancienne que celle de 1712. En 1707, Boyer rapporte qu'elle était pratiquée par les paysans de l'Auvergne et du Périgord. Une épidémie sérieuse et fatale de petite vérole, qui éclata à Paris en 1763, fut attribuée en partie à l'inoculation, et il en résulta que la pratique en fut interdite par le gouvernement. Mais cinq années plus tard, sur la recommendation des facultés de médecine, ce décret fut abrogé, et pendant la dernière partie du dix-huitième siècle, on vaccinait couramment à nouveau à Paris.

En Europe Occidental

En Allemagne, l'inoculation paraît avoir été introduite pour la première fois par Maitland, en 1724 ; sa pratique, cependant, fit peu de progrès jusqu'en 1768 ; c'est alors qu'après l'inoculation de quelques membres de la famille impériale, elle devint plus générale. A Berlin, elle tomba en défaveur à la suite de plusieurs décès de petite vérole qui lui furent attribués, et ce ne fut qu'à la fin du dix-huitième siècle que l'attention était appelée à nouveau sur ce sujet.

En Allemagne

D'après De la Condamine, l'inoculation était connue en Italie, et pratiquée secrètement par les Napolitains dès une époque reculée. Pendant la grande épidémie de petite vérole en 1754, la pratique en fut introduite à Rome par Peverini, mais il rencontra une forte opposition et ce ne fut que quelques années plus tard qu'elle devint courante en Italie.

En Italie

On dit que Tronchin a été le premier à introduire la pratique de l'inoculation en Hollande en 1758, en vaccinant un de ses fils ; pendant qu'en Suisse, en 1751, une dame habitant Lausanne inocula son propre enfant. Par la suite, son exemple fut rapidement imité par d'autres personnes.

Grâce à l'enthousiasme et à l'intérêt pris dans cette affaire par l'impératrice Catherine II., le docteur Dimsdale,

un praticien londonnien, qui était connu comme étant un spécialiste en inoculation, fut mandé en Russie pour en introduire la pratique dans ce pays. Il fut donc appelé à St.-Pétersbourg en 1768, et pratiqua d'abord l'opération sur deux garçons âgés d'environ quatorze ans. Le pus pour leur inoculation avait été pris sur un enfant de la classe pauvre dans les faubourgs de St.-Pétersbourg, qui, dit-on, "était bien couvert de taches d'une espèce particulière de petite vérole." Ces cas, ayant été traités avec satisfaction, l'impératrice elle-même prit la détermination de subir l'inoculation, et un enfant, sur qui la petite vérole venait de faire apparition, fut choisi et conduit au palais. L'opération eut lieu secrètement, et ne fut évidemment suivie d'aucun résultat fâcheux, puisque l'on dit que cette dame a participé avec son affabilité habituelle a tous les divertissements, sans montrer le moindre signe de malaise ou d'inquiétude, et qu'elle assista constamment à tous les dîners avec la noblesse et à la même table.

En Russie

A la fin du dix-huitième siècle, le taux moyen annuel des décès dans toute l'Europe était de 210 pour 1000. On peut se rendre compte du fait de l'énorme mortalité due à la petite vérole. Ce taux était même plus élevé pendant les épidémies, et en Russie, en une année, on ne compta pas moins de deux millions de personnes qui moururent de cette maladie.

Nous n'avons aucun témoignage digne de foi de la pratique qui eut lieu en Angleterre avant 1717, date de son introduction dans ce pays par Lady Mary Wortley Montagu, femme de l'Ambassadeur d'Angleterre près la Cour Ottomane. En 1713, Timoni et Pylarini avaient bien publié, dans les *Transactions of the Royal Society*, un rapport sur la pratique en Turquie, mais on y attacha que peu d'intérêt. Ce ne fut qu'à la suite des efforts persistants et de l'enthousiasme de Lady Mary—qui, pour prouver l'efficacité du traitement, fit inoculer son fils—que l'attention fut à nouveau attirée sérieusement sur ce sujet en Angleterre.

CHAPITRE III

La Genèse de la Vaccination

En étudiant l'histoire de la médecine, on ne peut s'empêcher de noter combien nous devons aux anciennes coutumes, et combien de soi-disant découvertes modernes ne sont que des pratiques de la plus ancienne antiquité.

Ainsi, ce fut des vieilles traditions de vachers et de laitières ignorants que fut dégagée la théorie de la vaccine de l'être humain avec le cowpox comme préventif de la petite vérole. Depuis une époque inconnue, les garçons de ferme, qui avaient eu la garde du bétail, connaissaient une maladie parmi les vaches qui était appelée "cowpox," et ils savaient qu'ils étaient exposés à contracter le mal de l'animal, spécialement en le trayant. Il avait été noté de plus, que celui qui avait eu le cowpox était insensible à la petite vérole redoutée, qui était si répandue en Angleterre il y a un siècle ou plus.

Tradition de vachers

Le premier témoignage de la mise en pratique de la tradition est rapporté dans les mémoires de Monsieur Nash, un praticien médical, qui mourut en 1785, et dans lesquels on trouve les observations suivantes :

"Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un, ayant déjà eu le cowpox, ait eu la petite vérole. Le cowpox empêche certainement une personne d'avoir la petite vérole. J'ai inoculé maintenant près de soixante personnes qui, on m'avait dit, avaient eus le cowpox, et je crois que quarante au moins ne pouvaient pas être infectées par le virus variolique. Je pense qu'il est très raisonnable de présumer que les autres vingt, ou à peu près ce nombre (comme ils ne s'y connaissaient pas), n'avaient pas le véritable cowpox. Ce n'est pas seulement mon opinion personnelle, mais celle de plusieurs autres hommes de l'art, qui me persuade que le cowpox est un agent prophylactique de la petite vérole. Mon but principal, en

Premier usage pratique de la tradition

publiant ceci, est de recommander au monde une méthode d'inoculation qui est, à mon opinion (et je juge cela par expérience), supérieure de beaucoup à n'importe laquelle cependant connue. Par conséquent, j'espère et j'ai confiance, quoique je n'aie pas d'ami médecin pour l'appuyer dans le monde, que l'on fera assez de crédit à mes assertions pour en faire l'expérience, et alors elle se présentera suffisamment d'elle-même."

Un autre observateur connaissant bien le cowpox fut Rolph, qui pratiqua vers cette époque pendant neuf ans dans le comté de Gloucester. Il avait remarqué que, sur cent cas dont il avait été témoin, pas un seul ne se montra soit dangereux ou fatal.

Expériences de Rolph

Downe aussi rapporte que l'inoculation du cowpox était pratiquée dans plusieurs cas avec succès d'aussi bonne heure qu'en 1771, et il relate le cas d'un boucher, près de Bridport, inoculé avec du pus de cowpox et qui venait constamment en contact avec des personnes atteintes de petite vérole, mais ne contracta jamais le mal.

Cependant, un des incidents les plus intéressants est celui de Benjamin Jesty, un fermier vivant à Yetminster, dans le comté de Dorset. Dans l'année 1774, il inocula sa femme et trois de ses enfants avec du pus de cowpox. Madame Jesty fut inoculée au bras au-dessous du coude, et ses fils au-dessus du coude, l'incision étant faite avec une aiguille tranchante et le virus pris sur place sur la vache d'un fermier de Chittenhall, où Jesty avait amené sa famille. La maladie chez les fils se développa d'une manière favorable, mais le bras de Madame Jesty devint très enflammé.

Un fermier inocule le cowpox à sa famille

La témérité et la nouveauté de l'expérience de Jesty causa, quand elle fut connue, un grand intérêt et fit tout à fait sensation dans le voisinage.

D'après sa propre histoire, qu'il communiqua au Révérend Dr. Bell, de Swanage, on pourra mieux comprendre les causes qui amenèrent le fermier à l'idée de l'inoculation avec la matière du cowpox.

"Lorsque la petite vérole sévissait dans le voisinage, et que l'inoculation fut introduite dans le village (Yetminster), Jesty, alarmé pour la sûreté de sa famille, se rappela du moyen suivant. Il y avait eu dans sa famille deux servantes qui, après avoir pris le mal par des vaches, et sachant que ceci était un préventif de la petite vérole, avaient soigné, l'une son frère, l'autre son neveu, de la petite vérole naturelle, sans contracter l'infection. Cette circonstance amena Mr. Jesty à communiquer par inoculation le mal des vaches à sa famille. Dans ce but, il l'emmena dans le champ d'une ferme avoisinante, et, comme il a été relaté, fit l'opération sur place."

Plus de trente ans après, ce rapport, dûment certifié, était envoyé à la Société Jenner, à Londres, par le Docteur Bell, et il était accepté comme témoignage satisfaisant de la découverte de Jesty. La société l'invita à faire une visite à la métropole, dans le but de faire peindre son portrait, comme le premier inoculateur de cowpox. Le brave fermier accepta l'invitation et, accompagné de son fils Robert, qu'il avait inoculé en 1774, il alla à Londres. Suivant un compte-rendu de la visite, écrit à l'époque, le couple "reçut de grandes prévenances de la part des membres de la société, qui s'amusèrent beaucoup de l'apparence et des manières de Jesty. Avant de quitter sa maison à la campagne, sa famille avait essayé, mais sans succès, à le persuader de s'habiller plus élégamment pour sa visite à la ville. . . . Aussi, il apparût devant la Société Jenner dans ses habits de fermier, qui sont décrits comme étant particulièrement de l'ancienne mode. Afin de prouver leur déclaration, Robert Jesty consentit volontiers à être inoculé de la petite vérole, et son père du cowpox, mais aucune inoculation ne produisit d'effet."

Jesty fut alors invité à poser pour son portrait devant Mr. Sharpe, artiste peintre, et quand le tableau fut achevé, il lui fut offert en même temps qu'une paire de très jolies lancettes montées en or, et les membres de la Société Jenner signèrent le rapport suivant, qui accompagnait le présent.

BENJAMIN JESTY

D'après l'original (peinture à l'huile)

"Mr. Benjamin Jesty, fermier à Downshay, dans l'île de Purbeck, ayant visité le premier Institut de Vaccine Variolique, Broad Street, Golden Square, Londres, en août 1805, nous pensons qu'il est juste pour lui, et profitable pour le public, d'attester que, parmi d'autres faits, il a donné l'évidence décisive d'avoir vacciné, dans l'année 1774, sa femme et ses deux fils, Robert et Benjamin, qui furent par cela rendu non susceptible de contracter la petite vérole, comme il apparaît du fait que toutes les parties ont été fréquemment exposés à ce mal pendant trente-et-un ans."

Ainsi, il établissait d'une manière satisfaisante la prétention d'être le premier inoculateur du cowpox. Il mourut en 1816, fut enterré dans le cimetière de Worth Matravers, près Swanage, et son tombeau porte l'inscription suivante :

Consacré
à la Mémoire
de
BENJN JESTY (de DOWNSHAY)
décédé
le 16 avril 1816
à l'âge de 79 ans

Il naquit à Yetminster, dans ce comté, fut un honnête homme au cœur droit, célèbre particulièrement pour avoir été la première personne (connue) qui fit connaître l'inoculation du cowpox, et qui, par sa grande force de caractère, en fit l'expérience, sur sa femme et ses deux fils, dans l'année 1774.

CHANTRY COTTAGE, BERKELEY, ANGLETERRE

CHAPITRE IV

DÉCOUVERTE DE LA VACCINATION

La fin du dix-huitième siècle vit naître une ère nouvelle en médecine préventive, par la découverte et la confirmation de la valeur de la vaccination par Edward Jenner, dont on se souviendra toujours du nom comme celui du triomphateur de la petite vérole, qui, avant son époque, avait ravagé le monde pendant des siècles.

Il naquit en l'an 1749 à Berkeley, dans le comté de Gloucester, et il était le troisième enfant du Révérend Stephen Jenner, curé de l'endroit. A l'âge de treize ans, son père le mit en apprentissage chez Messieurs Ludlow, chirurgiens, à Sodbury, près de Bristol, chez qui il resta pendant six années. Ce fut durant cette période d'apprentissage qu'une jeune paysanne vint solliciter une consultation médicale et, comme la petite vérole était le sujet de conversation, elle s'écria, "Je ne peux pas la contracter, car j'ai eu le cowpox." Sa réponse sembla avoir fait une profonde impression sur Jenner et évidemment il ne l'oublia jamais, car ce fut le point de départ d'une nouvelle voie de recherches.

Élève de John Hunter

Lorsqu'il attint sa majorité, il vint à Londres et entra comme interne chez le fameux John Hunter. On dit qu'il discuta souvent avec le grand anatomiste au sujet de la petite vérole, et dans une occasion, alors qu'il relatait ses espérances et ses craintes sur la possibilité de substituer la vaccination à l'inoculation, le grand chirurgien lui fit cette réponse caractéristique : "Ne pensez pas, Jenner, mais essayez."

Dans la suite, las de l'existence citadine, il résolut de retourner dans son village natal, où il s'y établit comme médecin.

En l'an 1780, il décida d'entreprendre l'étude du cowpox, et il exposa d'abord ses futures espérances concernant le grand objet de ses recherches à son ami Edward Gardner.

Jenner se confie à son ami Gardner

Après avoir décrit l'histoire naturelle du cowpox, Jenner s'arrêta à cette variété qui protège de la petite vérole, et avec une profonde et anxieuse émotion, il parla de l'espérance qu'il avait de pouvoir transférer cette variété d'un être humain à un autre, jusqu'à ce qu'il en ait propagé la pratique dans le monde entier pour l'anéantissement définitif du redoutable fléau, et, s'adressant à son ami, il lui dit en concluant : " Je vous ai confié un sujet des plus importants, Gardner, et qui sera, je le crois fermement, d'une utilité essentielle à la race humaine. Je vous connais et je ne voudrais pas que dans une conversation il soit parlé de ce que je viens de vous exposer, car si, dans le cours de mes expériences, quelque chose de fâcheux advenait, je serais, pour mes confrères médicaux en particulier, sujet à ridicule et le point de mire de toutes leurs attaques."

Il s'assura que jusqu'ici on avait confondu, sous le nom de cowpox, deux formes de maladie, dont une seule protégeait de la petite vérole. Il jugea que l'échec de bien des cas devait être expliqué de cette manière. Ensuite, il vérifia le vrai cowpox lui-même et s'assura qu'il ne protégeait que lorsqu'il était communiqué à une période déterminée de la maladie.

Dans cette partie du comté de Gloucester, cependant, il n'y avait à ce moment que peu d'occasions d'étudier le cowpox, en raison de ce que les cas qui avaient été constatés étaient rares et il n'y avait aucune chance d'inoculer le mal, de ce fait de mettre ses théories à l'épreuve ; mais il n'en continua pas moins ses recherches avec persévérance. Pendant qu'il délibérait sur le sujet de l'inoculation de la vaccine, il fit quelques expériences avec la varicelle, qui était, croyait-il, d'origine similaire à la variole commune. En novembre 1789, il inocula son

fils, Edward, qui avait alors environ dix-huit mois, avec du pus de varicelle qu'il avait recueilli. C'est avec grand intérêt et la plus grande anxiété qu'il attendit le résultat, et nota que la marche de la maladie paraissait semblable à celle émanant à la suite de la transmission de la petite vérole véritable lorsque l'attaque était légère. Comme, apparemment, rien de fâcheux n'en résulta pour l'enfant, il l'inocula à nouveau le 7 Avril 1791, et, quoiqu'apparut une vésicule et qu'il se présentait de l'érysipèle, le tout disparut rapidement, et pendant tout ce laps de temps l'enfant ne montra aucun signe de malaise.

En 1796, le cowpox se déclara dans une ferme près de Berkeley, et une laitière nommée Sarah Neames contracta le mal. Jenner saisit l'occasion de mettre ses théories à l'épreuve d'une façon pratique, et le 14 mai il prit un peu de pus d'une plaie de la main de la jeune fille, et l'introduisit, au moyen d'incisions superficielles, dans le bras de James Phipps, un garçon bien portant, âgé de huit ans. L'inoculation réussit, et le résultat fut décrit comme étant semblable à celui produit par l'inoculation avec pus variolique. Le tout disparut, laissant des croûtes et des escarres subséquentes. Lorsque ce fut écoulée une période de six semaines, Jenner se détermina à essayer l'effet d'inoculation variolique sur le garçon et il l'inocula avec de la lymphe variolique et fut ravi de constater qu'aucun signe de petite vérole ne s'ensuivit.

Il communiqua ces résultats à Gardner dans la lettre suivante :

Mon cher Gardner,

Comme je vous avais promis de vous faire part de mes progrès dans mon enquête sur la nature de ce singulier mal, le cowpox, et étant parfaitement convaincu que vous vous intéressez à son succès, vous serez heureux d'apprendre que j'ai enfin réalisé ce que j'attendais depuis si longtemps — la transmission du virus de la vaccine d'un être humain à un autre par le moyen ordinaire d'inoculation. Un garçon du nom de Phipps fut inoculé au bras avec une pustule de la

main d'une jeune femme qui avait été infectée par les vaches de son maître. N'ayant jamais vu le mal avant, si ce n'est dans sa voie accidentelle, c'est-à-dire, lorsqu'il est communiqué par la vache à la main du laitier, j'ai été étonné de la ressemblance frappante entre ces pustules et celles varioliques à certaines périodes. Mais écoutez maintenant la partie la plus belle de mon histoire : le garçon a été inoculé depuis, contre la petite vérole, et celle-ci, comme j'avais osé le prédire, ne produisit aucun effet. Et maintenant, je continuerai mes expériences avec une ardeur redoublée.

Croyez-moi, cher ami, votre très sincère

EDWARD JENNER.

BERKELEY, 19 juillet 1796.

Pour confirmer ses expériences, et s'assurer de sa découverte, il résolut de répéter ses expériences avant d'exposer les faits devant le public. Mais, la disparition du cowpox dans les laiteries le retarda encore et, en attendant, il resolut de préparer un mémoire sur le sujet pour l'envoyer à la Société Royale.

Jenner publie son mémoire

Au commencement de l'année 1797, une occasion se présenta à nouveau, et il inocula trois autres personnes avec succès. Alors il acheva son mémoire et le révisa pour sa publication.

Il envoya d'abord le manuscrit à la Société Royale, mais celle-ci pensa probablement que l'évidence n'était pas assez forte pour en autoriser la publication dans ses *Transactions*. Jenner, sans être découragé, resolut de publier lui-même le mémoire, et c'est approximativement vers la fin de juin 1798 qu'il était imprimé, avec quelques additions et sous la forme d'un pamphlet intitulé :

"Enquête sur les Causes et Effets de la Vaccine de la Variole, une Maladie qui fut découverte dans certains Comtés de l'Ouest de l'Angleterre, particulièrement dans celui de Gloucester, et connu sous le nom de Cowpox."

Un médecin et savant bien connu de l'époque, Ingenhousz, fut le premier critique de la découverte de Jenner. Il combattit la théorie du cowpox, et cita

certains cas où la petite vérole avait été contractée après inoculation avec le cowpox. Les principaux savants et médecins de Londres reprirent ensuite le sujet, et plusieurs mirent en doute l'exactitude des observations de Jenner, et stigmatisèrent ses doctrines comme conjecturales et ridicules.

Les critiques de Jenner

D'autres, tels que Pearson et Woodville, quoique adoptant les idées de Jenner, essayèrent de les exploiter d'après leur propre méthode, qui d'ailleurs ne réussit pas. Leurs expériences furent suivies d'un nombre de résultats sérieux, et arrêtèrent pour un moment la marche des travaux de Jenner.

Les deux médecins occupaient une situation importante, étant médecins à l'Hôpital de Petite Vérole à Londres, et on relate que les expériences qu'ils commencèrent à pratiquer avec la vaccination furent executées si négligemment qu'elles n'étaient pratiquement d'aucune utilité. On dit de plus que le vaccin qu'ils employaient disséminait véritablement le mal qu'ils désiraient prévenir.

Entendant parler de ceci, Jenner, dans le début de l'année 1799, se décida à venir à Londres et se mit aussitôt au travail pour empêcher que sa découverte ne soit anéantie et pour exposer les erreurs qui avaient été commises par ses imitateurs. Il réunit autour de lui une bonne troupe de partisans enthousiastes, et ils se mirent à l'œuvre pour déjouer le mal fait à sa cause par ses imitateurs.

Jenner vient à Londres

On donna, en France, en premier le nom de "vaccination" à la méthode d'inoculation de Jenner, la dite méthode étant basée presque exactement sur les plus anciennes pratiques d'inoculation. En 1799, Woodville entreprit une méthode de vaccination faite successivement de bras à bras, de telle sorte que le pus pouvait être passé d'une personne à une autre avec le même résultat. Cette méthode ayant réussi, la pratique en fut communément adoptée.

Pendant ce temps, Pearson décida de fonder une institution à lui pour l'inoculation du cowpox et nomma un conseil de vaccine dont lui-même fut le directeur, et le Duc d'York consentit à en être le protecteur. Il écrivit à Jenner, lui offrant de le nommer "Médecin Correspondant Extraordinaire"; mais Jenner, jugeant que dans l'affaire on n'avait pas eu pour lui de considération suffisante, déclina l'offre. Jenner, peu de temps après, publia un pamphlet pour répondre aux critiques de ses adversaires, intitulé: "Suite des Faits et Observations relatifs à la Vaccine de la Variole."

Jenner présenté à la famille royale

Bientôt après sa publication, il retourna à Londres, où il eut une entrevue avec Lord Egmont et le Duc de Clarence, et éventuellement soumit un projet pour l'établissement d'une institution publique pour l'inoculation de la vaccine. Il réussit finalement à amener le Duc de Clarence et Lord Egmont à se retirer de l'institution projetée de Pearson, et fut présenté par Lord Berkeley au Roi, à la Reine et au Prince de Galles, dont les encouragements lui donnèrent un espoir nouveau et aida matériellement au développement de la propagande de la vaccination dans tout le pays.

La vaccination en Europe

La vaccination fut démontrée à Vienne par De Carro en 1799 et, une fois que son importance fut réalisée, elle était adoptée avec enthousiasme en Suisse, en France, en Italie et en Espagne. Dans l'Amérique du Sud, en Sicile et à Naples, où la petite vérole était répandue, la vaccination fut reçue avec le plus grand enthousiasme; des processions religieuses furent organisées dans le but de recevoir la "vaccine bénite." En Italie, la découverte de Jenner fut heureusement exploitée par Sacco, de Milan, en 1801. Il travailla avec une activité infatigable et en quelques années il avait vacciné 20 000 personnes.

En France, Valentin et Desoteux furent les premiers à attirer l'attention sur le sujet, et la pratique devint bientôt populaire. Liancourt établit par souscription un

Institut de Vaccine, obtenant un grand appui financier de Lucien Bonaparte, qui était alors Secrétaire de l'Intérieur.

En janvier 1800, le traité de Jenner fut traduit en français par le Comte de la Roque, et cinq ans plus tard, Napoléon prouva sa confiance dans les théories de Jenner en ordonnant que tous les soldats qui n'avaient pas été atteints de petite vérole soient vaccinés.

Vaccination des soldats de Napoléon

Parmi les partisans les plus enthousiastes de la découverte de Jenner se trouvait l'Impératrice de Russie, qui engagea ses sujets à se faire vacciner, ordonnant que le premier enfant qui serait soumis à l'opération recevrait le nom de "Vaccinoff," et qu'il serait éduqué aux frais de l'État. Par la suite, l'Impératrice, en commémoration, offrit à Jenner une bague en diamant de grande valeur.

Intérêt de l'Impératrice de Russie

Pendant ce temps, l'influence et la popularité de Jenner augmentaient. A sa demande, l'Empereur d'Autriche et le Roi d'Espagne mirent en liberté des Anglais qui avaient été faits prisonniers pendant les guerres. A la requête d'un ami du Docteur Wickham, qui était prisonnier en France, Jenner présenta une pétition à Napoléon, sollicitant la libération du médecin. Il entreprit cette tâche sans hésiter, au moment où Napoléon montrait la plus grande animosité envers l'Angleterre. La supplique parvint à l'Empereur sans accident, et il se trouva qu'elle lui fut remise à un moment où, assis dans son carrosse avec l'Impératrice Joséphine, ils attendaient que les chevaux soient changés. Jetant un coup d'œil dessus, il cria au cocher, "En route : partez !" Mais l'Impératrice, examinant la lettre, dit : "Attendez donc : vous voyez bien que ceci vient de Jenner." Les manières de Napoléon changèrent immédiatement, et il répondit : "On ne peut refuser ce que cet homme demande," et c'est ainsi que Wickham

Libération de prisonniers de guerre

DEUX SCARIFICATEURS EN IVOIRE ET SEPT LANCETTES
Employés par le Docteur Jenner lors de ses premières expériences

fut relaché. De temps en temps, Napoléon, à la requête de Jenner, libéra plusieurs autres prisonniers et même des familles entières. Telle était l'estime dans laquelle Napoléon le tenait.

Pendant les années passées en recherches et en investigations, Jenner avait dépensé une somme considérable d'argent, espérant que cette découverte pourrait éventuellement le dédommager, et devenir un succès financier. Ses amis, apprenant ceci, conseillèrent de demander une donation au Parlement.

Donation du Parlement à Jenner

La pétition fut soumise à la Chambre en mars 1802, basée sur les motifs suivants : Premièrement, lui, Jenner, avait découvert que le cowpox était inoculable de la vache à l'homme ; deuxièmement, que les personnes ainsi inoculées étaient, pour la vie, parfaitement protégées contre la petite vérole. Il ajouta qu'il n'avait pas tenu sa découverte secrète, que les progrès de la petite vérole avaient déjà été arrêtés, et qu'il eut beaucoup de préoccupations et fut amené à faire beaucoup de dépenses. L'affaire fut renvoyée à une commission, et en juin 1802, le rapport était soumis à la Chambre, qui finalement accorda 250 000 francs à Jenner. Il quitta alors Londres pour retourner à Berkeley.

Société Royale Jenner

Peu de temps après, quelques-uns de ses principaux partisans à Londres entreprirent de nouveau le projet de former un Institut Jenner pour encourager l'inoculation universelle de la vaccine. La Reine en devint la Protectrice, le Roi accordant la permission à la Société d'être appelée : "Société Royale Jenner pour l'Extinction de la Petite Vérole," et l'on nomma un bureau de directeurs influents et un conseil médical. Jenner en fut le président et le Docteur John Walker nommé vaccinateur résident. Treize maisons furent ouvertes à Londres, et en dix-huit mois on annonça que 12 288 inoculations avaient été faites et que 19 352 charges de virus du cowpox avaient été fournies dans diverses parties

de l'Empire Britannique et des pays étrangers. Mais, bien que l'Institut eût un bon début, en moins de six ans son succès déclina. Jenner ne s'accorda pas avec le chef vaccinateur, qui se démit de ses fonctions, et en 1808, la société tomba praticalement. Pendant ce temps, Jenner avait décidé de prendre un cabinet à Londres, et s'établit, pour quelques années, dans Hertford Street, Mayfair. Mais les résultats furent loin d'être satisfaisants, et après un essai il retourna à son village natal.

Critiques et caricatures

En dépit du succès et de l'appui que la vaccination recevait maintenant dans toutes les parties du monde, des pamphlets, des satires et des caricatures étaient constamment publiés par les adversaires de la vaccination. Il fut allégué réellement par certains que ceux qui étaient inoculés avec le cowpox prenaient les traits caractéristiques de la race bovine elle-même. Le Docteur Rowley écrivit un long traité intitulé: "L'Inoculation du Cowpox n'est d'aucune Sécurité contre la Petite Vérole, suivi des Modes de Traitement des Nouvelles Maladies d'Animaux occasionnées par le Cowpox." L'ouvrage était illustré avec une gravure représentant un "garçon inoculé ayant une figure de bœuf." "Diverses maladies des bêtes," affirme l'écrivain, "communes au bétail, ont fait apparition dans l'espèce humaine depuis l'introduction du cowpox, tels que gale du cowpox, abcès, ulcères, gangrènes du cowpox et gonflements de la figure monstrueux et hideux, donnant l'apparence d'une tête de bœuf, avec les yeux décomposés et les paupières chassées de leur position normale. La petite vérole nous a été donnée par Dieu, mais le cowpox est une invention de l'homme présomptueux ; la première était ce que le Ciel avait ordonné, l'autre est peut-être une violation hardie de notre sainte religion."

Sur le même sujet, un autre écrivain raconte l'histoire d'une dame se plaignant que : "depuis que sa fille avait été inoculée, elle toussait comme une vache, et son corps s'était recouvert de poils."

Un autre adversaire de la vaccination déclara que ceux qui avaient été inoculés "mugissaient comme des taureaux."

D'autres la stigmatisèrent comme "la chose la plus digne de réprobation qu'on ait jamais proposée," et "la plus dégradante rechute de philosophie ayant à jamais déshonorée le monde civilisé."

Mais, malgré ces fulminations, la vaccination fit de constants progrès, et tous les pays luttaient à qui honorerait l'auteur de cette découverte.

Honneurs pour Jenner

Jenner fut nommé membre de presque toutes les principales sociétés scientifiques d'Europe. Les cités de Londres, Dublin, Édimbourg et Glasgow lui accordèrent le droit de cité, et à l'occasion de sa fête annuelle, où le Docteur Lettsom prononça un discours sur la vaccination, la Société Médicale de Londres lui décerna une médaille d'or. En 1812, l'anniversaire de l'inoculation du cowpox fut célébré à Berlin par une fête en l'honneur de Jenner, et des adresses et diplômes pour l'auteur de la découverte arrivèrent en masse de toutes les parties du monde. L'adresse suivante, rédigée bizarrement, lui fut envoyée par les Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord :

"Frère ! Notre Père nous a remis le livre que vous avez envoyé pour nous apprendre à nous servir de la découverte que le Grand-Esprit vous a révélée, et par laquelle la petite vérole, ce mortel ennemi de notre tribu, peut être chassé de la terre. Nous avons déposé votre livre entre les mains d'un homme de talent que notre grand chef emploie pour nous soigner quand nous sommes malades ou blessés. Nous ne manquerons pas d'instruire nos enfants à prononcer le nom de Jenner et à remercier le Grand-Esprit pour lui avoir accordé tant de sagesse et tant de bienfaisance. En acceptant votre don si précieux, en témoignage reconnaissant nous vous envoyons avec la présente une ceinture et un fil de coquillages. Nous implorons le Grand-Esprit de veiller sur vous dans ce monde et dans le pays des esprits."

ILLUSTRATION ORIGINALE PRISE DANS L'OUVRAGE, "ENQUÊTE," DE JENNER

Représentant les pustules du cowpox et de la petite vérole au troisièm jour de l'éruption.

En juillet 1806, le sujet de la vaccination étant amené de nouveau à la Chambre des Communes, on se demanda si une récompense suffisante avait été donnée au premier auteur de la découverte de l'inoculation de la vaccine, et il fut décidé d'un commun accord d'offrir à Jenner un autre don de 500 000 francs.

Un don de 500000 francs

Ayant décidé de soutenir la vaccination, le Gouvernement se vit obligé de fonder un établissement pour continuer le travail de l'Institut Royal Jenner, et on demanda à Jenner de dresser un plan et de préparer une estimation des frais. La maladie de son fils nécessita son retour à Berkeley, mais, pendant son absence, l'autorisation pour fonder un établissement national de vaccine fut obtenu, et Jenner en fut nommé le directeur.

En 1814, à l'occasion de la visite à Londres des souverains alliés et de l'Empereur de Russie, il fut présenté à ces personnages. La Grande-Duchesse d'Oldenbourg, la sœur de l'Empereur, désirait beaucoup qu'il fut présenté à Jenner, et une entrevue eut lieu. Alexandre s'entretint avec lui des effets étonnants de la vaccination en Russie, laquelle il déclara "a presque subjugué la petite vérole dans tout ce pays." Jenner répondit qu'il était très heureux d'apprendre de sa majesté un fait aussi important. Le médecin fit alors cadeau au monarque d'un volume de ses travaux personnels, lequel fut gracieusement accepté. Un peu plus tard, il eut une audience avec le Roi de Prusse, qui lui fit une invitation pressante de visiter Berlin.

Dernière visite de Jenner à Londres

Dans l'année suivante, après une longue maladie il perdit sa femme, et, accablé de chagrin, il se retira à Berkeley, qu'il ne quitta plus, sauf pour un jour ou deux, jusqu'à sa mort.

Le 23 janvier 1823, il écrivit dans sa dernière lettre à son ami Gardner : "J'ai reçu une attaque d'un côté auquel je ne m'attendais pas, et ce de l'*Edinburgh Review*. Ces gens s'entendent mieux à la littérature qu'à la médecine,

mais cela fera un tort incalculable. Je l'évalue à au moins 100 000 morts. Jamais je n'ai été plongé dans tant de perplexités."

Le jour suivant, il alla se coucher, apparemment en bonne santé comme d'habitude, et le lendemain matin se leva et descendit à sa bibliothèque, où il fut frappé d'une attaque d'apoplexie avec paralysie du côté droit. Il mourut le lendemain, 26 janvier 1823, sans avoir repris connaissance.

Mort de Jenner

En jugeant l'œuvre importante de Jenner, on devra se souvenir que sa découverte ne fut pas tant le fait de permettre aux personnes infectées par le cowpox d'échapper à la variole, mais le fait de pouvoir mettre un individu à l'abri de la petite vérole au moyen du pus pris sur un être humain souffrant du cowpox.

Les vies qui ont été sauvées au moyen de cette découverte sont le tribut le plus éloquent que l'on puisse faire à sa mémoire, et les principes qu'il défendit et mit en pratique restent encore les seuls moyens utiles de protection contre l'un des plus mortels fléaux qui affligent l'humanité.

On a très bien dit que les brillantes découvertes qui ont été faites depuis, dans le champ de l'inoculation protectrice, ont ajouté un éclat à sa gloire, et on se souviendra toujours de son nom comme étant l'un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité.

CHAPITRE V

Progrès des Principes de Vaccination et d'Inoculation

Beaucoup d'années s'écoulèrent avant que les principes de vaccination de Jenner fussent appliqués à d'autres maladies. Ceci débuta par l'étude des fermentations, la base et le développement de la bactériologie.

En 1838, De la Fonde, professeur à l'École Vétérinaire d'Alfort, montra à ses élèves des "petits bâtonnets," comme il les appela, qu'il avait trouvé dans le sang d'animaux morts du charbon, observation qui était destinée à avoir des résultats d'une immense portée.

Après ceci, Henle, en 1841, aboutit à la conclusion, sur des bases purement théoriques, que la cause de certaines maladies devait être attribuée à des organismes vivants ; et, par une induction similaire, Farr leur appliqua le mot "zymotic" ou "fermentive," terme qui fut bientôt presque universellement adopté.

Micro-organismes et maladies

En 1849, Pollender et Brauell observèrent aussi certains micro-organismes dans le sang de victimes du charbon, mais ce ne fut pas avant 1861 que ces corps furent étudiés par Davaine, qui, décrivant les corpuscules en forme de fil qu'il avait vus dans le sang des moutons atteints du charbon, déclara : "Dans l'état actuel de la science, personne ne penserait aller chercher l'agent de contagion au-delà de ces corpuscules. Cet agent," dit-il, "est visible, palpable ; c'est un être organisé, doué de vie, qui se développe et se propage de la même manière que les autres êtres vivants. Par sa présence dans le sang et sa rapide multiplication, il se procrée, sans aucun doute, dans la constitution de ce liquide, d'après la manière des ferments, modifications qui détruisent rapidement l'animal infecté."

LOUIS PASTEUR

Né en 1822 Mort en 1895

D'autres investigations prouvèrent la véracité de la théorie de Davaine.

Pasteur et son œuvre

La fondation de l'ère scientifique de l'inoculation, qui a pris dans les temps modernes un développement aussi remarquable, est dû grandement aux brillantes recherches de Louis Pasteur. Né le 27 décembre 1822, à Dôle, France, il fut mis pour peu de temps dans un pensionnat à Paris, et ensuite au collège à Arbois, où son père espérait qu'il deviendrait éventuellement professeur. En 1842, il obtint son diplôme de Bachelier ès Sciences à Dijon et alla à Paris pour suivre les cours du célèbre Dumas. En 1848, il fut nommé Professeur de Physique à Dijon, et six années plus tard devint Professeur et Doyen de la nouvelle Faculté des Sciences à Lille. C'est là qu'il commença ses fameuses recherches sur les fermentations. En 1865, sur la recommandation de Dumas, il fut envoyé à Alais pour étudier la maladie du ver à soie, dont la conclusion s'acheva par un succès.

En 1877, il commença des recherches sur le charbon, dont une épidémie mystérieuse causait alors, en France, de terribles ravages parmi les moutons.

Le point de départ des recherches de Pasteur sur le charbon fut que, non seulement les fermentatives, mais aussi les étapes dans la marche du mal, étaient occasionnés par l'action de bactéries, et il déclara que le charbon était dû à cette cause.

Dans l'été de l'année 1879, Pasteur interrompit ses recherches sur le charbon pour étudier une violente épidémie qui avait éclaté dans les basse-cours de France, connue sous le nom de choléra des poussins.

Le microbe du choléra des poussins

Pasteur aussitôt commença des recherches sur ce sujet, et découvrit que la cause spécifique du mal était due à un microbe. Il trouva de plus qu'il pouvait être propagé hors du corps de l'animal dans une substance stérilisée, et que le virus, après deux générations de cultures semblables, ne perdait pas



"CES DOCTEURS. CES DOCTEURS. ILS VOIENT DE JOLIS BRAS, DE JOLIES ÉPAULES, DE JOLIS . . . .

"ET ILS FONT DE L'ARGENT AUSSI!"

son caractère spécifique ou sa force, si chaque culture était faite de la précédente à de courts intervalles. Il nota que, si on laissait s'écouler quelques jours, le virus perdait de sa force, et on pouvait donc l'obtenir à des degrés différents de virulence, quelques-uns assez forts pour être fatals, d'autres si atténués que, si un oiseau en était inoculé, il n'était que légèrement atteint. Mais cet effet insignifiant le protégeait contre une inoculation suivante de virus plus fort. Il découvrit ensuite que le virus pouvait être cultivé à tous les degrés d'intensité sans altérer sa puissance ; que le plus faible pouvait être cultivé aussi bien que le plus fort, et cela également à n'importe quelle force intermédiaire. Ces découvertes ont entièrement jeté sur certains phenomènes une nouvelle clarté, et préparé les voies pour ses remarquables découvertes ultérieures.

Inoculation avec virus atténué

En 1881, il continua ses recherches sur la cause du charbon, et fut à même d'annoncer qu'il avait découvert une vaccine pour protéger les animaux contre le mal, ce qui suscita dans toute l'Europe un intérêt considérable.

Pour prouver ses assertions, Pasteur accepta l'offre que lui fit la Société d'Agriculture de Melun, soit de mettre à sa disposition soixante moutons, dont vingt-cinq devaient être vaccinés par deux inoculations de virus de charbon atténué, faites à douze ou quinze jours d'intervalle. Quelques jours plus tard, ces vingt-cinq, ainsi que vingt-cinq autres, devaient être inoculés avec une très forte culture de charbon.

Premières expériences publiques de vaccine du charbon

"Vous verrez," écrivait Pasteur, avec confiance, "les vingt-cinq moutons qui ont été vaccinés survivront, et les vingt-cinq qui ne l'ont pas été, périront."

Le 5 mai 1881, le jour fixé pour l'épreuve, Pasteur, accompagné de ses aides, Chamberland et Roux, arrivèrent à la ferme, près de Melun, où une grande affluence de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et d'agronomes s'étaient réunis. Les moutons qui devaient être vaccinés, et ceux gardés pour l'épreuve sans l'être,

furent mis à part sous un grand hangar. Chacun des premiers reçut une injection composée de cinq gouttes de culture de bactéries, et que Pasteur appela première vaccine, sur la partie intérieure de la cuisse droite, au moyen d'une petite seringue de Pravaz. Une seconde inoculation fut faite une quinzaine de jours après, avec une vaccine, qui, bien qu'elle fut atténuée, était plus virulente que la première. Le dernier jour du mois, on fit la troisième et dernière inoculation avec une culture de charbon très virulente, cette fois sur cinquante moutons et dix vaches, vaccinés et non vaccinés. Pasteur, écrivant à son gendre, disait : "Le 5 juin au plus tard, le résultat final sera connu, et il y aura vingt-cinq moutons et six vaches qui survivront. Si ce succès est complet, il sera un des plus beaux exemples de science appliquée, consacrant une des plus grandes et des plus fécondes découvertes de ce siècle."

Comme Pasteur l'avait prédit, le résultat fut de toutes façons satisfaisant. Les moutons qui avaient été primitivement vaccinés survécurent, tandis que les autres périrent.

Le 13 juin, Pasteur communiqua à l'Académie des Sciences le résultat de cette importante expérience de contrôle, et dit : "Nous possédons maintenant le virus vaccin du charbon, capable de protéger de la redoutable maladie ceux qui sont inoculés, sans qu'il soit par lui-même mortel."

Le Gouvernement Français, désireux de reconnaître sa découverte, lui offrit le Grand Cordon de la Légion d'Honneur, mais Pasteur ne voulut l'accepter qu'à la condition que ses habiles assistants, Roux et Chamberland, partageraient cet honneur, et le Gouvernement consentit alors à cette stipulation.

Avant même l'achèvement de la découverte de la vaccine du charbon, le grand savant s'était lancé à la recherche de la cause et à la préservation contre l'hydrophobie, un sujet qui avait dérouté l'investigation scientifique de tous les siècles.

Plusieurs méthodes de traitement de ce funeste mal avaient été recommandées, et en France, en 1780, on offrit un prix pour la meilleure méthode de soigner l'hydrophobie, prix qui fut décerné au Chirurgien-Major Leroux, qui avait fait une dissertation recommandant la cautérisation comme le meilleur moyen de traitement.

Méthode de traitement de Leroux

Cependant, toutes les méthodes et tous les remèdes se montrèrent inutiles, et jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle, l'hydrophobie fut considerée sans espoir et comme étant incurable. La mortalité due à la rage augmenta graduellement. Praticalement, une fois que les symptômes d'hydrophobie se développaient en elles, toutes les personnes pouvaient être considérées comme condamnées à mort et sans espoir de délai.

En 1880, l'attention de Pasteur fut attirée pour la première fois sur le sujet par Bourrel, un ancien vétérinaire de l'armée, qui avait cherché pendant longtemps un remède au mal.

Bourrel, ayant une quantité d'animaux en chenils, dont deux souffraient de la rage, les mena au laboratoire de Pasteur. Dans la même année, pendant que Pasteur en était encore à préparer ses recherches, il fut averti par le Professeur Lannelongue qu'un petit enfant de cinq ans, ayant été mordu à la face par un chien, un mois auparavant, avait été admis à l'Hôpital Trousseau, avec des symptômes d'hydrophobie. L'enfant mourut après vingt-quatre heures de souffrance, étouffé par les mucosités qui remplissait sa bouche. Pasteur saisit l'opportunité, et accourant en toute hâte à l'hôpital, en recueillit quelque peu, quatre heures après la mort de l'enfant. Il ajouta une petite quantité d'eau à ces mucosités et inocula des lapins avec le liquide, lesquels moururent en moins de trente-six heures. Il injecta la salive de ceux-ci à d'autres lapins, qui succombèrent presque immédiatement. En examinant au microscope le sang de ces derniers, il

Pasteur commence ses expériences

découvrit un micro-organisme, qu'il cultiva dans du bouillon de veau, et inocula alors des lapins et des chiens avec la culture. Après leur mort, un examen du sang au microscope révéla le même organisme.

Comme suite à ces expériences, il fit plusieurs essais pour inoculer directement la rage à d'autres lapins au moyen de la salive d'un chien enragé.

Mais l'inoculation, même par cet agent, fut encore suivie d'incertitude, et l'incubation était très lente, de sorte que l'on chercha d'autres moyens plus rapides et plus sûrs. En observant plusieurs animaux atteints de rage et qu'il avait dans le laboratoire, Roux avait noté que la fureur folle des chiens enragés excitait le cortex gris du cerveau ; il en parla donc à Pasteur, qui décida de suivre l'affaire de près. A la première autopsie qu'il fit sur un chien enragé, il mit le cerveau à nu et, avec un tube stérilisé, enleva une petite parcelle de la substance, qu'il mélangea avec de l'eau stérilisée. Avec ce liquide, il inocula plusieurs animaux, qui succombèrent rapidement d'hydrophobie, et de cette expérience il conclut que le siège du virus rabique n'était pas seulement dans la salive, comme on le pensait auparavant, mais se trouvait aussi dans le cerveau. Il résolut de confirmer ceci par une série étendue d'expériences, et un plan de travail fut immédiatement développé. Un grand nombre de chiens furent soumis à des expériences de contrôle, qui furent continuées pendant plusieurs mois, et en août 1884, la commission nommée pour vérifier ses résultats rapporta au Ministre de l'Instruction Publique que les expériences avaient été accomplies avec résultats des plus satisfaisants, et elle désirait que de nouvelles recherches puissent être poursuivies. Ceci étant convenu, une place convenable fut trouvée dans le Parc de Villeneuve-l'Étang, près de St.-Cloud.

L'hydrophobie et le cortex gris

Écrivant à un ami, le 28 mars 1885, Pasteur dit : "Je serai occupé pendant quelque temps, m'établissant,

ou plutôt établissant mes chiens à Villeneuve-l'Étang. J'ai aussi en train de nouvelles expériences sur la rage qui me prendront quelques mois. Je vais démontrer cette année que les chiens peuvent être vaccinés ou rendus réfractaires à la rage, après avoir été mordus par des chiens enragés. Je n'ai pas encore osé traiter des êtres humains mordus par des chiens enragés, mais le temps en est proche, et je suis tout disposé à commencer par moi-même, m'inoculant la rage, et ensuite arrêtant ses conséquences — car je commence à être très sûr de mes résultats."

Chenils établis à Villeneuve-l'Étang

En mai, tout était prêt à Villeneuve-l'Étang pour recevoir soixante chiens, et deux séries d'expériences furent alors exécutées sur ces animaux : la première consistant à rendre les chiens réfractaires à la rage par une inoculation préventive, et la deuxième, en empêchant l'attaque de la rage sur des chiens mordus ou soumis à l'inoculation. Mais des mois s'écoulèrent sans apporter là-dessus de conclusion satisfaisante.

Un enfant est inoculé

Par un incident inattendu, l'affaire en vint à une crise. Le 6 juillet 1885, un petit garçon âgé de neuf ans, du nom de Joseph Meister, fut amené par sa mère au laboratoire de Pasteur. Deux jours avant, il avait été terriblement mordu par un chien enragé à Meissengott. Les blessures avaient été cautérisées par un médecin de la localité, qui avait conseillé à la mère de conduire l'enfant à Paris. Pasteur était agité par des émotions contraires, et à la vue de l'enfant, qui souffrait tellement qu'il ne pouvait à peine marcher, décida que quelque chose devait être fait. Il se mit en communication avec ses collègues Vulpian et Grancher, et ils vinrent au laboratoire ce soir-là, examinèrent les blessures du garçon, dont quelques-unes étaient très profondes. A la fin, ils décidèrent d'inoculer l'enfant immédiatement. Le liquide choisi était vieux de quatorze jours, avait tout à fait perdu de sa virulence et était préparé, en outre, avec des fragments de bulbe rachidien. La première

inoculation fut suivie par d'autres, augmentant de force graduellement. "Tout va bien," écrivait Pasteur le 12 juillet ; "l'enfant dort bien, il a bon appétit et la matière inoculée est absorbée d'un jour à l'autre sans laisser de traces dans le système. Il est vrai que je ne suis pas encore arrivé aux inoculations d'épreuve, qui auront lieu mardi, mercredi et jeudi. Si l'enfant se maintient bien pendant les trois semaines suivantes, je pense que les expériences seront achevées sans accident." Pendant des jours Pasteur, dans son désir de sauver l'enfant d'une terrible mort, fut ainsi en proie à l'anxiété, passant par des phases d'espoir, de crainte et d'angoisse. Le traitement fut enfin achevé, et Pasteur, cédant aux persuasions de prendre du repos, laissa pour peu de temps le garçon entre les mains de Grancher, alla à la campagne, où il vécut dans une attente constante des rapports quotidiens de Paris. Mais ils furent tous favorables, et le garçon paraissait se porter tout à fait bien.

Le 21 octobre, devant l'Académie des Sciences, Pasteur fit son rapport sur ce cas. A ce moment-là, trois mois et trois jours s'étaient écoulés, et aucun résultat fâcheux ne s'était révélé chez l'enfant.

Succès rapporté à l'Académie des Sciences

A cette réunion historique, Bouley remarqua : "Nous sommes en droit de dire que la date de la présente réunion restera à jamais mémorable dans l'histoire de la médecine et qu'elle sera glorieuse pour la science française, car c'est un des plus grands progrès accomplis dans l'ordre médical des choses—un progrès réalisé par la découverte d'un moyen efficace de traitement préventif d'une maladie dont la nature incurable fut un legs transmis d'un siècle à l'autre. De ce jour l'humanité est armée d'un moyen infaillible pour combattre le mal fatal dénommé la rage ou d'en empêcher son attaque. C'est à Monsieur Pasteur que nous devons ceci, et nous ne pouvons pas ressentir trop d'admiration ou trop de gratitude pour ses efforts, qui l'ont conduit à un résultat aussi magnifique."

Dès que la grande découverte de Pasteur fut connue, les gens qui avaient été mordus par les chiens enragés accoururent à Paris de toutes les parties d'Europe, et un service médical régulier contre la rage fut rapidement organisé. Des médecins vinrent de toutes les parties du monde, demandant la permission d'étudier les détails de la méthode.

L'Académie des Sciences nomma une commission qui adopta à l'unanimité la suggestion de fonder un établissement pour le traitement préventif de la rage à Paris, ce qui eut pour résultat l'érection de l'Institut Pasteur, rue Dutot, qui fut inauguré par le Président Carnot en novembre 1888. Le grand dispensaire pour le traitement de la rage est devenu depuis un centre de recherches et d'enseignement sur les maladies virulentes et contagieuses.

L'exemple fut suivi en plusieurs autres pays, et vers mai 1889, il y avait des institutions anti-rabiques établies en Russie, en Italie, à Constantinople, à Barcelone, à Bucarest, à Rio de Janeiro, à la Havane, à Buenos-Aires, à Mexico et à Vienne.

En 1886, une commission nommée par le Gouvernement Anglais, pour étudier et vérifier les faits, fit une enquête qui confirma la découverte de Pasteur. Après quatorze mois d'investigations, les membres reportèrent sur la méthode d'inoculation ou vaccination de Pasteur, disant qu'il serait difficile d'estimer trop son utilité, tant au point de vue pratique, que de son application à la pathologie générale.

On peut se faire quelque idée de la valeur du traitement par les points suivants relatifs à une lecture faite par le Docteur Roux en 1889. Depuis que l'inoculation anti-rabique a été faite pour la première fois (6 juillet 1885), jusqu'au 21 mai 1889, 6 870 personnes, soit une moyenne de 150 par mois, furent traitées à l'Institut de Paris seul. Les injections étaient faites, dit-il, dans le côté, sur le

Statistique de l'inoculation anti-rabique

droit et le gauche alternativement ; elles étaient répétées pendant quinze jours. Pour les morsures ordinaires, les injections étaient commencées avec de la moelle qu'on faisait sécher pendant quatorze jours, et terminées ensuite avec de la moelle séchée pendant trois jours. Dans les cas plus sérieux, un plus grand nombre d'injections étaient faites, et on se servait plutôt de moelle fraîche, contre de telles morsures ; un traitement plus actif étant nécessaire.

Mais avec l'achèvement de sa grande découverte se rapportant à la rage, les travaux de Pasteur n'étaient pas encore terminés, et en dépit de ses forces défaillantes, des recherches avaient été déjà commencées dans son laboratoire conjointement avec Roux et Yersin, sur la diphthérie, qui devaient dans l'avenir conduire à des résultats si brillants.

Vers la fin de 1895, Pasteur fut atteint d'une sérieuse maladie, qui causa la plus grande anxiété à sa famille et à ses amis. Bien qu'une amélioration se produisit pendant quelque temps, il ne se rétablit jamais complètement et il mourut le 28 septembre 1895, à Villeneuve-l'Étang, près de la scène de ses triomphantes découvertes.

CHAPITRE VI

De la Bactériologie, et de son Influence en Médecine Préventive

Parmi les hommes qui ont jeté la base des problèmes associés à l'immunité et à la prévention des maladies, peu ont fait plus que Robert Koch, qui fut aussi le premier à démontrer la transmission artificielle de maladies infectieuses d'un animal à un autre, méthode qui a donné de si bons résultats dans ces dernières années.

Robert Koch

Il naquit le 11 décembre 1843, à Klausthal, Hanovre, et, après avoir passé sa thèse médicale, il devint aide à l'Hôpital Général à Hambourg, et plus tard médecin à l'Hospice d'Idiots de Langenhagen. En 1868, il entreprit pour un moment la clientèle privée, et plus tard devint médecin de district dans la ville de Wollstein. Ici, il consacra tous ses moments perdus à l'étude des maladies d'animaux. Le charbon fut une des premières maladies dans laquelle il s'intéressa, et les résultats de ses recherches, publiés en 1876, montra l'alliance étiologique du bacille du charbon avec la maladie ; et par ce mémoire, qui est devenu un des grands classiques de la bactériologie, il jeta la première lumière évidente sur l'obscurité des micro-organismes.

Le travail de Koch sur le charbon fut accepté partout en Allemagne, mais il fut combattu en France par Paul Bert, dont l'opposition amena Pasteur à entreprendre l'étude du charbon. Il confirma les observations de Koch, et éventuellement, comme il a déjà été dit, mena le sujet à une conclusion pratique et satisfaisante.

Travaux bactériologiques de Koch

Koch se mit ensuite au travail, pour perfectionner les méthodes et la technique de la bactériologie, et c'est à lui que nous devons beaucoup des découvertes les plus utiles dans cette branche de science. Il inventa la plupart des meilleures méthodes de stérilisation et de désinfection, et suggéra



ROBERT KOCH

Né en 1843 Mort en 1910

beaucoup d'améliorations dans les méthodes de travail. On peut dire que peut-être sa plus grande œuvre fut la méthode de préparation du sérum sur plaques pour l'isolement des organismes en culture pure. Il examina au microscope, avec un soin minutieux, le développement des bactéries, rejetant comme sans valeur quelques préparations qui montraient des organismes étrangers, et contrôlant son travail en produisant constamment la maladie par des inoculations. Pour obtenir ses cultures pures, il employait de la gélatine nutritive, qu'il usait en proportions telles qu'elle puisse donner un coagulum solide lorsqu'elle était refroidie, et ajoutait à cette gélatine une infusion de viande afin de fournir un milieu nutritif pour le développement des organismes.

Il démontra aussi la nature parasitaire des maladies infectieuses, et il amena à un grand degré de perfection les méthodes de culture des bactéries pathogènes en dehors du corps.

Koch alla à Berlin éventuellement et, en 1882, se mit au travail pour éclaircir l'étiologie de la tuberculose ; il réussit en prouvant qu'elle était due au bacille du tubercule. Pour démontrer ceci, il imagina une nouvelle méthode de coloration, au moyen de laquelle il pouvait établir une différence entre les organismes toujours présents dans les régions tuberculeuses, et ceux trouvés là accidentellement. Il réussit finalement à cultiver les organismes qu'il avait colorés, sur du sérum de sang solidifié, et prouva leur parentée au mal par des expériences d'inoculation sur des lapins et des cobayes.

Étiologie de la tuberculose

En 1890, il décrivit la préparation de la tuberculine. Les médecins et les malades atteints du mal accoururent en foule à Berlin, de loin et de près, dans la hâte d'obtenir même la plus petite quantité du remède. Mais l'emploi de ce produit puissant, donné sans distinction, en trop grande dose, par des hommes inexpérimentés, fut suivi de résultats désastreux,

Préparation de la tuberculine

et sa mauvaise réussite portèrent atteinte, pour quelque temps, à la réputation de Koch.

Des méthodes perfectionnées de préparation ont été inventées depuis, et des connaissances exactes ont été acquises, au point que la tuberculine est devenue à nouveau d'un usage étendu : thérapeutique dans les cas de tuberculose, et moyen de diagnostique prouvant chez les êtres humains ou les animaux l'existence de la maladie.

Les dernières années de la vie de Koch furent employées à la recherche des maladies tropicales et à l'étude de la malaria. Dans ce but, il voyagea dans l'Afrique du Sud et dans l'Est Africain Allemand, et conduisit la Commission de la Maladie du Sommeil envoyée par l'Allemagne en 1906.

Il mourut le 27 mai 1910, travaillant dans l'institut où il étudia journellement et presque jusqu'à sa fin.

CHAPITRE VII

Développement Moderne de l'Inoculation et de la Sérothérapie

Il n'est possible de faire ici qu'un résumé des plus brefs concernant l'énorme développement de la prophylaxie, et du traitement par inoculation spécifique, depuis l'inauguration de l'ère nouvelle de la bactériologie précise par les recherches de Pasteur, Koch et de leurs continuateurs directs. A part les recherches théoriques sur le mécanisme des réactions qui procurent l'immunité, des progrès pratiques ont été réalisés dans deux voies bien distinctes. La méthode d'inoculation de Pasteur, avec une culture ou virus atténué, était dirigée vers l'immunisation active du patient. Ceci est la base des diverses formes d'inoculation protective, ou thérapeutique, ou " vaccination," en usage de nos jours, soit que l'inoculum ou vaccin consiste en une culture vivante de virulence modifiée, une suspension des organismes morts, ou bien encore en une solution des substances toxiques solubles que les organismes produisent dans un milieu liquide artificiel. Comme exemple de l'emploi d'une culture de virulence modifiée, on peut mentionner les vaccins prophylactiques de Ferran et Haffkine contre le choléra et celui similaire de Strong contre la peste. Les cultures mortes sont employées comme agents prophylactiques dans le vaccin du choléra de Kolle et dans celui de la peste de Haffkine. Wright fut l'auteur du premier emploi systématique d'une suspension morte de bacilles typhoïdes pour l'inoculation préventive de la fièvre entérique. C'est grandement grâce à l'exposé du même observateur que des cultures mortes analogues ont acquises une place prépondérante dans la prophylaxie et le traitement de presque toutes les infections pouvant être associées définitivement à un type connu d'organismes. L'inoculation active du patient avec des substances toxiques solubles, produites par la culture artificielle, est un facteur important dans l'usage thérapeutique des tuberculines.

Comparaison des méthodes d'immunisation

W. M. HAFFKINE

En recherchant la nature des modifications qui se produisent dans les tissus de l'animal, et qui suivent l'opération d'immunisation par l'injection de bactéries ou de leurs produits, changements qui forment la base de la nouvelle condition de résistance acquise, on a été amené à découvrir que le sang et le sérum des animaux immunisés de cette façon contiennent des substances capables de neutraliser le poison inoculé ou de détruire les organismes inoculés. La découverte de la formation des substances qui servent d'antidote aux toxines bactériennes se trouve associée aux noms de Salmon et Theobald Smith, Brieger et Kitasato, Roux et Yersin, Chantemesse et Charrin et d'autres encore. Pfeiffer a démontré clairement que beaucoup d'organismes, tels que les bacilles du choléra et de la typhoïde, streptocoques, etc., desquels le corps animal peut acquérir une très grande immunité, ne produisent qu'une quantité insignifiante de toxines solubles. Metchnikoff et ses élèves attribuaient la défense de l'organisme contre de tels envahisseurs à l'activité phagocytique des leucocytes ; mais ici encore, le travail de beaucoup d'observateurs, en commençant avec Flügge et Nuttall, a fait reconnaître que les fluides dans le corps de l'animal immunisé contiennent des substances qui détruisent la vitalité et même l'intégrité structurale des organismes infectants. Il peut être noté que la lacune apparente entre les deux théories d'immunité contre les bactéries, la phagocytique et l'humorale, a été à peu près comblée dans le courant des dernières années par la description des "opsonins" (Wright), corps qui modifient les bactéries à un tel point qu'elles sont sans défense contre les attaques des leucocytes. Un autre grand progrès fut acquis quand il fut prouvé que les anti-corps protecteurs, soit antitoxiques, soit antibactériens en action, pouvaient être transférés à un animal non immunisé activement. Il fut démontré par Richet et Hericourt que cela était possible avec le sérum d'un animal immunisé contre les coccus pyogéniques. Quelques années plus tard, apparut le

Sang et sérum

"Opsonins"

travail classique de Behring et de Kitasato, prouvant la possibilité de transférer l'immunité contre les toxines du tétanos et de la diphthérie, au moyen de l'injection à un animal normal du sérum d'un animal immunisé par une succession d'inoculations faites avec une toxine similaire. L'introduction dans la pratique de la thérapeutique de ces deux sérums antitoxiques, provenant de chevaux fortement immunisés, et dans laquelle Roux aussi a pris une part importante, a formé le début de la sérothérapie, la distinguant ainsi de l'inoculation proprement dite. Encore aujourd'hui, ils tiennent leur place parmi les divers sérums employés actuellement comme étant les plus effectifs — quoique, après les résultats obtenus par Flexner dans la méningite cérébro-spinale épidémique avec un sérum antiméningococcique, celui-ci peut prétendre revendiquer cette suprématie.

Début de la sérothérapie

On verra que les méthodes rivales, consistant d'une part à inoculer et à immuniser le patient lui-même, et d'autre part à transférer le sérum d'un animal immunisé par l'inoculation, tendent à introduire deux types distincts d'immunité, qui ont été respectivement dénommés par Ehrlich, immunité active et immunité passive. Les recherches de celui-ci, ayant pour point de départ le problème de l'évaluation exacte des sérums pour leur emploi pratique, l'ont conduit à énoncer ces conceptions du mécanisme de la réaction protectrice, qui ont stimulé et fixé la direction, à un très grand nombre de travaux récents entrepris à ce sujet.

Par ce bref résumé de résultats que l'homme a obtenu sur ses perfides ennemis, grâce à sa patience et à son génie, on peut se faire une idée de la valeur du traitement par l'inoculation. La sérothérapie n'en est qu'à ses débuts, mais dans un proche avenir il sera possible de faire mieux encore. Les succès qui ont suivi sa pratique dans les temps modernes donnent à espérer qu'elle peut être définitivement une des branches les plus utiles dans l'art de guérir et spécialement dans la lutte contre quelques-unes des plus terribles maladies dont l'humanité est affligée.

IDÉES ET ACHÈVEMENTS

L'ACHÈVEMENT est le résultat de la poursuite persistante d'une idée préconçue. Plus l'idée est élevée, plus ardemment est-elle poursuivie, que plus important se présente le succès final. Ceci est non seulement indubitable en ce qui est des individus, mais également en ce qui concerne les corps constitués, et la maison qui a des idées élevées, et qui poursuit avec persistance son idéal, mérite et obtient la reconnaissance et la confiance des hommes de discernement.

Réalisation de l'Idéal

L'objectif constant de Burroughs Wellcome & Cie a toujours été d'obtenir et de maintenir le point le plus élevé d'excellence dans l'émission de chacun de leur produits. En adoptant les méthodes les plus scientifiques et en se tenant bien sur la voie des derniers travaux de recherches, ils n'ont pas seulement été pas à pas en avant avec les derniers développements qui ont eu lieu en médecine et en pharmacie, mais ils ont aussi frayé eux mêmes le chemin en introduisant quelques-uns des facteurs de valeur qui sont employés dans la médecine moderne.

Il y a déjà de nombreuses années que la maison Burroughs Wellcome & Cie a commencé des travaux de recherches, l'importance de l'application de la science aux procédés industriels ayant été réalisée.* Ces travaux, exécutés avec habileté, patience et persévérance depuis un laps de temps considérable, ont donné d'excellents résultats.

Les procédés de fabrication ayant été améliorés et de

* Les recherches entreprises par la maison B. W. & Cie il y a bien des années se continuent encore activement dans leurs usines avec un personnel choisi et expérimenté. Les Laboratoires Wellcome de Recherches Chimiques, King Street, Londres (Angleterre) et les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques, Brockwell Hall, Herne Hill, Londres (Angleterre) sont des institutions autonomes placées sous une direction distincte et séparée de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Ces deux établissements effectuent néanmoins pour la maison de nombreux travaux scientifiques importants.

nouveaux facteurs thérapeutiques introduits (sans omettre l'augmentation du degré de pureté dans le titrage des produits chimiques et galéniques, qui sont non seulement employés, mais émis), il s'ensuit que l'activité et la confiance dans les produits de la maison se trouvent assurées.

Investigations constantes

Quoique les titrages établis dans ces conditions soient sans précédent, la maison ne saurait s'en contenter, et elle fait des efforts incessants pour les élever encore en procédant continuellement à des recherches et à des expériences.

Le désir de fournir des produits dignes de confiance et scientifiquement exacts a été déjà complètement atteint par la maison, qui a donné satisfaction aux demandes les plus particulières des médecins et comblé les désirs des pharmaciens consciencieux qui se flattent de ne vendre que la qualité suprême dans tout article.

Il est amplement évident que ce succès a été obtenu par la haute appréciation accordée par les médecins et pharmaciens du monde entier aux "armes de précision" crées par la maison.

La qualité exceptionnelle des produits B. W. & Cie a assuré à la maison plus de 260 des plus hautes récompenses conférées par le Jury des expositions internationales les plus importantes des temps modernes.

Travaux où Burroughs Wellcome & Cie sont les Pionniers

Burroughs Wellcome & Cie sont les pionniers de l'introduction d'un grand nombre de médecines nouvelles et de valeur, et parmi lesquelles on peut en mentionner une qui est notable — il s'agit du Strophanthus.

Aussitôt qu'on fut assuré de la valeur de cette médecine B. W. & Cie envoyèrent des émissaires pour obtenir les faibles réserves de poison qui se trouvaient dans les huttes grossières des guerriers Africains. Les premières émissions de cette drogue, ainsi que ses préparations, furent immédiatement distribuées par la maison, et gratuitement, aux principaux médecins du monde. Les propriétés thérapeutiques du Strophanthus furent ainsi confirmées par des expérimentateurs indépendants de divers pays.

Lorsque l'attention fut renouvellée en ce qui est de l'action thérapeutique de certaines substances animales, la maison entreprit des travaux pharmacologiques sur les diverses glandes. Elle fut la première à émettre un produit stable et sûr de la glande thyroïde. Cette préparation de thyroïde est celle d'ailleurs qui reste le type caractéristique accepté parmi les membres du Corps Médical du monde entier.

Parmi d'autres produits établis on peut citer la préparation de la glande surrénale dont le principe actif fut produit sous une forme active solide et soluble dans les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques. Ce produit est émis par la maison B. W. et Cie sous le titre d' 'Hemisine.'

Des recherches ont été effectuées également sur la glande pituitaire et nombre de renseignements de valeur furent ainsi obtenus. L'Extrait d'Hypophyse (Infundibulaire) 'Vaporole' est le résultat acquis à la suite d'expériences faisant suite à ces investigations, et la réputation atteinte par cet agent thérapeutique important, est la base principale des résultats heureux obtenus avec le produit 'Vaporole.'

Les recherches sur l'Ergot, au point de vue chimique et pharmacologique, conduites aux Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques ainsi que dans les laboratoires d'expériences des Usines Chimiques 'Wellcome,' ont fait jaillir beaucoup de clarté sur un sujet qui se trouvait précédemment dans des conditions assez confuses. Les efforts des investigateurs dans les Laboratoires susindiqués conduisirent à l'isolement de l'Ergotoxine. Ceci fut suivi, après des recherches prolongées conduites par Barger et Dale aux Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques, par la découverte dans les extraits d'Ergot d'une série de bases organiques, dont les plus importantes en ce qui est de leur action physiologique sont: la Parahydroxyphényléthylamine (ou la 'Tyramine') et la β-iminazolyléthylamine (ou l' 'Ergamine').

On peut dire que les principes actifs de l'Ergot ont été completés chimiquement par la préparation synthétique de ces deux dernières substances.*

* Barger, *Trans. Chem. Soc.*, 1909, 95, 1123; Pyman, *Trans. Chem. Soc.*, 1911, 99, 668

Les connaissances et l'expérience acquises par Burroughs Wellcome & Cie pendant le cours de cette investigation prolongée ont suscité l'application de façon pratique du produit connu sous le titre d' 'Ernutin,' lequel est une préparation d'Ergotoxine, 'Tyramine' et 'Ergamine,' en solution stable et dans un état chimiquement pur.

'Ernutin'

L' 'Ernutin' peut être décrit comme contenant les essentiels de l'Ergot à l'exclusion des impuretés qu'il renferme, lesquelles produisent les effets délétères observés dans toutes les préparations galéniques de l'Ergot.

L'évidence qu'il est tiré de principes actifs dont la pureté peut être déterminée chimiquement, écarte la nécessité du titrage physiologique, et permet l'émission de ce produit du plus haut degré de pureté sous une force qui ne varie point.

Les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques furent les pionniers dans la production du sérum antidiphthérique dans l'Empire Britannique et ils fournirent également le premier sérum qui fut employé aux États-Unis d'Amérique du Nord.

Sérum antidiphthérique

Lors du début jusqu'à ce que la valeur intrinsèque en fut démontrée d'une manière concluante, tout ce que l'on put fabriquer fut placé gratuitement à la disposition des principaux hôpitaux et cliniques, sans omettre les médecins qui avaient des cas de diphthérie en cours de traitement. Ces essais furent suivis d'un succès marqué et le Sérum Antidiphthérique 'Wellcome' a continué depuis à être apprécié à travers le monde.

'Soamin'

En 1907, B. W. & Cie commencèrent une série d'investigations, et à titre de résultat final s'ensuivit l'introduction du Para-aminophénylarsonate de Sodium, présenté dans un état de remarquable pureté, de composition chimique et de puissance arsénicale parfaitement définie. Ce produit émis sous le nom de 'Soamin,' a donné des résultats excellents, notamment dans les cas syphilitiques et dans la maladie du sommeil, la pellagre et le kala-azar.

Nombre d'autres développements importants en chimie et en pharmacie ont pris place aux laboratoires des Usines Chimiques 'Wellcome.' Parmi ceux-ci citons la production d'un chloroforme d'un titrage certain, qui augmente grandement la garantie d'uniformité et de sûreté ; ainsi que la découverte d'un antiseptique puissant possédant une grande valeur qualitative et qui est émis sous le titre de 'Nizin.'

Chloroforme 'Wellcome'

Beaucoup d'essais ont été faits pendant le cours de ces dernières années pour la préparation d'un produit synthétique possédant des propriétés chimiques et physiologiques similaires à celles du principe actif de la glande surrénale. Des recherches furent entreprises dans les laboratoires des Usines Chimiques 'Wellcome,' donnant comme résultat une substance chimique démontrant certains avantages sur le principe actif de la glande surrénale naturelle, lequel a été obtenu synthétiquement. Le nom d' 'Epinine' a été donné à cette substance ainsi définie : 3 : 4-Dihydroxyphénylethylméthylamine *(voir page* 29*)*.

Découverte de l' 'Epinine'

L'une des étapes dans la synthèse de l' 'Epinine' a revélé le 'Lodal,' une médecine précieuse possédant une action physiologique similaire à celle de la cotarnine et de l'hydrastinine. Le 'Lodal' a été trouvé de grande valeur dans des cas d'hémorrhagie utérine dus à des causes diverses.

'Lodal'

Dans ce brief compte-rendu il n'est guère possible d'exposer que les résultats les plus saillants de la maison. Ses efforts sont constamment étendus et des achèvements d'une plus grande ampleur se trouvent enregistrés.

TITRAGE

Pendant ces quinze dernières années, une grande connaissance fut acquise en ce qui concerne les propriétés des substances médicinales. Il n'est donc pas surprenant que le pharmacien moderne entreprenant exige des produits chimiques et galéniques de titrages qualitatifs beaucoup plus élevés que ceux acceptés il y a dix ans.

La nécessité des titrages modernes

Reconnaissant le bien fondé de ce besoin, et désireux de n'émettre que des produits de la plus haute qualité,

Burroughs Wellcome & Cie passèrent la révision des formules d'essais chimiques et galéniques se trouvant indiquées dans les diverses pharmacopées du monde, et, comme résultat d'un travail important expérimental, certains titrages furent fixés et leurs produits doivent s'y conformer avant qu'ils soient émis.

Titrages minutieux

Les titrages 'Wellcome' sont l'objet d'investigations continuelles dans les laboratoires des Usines Chimiques de la maison, et de temps en temps la possibilité advient, à la suite de résultats dans des essais plus minutieux, ou encore par des perfectionnements apportés à la fabrication, etc., d'élever encore certains titres. Les désirs de la maison consistent à fixer des titrages du plus haut degré possible, afin d'assurer aux produits qu'elle émet le plus haut degré possible de pureté et d'activité.

Les titrages physiologiques peuvent seulement être obtenus dans des laboratoires physiologiques bien montés ; quoique cela, il y a un grand nombre de médecines de valeur qui pour le moment présent, ne peuvent pas être titrées avec exactitude par aucun moyen, tels que le Strophanthus, la Scille et la Digitale. Le titrage physiologique ou contrôle de ceux-ci, ou produits similaires, est obtenu pour compte de Burroughs Wellcome & Cie aux Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques.

Titrage chimique

Le titrage chimique est un labeur que tout pharmacien qui a un certain temps à sa disposition peut obtenir. Il peut, cependant, s'éviter ce travail en faisant l'acquisition de préparations telles que les produits B. W. & Cie, qui se conforment à des titrages sévères, et sont éprouvés et approuvés, avant leur émission, par un personnel de pharmaciens habile et expérimenté, habitué à ce genre de travail.

Titrage de la matière brute

Le désir et la possibilité de commencer le procédé de titrage en ce qui concerne la matière brute, et ce dans la première période, ainsi que d'exercer un contrôle scientifique sur la culture des plantes médicinales, ne sont pas restés inaperçus, et les Cultures 'Wellcome' de Materia Medica ont été instituées à cet effet par la maison, il y a quelques années.

LABOURAGE

La première opération dans la préparation du sol pour la culture des plantes médicinales.

LE CYLINDRAGE

Cette opération suit aussitôt le labourage et consiste dans l'écrasement des mottes de terre

[illegible]

SARCLAGE ENTRE LES RANGÉES DE BELLADONE
Ce travail retourne le sol et fait disparaître les mauvaises herbes

CHARGEMENT DE BELLADONE

La récolte varie entre 3 tonnes ½ et 12 tonnes par hectare. La plante, fraîchement coupée, est pesée, mise en bottes et transportée directement aux laboratoires dans un camion automobile. On dessèche une partie des feuilles en quelques heures, dans des chambres ventilées spéciales. On récolte les racines en automne, et on les coupe en tranches, de façon à en accélérer le séchage et à empêcher ainsi toute détérioration.

Reproduction des photographies prises dans les champs des Cultures Wellcome de Materia Medica et développées avec les Produits 'Kalland' pour la Photographie (voir section au Prix-courant).

Les Cultures 'Wellcome' de Materia Medica

Un Jardin Moderne de Plantes Médicinales

Dans les jours qui précédèrent la période des méthodes d'exactitude absolue et des procédés scientifiques reconnus, les apothicaires ainsi que les médecins ne pouvaient dépendre pour leurs approvisionnements des médicaments d'origine botanique que sur les plantes et simples cueillettes d'herbe effectuées à la campagne ou provenant d'un coin du jardin approprié pour ces besoins.

Un des premiers pas en avant, à l'égard de la production d'agents précis à titre de remèdes, fut effectué lorsque les herboristes commencèrent à établir des descriptions, plus ou moins exactes il est vrai, des plantes qu'ils avaient l'habitude d'employer, et également lorsqu'ils les publièrent sous forme de livres. De ce fait, les dangers provenants de l'emploi de noms donnés dans certaines localités purent être évités ; mais le résultat le plus heureux fut acquis lorsque les jardins spéciaux de plantes médicinales furent institués à part pour la production de plantes médicinales et sous l'œil attentif d'hommes compétents. Ces anciens jardins pour la culture des plantes médicinales existent toujours dans nombre d'endroits, quoiqu'ils ne remplissent plus les desiderata pour lesquels ils furent originairement crées.

Les considérations qui guidaient les anciens pharmaciens—hommes de jugement et fort intelligents—dans la création de jardins spéciaux pour la culture des plantes médicinales furent principalement celles en concordance à la reconnaissance des drogues—pour distinguer, en effet et en abrégé, celles utilitaires et médicinales de celles qui étaient inertes ou toxiques. Les plantes étaient acceptées comme elles poussaient, sans qu'il fut question de quoique ce soit, pour la préparation des galéniques, et, comme les drogues imparfaites sont sujettes à de grandes variations dans leur composition, nécessairement leurs préparations varièrent en force ainsi qu'en valeur thérapeutique active.

L'isolement des alcaloïdes dans la première période du siècle dernier mit ceci en évidence. En un mot, la science des médicaments était insuffisante. Alors advint ce problème : comment assurer la force constante des principes actifs et des contenus alcaloïdes ? Un document par Carr et Reynolds, publié dans le *Chemist and Druggist*, fait ressortir la nécessité de résoudre la difficulté. En ce qui concerne le Quinquina, ils trouvent, entre la qualité la plus élevée et celle la plus basse, achetée actuellement sur le marché, une différence de 3.58 pour cent de quinine et de cinchonidine ; dans l'herbe de Belladone, une différence de 0.85 pour cent comme total en alcaloïdes ; dans l'Hydrastine provenant de la racine de l'hydrastis, une différence de 2.03 pour cent ; et dans la Berbérine de la même racine, une différence de 3.5 pour cent, etc. Ces chiffres représentent des différences sérieuses dans l'activité des drogues, et mettent en évidence la nécessité d'adopter des moyens pour l'obtention de l'uniformité dans la force.

Anciennes méthodes et nouveaux besoins

Le titrage est dès maintenant reconnu comme étant essentiel. Dans le cas présent, comme d'ailleurs pour les autres branches de la pharmacie, Burroughs Wellcome & Cie ont été les pionniers.

Ils ont aussi appliqué le principe du contrôle scientifique à la culture des plantes employées, et ceci par l'attention exercée auprès de la composition des terrains de culture, du choix des meilleures espèces, des récoltes faites au moment le plus propice de la pousse, etc., et éliminant de cette façon les facteurs fortuits de la variabilité. Cela a été accompli par la création d'une ferme scientifique, située près des Usines Chimiques 'Wellcome' à Dartford.

La racine de la question

La plus grande part du travail produit aux Cultures 'Wellcome' de Materia Medica est consacré aux récoltes de la matière première, mais une section qui procède aux expériences est maintenue constamment en pleine activité. Par exemple, en ce qui est de la Belladone, on l'a traitée avec différents engrais et elle a été ombragée pendant la pousse par des tissus de couleurs variées.

Pendant le cours de ces recherches, on put constater que la quantité obtenable des alcaloïdes est affectée à un degré plus important par les conditions climatériques que par d'autres causes de son entourage immédiat, et on s'est rendu à l'évidence que la supériorité des feuilles anglaises est due au climat. Des expériences sur des genêts à balais ont encore prouvé que la quantité de spartéine y contenue variait selon l'époque de l'année, étant faible pendant la floraison et la période de pousse, et augmentant pendant l'automne et l'hiver, lorsque l'activité reproductive a cessé. La Digitale requise pour la production des préparations de cette drogue de la marque 'Wellcome' est aussi cultivée dans les Cultures 'Wellcome' de Materia Medica. Le résultat est que les variations caractéristiques des feuilles ont été réduites à celles nécessairement dues aux variations des saisons d'année en année. Disons aussi, que sont évitées les erreurs occasionnelles qui adviennent à la suite de l'inclusion de spécimens mauvais ou erronés—quoique dans une littérature récente sur ce sujet, de telles erreurs se rencontrent fréquemment dans les collections établies, soit par les herboristes amateurs ou soit par les professionnels.

Résultats d'expérience

Avantages

Des avantages plus étendus, dérivant conjointement de la pousse actuelle des plantes avec la préparation de leurs galéniques, sont les suivants :

(1) Une drogue peut être extraite ou traitée immédiatement après avoir été récoltée.

(2) Les plantes peuvent être desséchées, en cas de besoin, aussitôt après avoir été coupées—c'est-à-dire avant tout commencement d'altération ou de fermentation.

(3) On ne dépend plus du caprice de celui qui les récolte au loin et l'on évite les risques de falsifications intentionnelles ou accidentelles.

(4) On peut diriger la culture d'une plante de façon à activer ou augmenter en elle la production de la partie ou du principe que des épreuves chimiques ou physiologiques ont prouvé être utilisables en médecine. Des exemples remarquables de ce genre sont fournis par la Digitale et la Belladone.

RAPPORTS IMPORTANTS

SUR LES

ANALYSES DES PRODUITS 'TABLOID'

Extrait du Rapport de

M. le Docteur G. POUCHET, de Paris

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie de Médecine, Directeur du Laboratoire du Comité d'Hygiène Publique de France.

J'ai analysé les Produits Hypodermiques 'Tabloid' préparés par MM. Burroughs Wellcome & Cie, et les ai trouvés constitués par des produits chimiques purs et correctement dosés.

Ces produits, que je me suis procurés dans le commerce, sont dignes de la confiance des praticiens.

M. le Professeur Docteur E. LUDWIG,
de Vienne (Autriche)

J'ai choisi moi-même cinq échantillons des Médicaments marque 'Tabloid,' préparés par la maison Burroughs Wellcome & Cie, de Londres, et je les ai examinés, avec le résultat suivant :

(1) Les médicaments contenus dans ces Produits marque 'Tabloid,' savoir : Chlorhydrate de Morphine, Nitrate de Strychnine, Bi-iodure rouge de Mercure et Bichlorure de Mercure, sont d'une pureté absolue et se conforment en tous points aux exigences de la Pharmacopée Autrichienne, 7me édition.

(2) Le dosage (0 gr. 01 et 0 gr. 001 de Chlorhydrate de Morphine ; 0 gr. 001 de Nitrate de Strychnine ; 0 gr. 01 de Bi-iodure rouge de Mercure et 0 gr. 01 de Bichlorure de Mercure) correspond exactement avec les indications données sur les étiquettes et est à même de satisfaire aux exigences des plus difficiles.

Dr. OTTO N. WITT, de Berlin

Professeur de Chimie, Königliche Technische Hochshule

A la requête de MM. Burroughs Wellcome & Cie, de Londres, j'ai examiné trois échantillons de produits de la marque 'Tabloid' de leur fabrication (choisis et achetés par moi-même) relativement à leur pureté, et dans le but de déterminer si vraiment le dosage répondait aux indications données sur les étiquettes.

Les Médicaments marque 'Tabloid' choisis étaient les suivants : Iodure de Potassium, 0 gr. 50 ; Sulfate de Cuivre, 0 gr. 05 ; et Acide Arsénieux, 0 gr. 005. J'ai fait une analyse quantitative précise de ceux-ci en employant un grand nombre de chaque espèce.

J'ai fait parvenir à MM. Burroughs Wellcome & Cie un rapport détaillé donnant les résultats de mon examen, lequel a démontré que dans les trois cas le dosage était d'une exactitude qu'on ne saurait obtenir, à mon avis, en pesant les médicaments à la main.

Étant donné que j'avais toute liberté dans le choix et l'achat de ces échantillons, je crois pouvoir conclure que les autres médicaments de la marque 'Tabloid' sont dosés avec non moins d'exactitude et qu'ils sont également dignes de confiance.

Extrait du Rapport de

Sir HENRY E. ROSCOE, F.R.S.
et
Sir E. FRANKLAND, K.C.B., Ph.D., F.R.S.
de Londres

Les résultats des analyses et des observations que nous avons faites nous portent à conclure que, lorsqu'il ordonne un médicament de la marque 'Tabloid,' le médecin peut compter sur la précision du dosage.

L'administration de médicaments de la marque 'Tabloid' présente en outre sur les pilules, poudres, gouttes et potions (mesurées par cuillerée à café ou à bouche) cet avantage qu'on obtient une dose beaucoup plus exacte.

Abréviations Dangereuses

Les mots 'Tabloid' et 'Soloid' doivent toujours s'écrire en toutes lettres si l'on veut être sûr d'obtenir les véritables produits de B. W. & Cie.

Une abréviation employée en commandant un certain produit pourra vous apporter le produit que vous ne désirez pas et vous causer une déception.

Écrire les mots 'Tabloid' et 'Soloid' en abrégé c'est rendre douteuse l'intention de celui qui désire ces marques, et cela peut provoquer des erreurs en ce qui est de la valeur, de la force et de l'activité des produits désirés.

Derrière les marques 'Tabloid' et 'Soloid' il y a des années de recherches, d'expérience et d'essais qui ont établi la haute réputation de la maison Burroughs Wellcome & Cie.

Lorsque les produits 'Tabloid' ou 'Soloid' sont prescrits, dans quelque partie du globe que ce soit, le malade recevra toujours les mêmes produits authentiques d'un titre uniforme, d'une précision rigoureuse et d'un degré invariable d'activité, préparés avec des ingrédients à un état exceptionnel de pureté.

Il est donc important et prudent d'écrire la marque en toutes lettres, tel que :

"Tabloid"



NOTES THÉRAPEUTIQUES

Acétyl-salicylate de Quinine

(voir 'Xaxaquin,' *page* 63*)*

Acide Acétyl-salicylique *(voir* 'Xaxa,' *page* 62*)*

Acide Benzoïque, Composé d'

Présente l'action stimulante de l'acide benzoïque, du menthol et de l'ipécacuanha, combinée à l'action calmante et anodine de la codéine et de la cocaïne. Dissous dans la bouche, son action locale est particulièrement bienfaisante dans la toux si souvent associée aux différentes variétés de pharyngite ; il calme aussi la toux des fumeurs. Avalé pour la bronchite, il stimule l'expectoration et calme les irritations de la muqueuse.

Préparations

COMPOSÉ D'ACIDE BENZOÏQUE 'TABLOID' [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Acide benzoïque,	0 gr. 032
Codéine,	0 gr. 0065
Menthol,	0 gr. 0065
Poudre d'ipécacuanha,	0 gr. 0065
Chlorhydrate de cocaïne,	0 gr. 0016
Essence de menthe poivrée,	*0 gtt. 16 (0 cmc. 0037)
Gomme rouge,	*q.s.*

* Compte-gouttes international, Bruxelles, 1902

MODE D'EMPLOI.—En laisser dissoudre un dans la bouche, fréquemment.

COMPOSÉ D'ACIDE BENZOÏQUE 'TABLOID' (PASTILLE) [VOIR LISTE B. W. & Cie]

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Alaxa,' LIQUEUR AROMATIQUE DE CASCARA SAGRADA [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Présente, sous une forme engageante et agréable, les propriétés toni-laxatives de l'écorce du véritable cascara sagrada, combinées à des principes stomachiques et carminatifs. Son goût agréable et sa légère action laxative la rendent idéale pour le traitement de la constipation habituelle, et la recommandent pour les vieillards et les débilités. Une cuillerée à café (3 cmc. 5) contient l'équivalent de 1 cmc. 4 d'Extrait de Cascara Sagrada Fluide, Pharmacopée Française. L' 'Alaxa' fortifie la digestion et augmente l'appétit.

MODE D'EMPLOI.—Depuis une demi-cuillerée à café jusqu'à deux cuillerées entières (1 cmc. 8 à 7 cmc.), après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Aloïne, Composé d'

Combinaison toni-laxative qui a rendu les plus grands services dans le traitement de la dyspepsie atonique et de la constipation. L'action purgative de l'aloïne et celle de l'ipécacuanha sont si bien combinées que tout le tube intestinal est stimulé. Ces drogues agissent comme des stomachiques, et leur action se trouve aidée par la strychnine, qui est un stimulant intestinal.

La belladone, par son action sur les ramifications terminales des nerfs dans les parois intestinales, produit un effet carminatif, tout en participant à la purgation.

Préparation

COMPOSÉ D'ALOÏNE 'TABLOID' [B. W. & Cie]

Aloïne,	0 gr. 013
Sulfate de strychnine,	0 gr. 00108
Extr. de belladone,	0 gr. 008
Poudre d'ipécacuanha,	0 gr. 004

(Dragéifié ou non)

MODE D'EMPLOI.—Un ou deux, après avoir mangé, ou de un à trois en se couchant.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Voir aussi : Blaud (Pil. Fer.) et Aloïne, *page* 24 ;
Composé de Blaud (Pil. Fer.), *page* 25

Ammoniaque, Bromhydrate d'

Le bromhydrate d'ammoniaque s'emploie couramment pour beaucoup de maladies nerveuses, telles que l'épilepsie, quand le cerveau ou la moelle épinière sont très excitables. On l'administre comme hypnotique dans le surmenage, les tracas, etc., et il calme les céphalées de la migraine. On l'emploie aussi dans le delirium tremens, la folie, le tétanos, l'asthme et les maladies spasmodiques nerveuses. Le bromhydrate d'ammoniaque est préférable au bromure de potassium quand celui-ci déprime trop le cœur.

Préparations

‡ BROMHYDRATE D'AMMONIAQUE 'TABLOID,' 0 gr. 50 et 1 gr. [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI. 0 gr. 50 à 2 gr., dissous dans un verre d'eau, après avoir mangé ou en se couchant.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Voir aussi : Trois Bromures, Effervescent, *page* 60

Antifébrine

L'antifébrine s'emploie contre les maux de tête et les névralgies, dans le rhumatisme aigu, et dans les catarrhes aiguës et les amygdalites. Dans les vomissements persistants après les opérations ou dans le mal de mer, l'antifébrine est d'un grand secours. **L'antifébrine doit être employée avec précaution.**

‡ Ou'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Antifébrine—*suite*

Préparations

ANTIFÉBRINE 'TABLOID,' 0 gr. 10 et 0 gr. 25 [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En avaler un produit avec un peu d'eau.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Bandes Hygiéniques 'Tabloid,' Pliées et Comprimées [B. W. & Cie]

Les Bandes Hygiéniques 'Tabloid,' Pliées et Comprimées, possèdent beaucoup d'avantages sur les bandes hygiéniques ordinaires. Elles sont faites avec des matériaux de qualité exceptionnelle, spécialement adaptés à leur usage particulier. Leur degré d'absorption est remarquable et la douceur de leur surface empêche le contact de causer la moindre gêne. L'extrême petitesse de leur volume, qui les rend si commodes en voyage, est obtenue par compression et leur mode d'empaquetage assure une propreté parfaite.

De quatre grandeurs, en boîtes de 12 bandes. Une ceinture est contenue dans chaque boîte.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Bichlorure de Mercure *(voir page 56)*

Blaud (Pilule Ferrugineuse)

Depuis bien longtemps, on a reconnu la supériorité du carbonate de fer comme hématinique. Quand il est chimiquement pur, ce sel est non astringent, non irritant et facilement absorbable, mais quand il s'est oxydé il perd toutes ces propriétés. Le problème, qui consistait à produire du carbonate de fer pur à l'état inoxydable juste au moment qui suit l'administration, a été résolu par la production des Pilules Blaud 'Tabloid.'

Par un procédé spécial, les proportions exactes de sulfate de fer et de carbonate alcalin sont intimement associées, sans pourtant que ces substances puissent réagir l'une sur l'autre ; elles restent intactes jusqu'à ce que le produit soit administré, et c'est alors seulement qu'il **se forme dans l'estomac du carbonate de fer à l'état naissant.** Ce résultat suffit à lui seul pour expliquer la grande supériorité de ce produit 'Tabloid.'

Des essais cliniques dans un hôpital important ont prouvé que, tandis que d'autres préparations de fer amenaient dans l'hémoglobine une augmentation journalière variant de 0,125 à 0,5 pour cent, la préparation Blaud (Pil. Fer.) 'Tabloid' donnait une moyenne remarquable de 1,2 pour cent d'augmentation quotidienne.

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Blaud (Pil. Fer.)—*suite*

Préparation

‡ BLAUD (PILULE FERRUGINEUSE) 'TABLOID,' 0 gr. 25
(Dragéifié) [VOIR DÉTAIL B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Commencer par un, et augmenter graduellement le nombre si c'est nécessaire ; avaler avec un peu d'eau deux ou trois fois par jour, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Blaud (Pil. Fer.) et Aloïne

La tendance à la constipation qui accompagne souvent l'anémie, et qui dans quelques cas est augmentée par l'administration du fer, se trouve combattue ici par l'aloïne contenue dans ce produit.

Préparation

BLAUD (PIL. FER.) ET ALOÏNE 'TABLOID' [VOIR DÉTAIL B. W. & Cie]

Masse de Blaud, (= 20 % de carbonate de fer)	0 gr. 25
Aloïne,	0 gr. 005

(Dragéifié)

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à quatre, avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Blaud (Pil. Fer.) et Arsenic

L'augmentation d'hémoglobine qui suit l'administration de la pilule Blaud se trouve ici encore favorisée par l'arsenic. Les effets altérants et toniques de l'arsenic ajoutent encore à la valeur de ce produit.

Préparation

BLAUD (PIL. FER.) ET ARSENIC 'TABLOID' [VOIR DÉTAIL B. W. & Cie]

Masse de Blaud, (= 20 % de carbonate de fer)	0 gr. 25
Acide arsénieux,	0 gr. 001

(Dragéifié)

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à quatre, avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Blaud (Pil. Fer.) avec Arsenic et Strychnine

Combine les propriétés stomachiques et toniques de la strychnine avec les effets thérapeutiques des Pilules Blaud et Arsenic 'Tabloid.'

Préparation

BLAUD (PIL. FER.) AVEC ARSENIC ET STRYCHNINE 'TABLOID' [VOIR DÉTAIL B. W. & Cie]

Masse de Blaud, (= 20 % de carbonate de fer)	0 gr. 25
Acide arsénieux,	0 gr. 0005
Strychnine,	0 gr. 0005

(Dragéifié)

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à quatre, avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Blaud (Pil. Fer.)—*suite*

Blaud (Pil. Fer.) et Cascara

La constipation, fréquemment un symptôme prononcé de l'anémie, se trouve souvent aggravée par l'administration du fer. Le cascara combat avec succès la condition atonique de l'intestin et fait disparaître la constipation.

Préparation

BLAUD (PIL. FER.) ET CASCARA 'TABLOID'

[VOIR LISTE B. W. & Cie]

Masse de Blaud, (= 20 % de carbonate de fer)	0 gr. 25
Extr. de cascara sagrada, *(Dragéifié)*	0 gr. 025

MODE D'EMPLOI.—Commencer par un et augmenter graduellement le nombre jusqu'à quatre si c'est nécessaire; avaler avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Blaud (Pil. Fer.), Composé de

Préparation d'un grand secours contre l'anémie et la lassitude, le manque d'appétit et la constipation. Le capsicum et les amers, aloïne et strychnine, agissent comme stomachiques, tandis que l'action tonique puissante de la strychnine sur les nerfs réagit contre la sensation d'abattement souvent présente dans les cas d'anémie.

Préparation

COMPOSÉ DE BLAUD (PIL. FER.) 'TABLOID'

[VOIR LISTE B. W. & Cie]

Masse de Blaud (= 20 % de carbonate de fer)	0 gr. 50
Poudre de capsicum,	0 gr. 015
Aloïne	0 gr. 002
Strychnine,	0 gr. 002
Acide arsénieux, *(Dragéifié)*	0 gr. 002

MODE D'EMPLOI.—En avaler un avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Bromures Effervescents *(voir page 60)*

Café-Menthe *(voir* 'Coffee-Mint,' *page 27)*

Cascara Sagrada

Le cascara sagrada est probablement la drogue la plus précieuse que nous possédions pour le traitement de la constipation habituelle. On doit commencer le traitement avec 0 gr. 15 de l'extrait, une fois par jour après avoir mangé, et augmenter la dose si c'est nécessaire jusqu'à 0 gr. 40 trois fois par jour. Cette quantité devra alors être maintenue jusqu'à production de selles régulières, après quoi on pourra graduellement réduire la dose et finalement la discontinuer.

Cascara Sagrada—*suite*

Il a été prouvé que beaucoup des écorces importées sous le nom de cascara sagrada ne sont que des écorces de différentes variétés de *Rhamnus* dont la composition et l'action varient extrêmement. Même quand on emploie l'écorce véritable pour faire l'extrait, la façon dont on fabrique le produit peut rendre la préparation inerte. Certaines de ces préparations défectueuses produisent des nausées, d'excessives purgations, même des selles sanguinolentes.

La maison Burroughs Wellcome & Cie a des facilités exceptionnelles pour se procurer le *vrai* cascara sagrada récolté dans la bonne saison. Cette écorce à l'état brut est triée avec soin, et l'on en extrait les principes thérapeutiques par un procédé qui est le résultat d'une expérience unique et de longue durée.

Le Cascara Sagrada 'Tabloid,' préparé avec un soin des plus scrupuleux, produit tous les effets physiologiques de la drogue pure, et les médecins le préfèrent à tout autre à cause de sa sûreté d'action invariable.

Préparations

‡ CASCARA SAGRADA (EXTRAIT SEC) 'TABLOID' 0 gr. 065, 0 gr. 15 et 0 gr. 25 *(dragéifié ou non)* [Voir B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—La meilleure façon de prendre le cascara est de suivre la méthode indiquée ci-dessus. La dose maximum usuelle est de 0 gr. 50.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Voir aussi : Blaud (Pil. Fer.) et Cascara, *page* 25

Chloroforme

On entend souvent exprimer l'opinion que les résultats si variés obtenus dans l'anesthésie sont dus à la composition inconstante du chloroforme. Cette variabilité provient, soit de l'emploi de matériaux de qualité inférieure, soit de méthodes de fabrication défectueuses. Dans la production du chloroforme de la marque 'Wellcome,' on apporte le plus grand soin pour lui assurer le plus haut degré de pureté possible, et le rendre exempt de produits de décomposition irritants. Le Chloroforme 'Wellcome' est d'une composition uniforme et d'action absolument sûre ; et il est particulièrement caractérisé par la présence de cette quantité de chlorure d'éthyle, minime mais constante, qui a été reconnue si utile dans l'anesthésie. La grande pureté et l'utilité certaine de ce chloroforme lui ont fait une réputation hors ligne dans le monde entier.

Préparation

‡ CHLOROFORME 'WELLCOME'

Voir la liste des Produits Chimiques 'Wellcome'

Cocaïne, Composé de, avec Chlorate de Potasse et Borax *(voir* Voix, *page* 62*)*

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Codéine, Phosphate de

Dans le diabète sucré, la codéine passe pour réduire la quantité de sucre. Elle soulage la toux et les irritations des bronches dans la phthisie et autres affections des voies respiratoires, et agit comme anodin pour beaucoup de douleurs, surtout pour les douleurs abdominales. Le phosphate offre un moyen d'administrer l'alcaloïde sous une forme soluble.

Préparations

PHOSPHATE DE CODÉINE 'TABLOID,' 0 gr. 03 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un d'abord, augmenter graduellement selon la nécessité ; à prendre après avoir mangé, une, deux ou trois fois par jour, ou en se couchant.

PHOSPHATE DE CODÉINE 'TABLOID' (HYPODERMIQUE), 0 gr. 015 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un ou davantage pour l'injection sous-cutanée.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Coffee-Mint' *(Café-Menthe)*

La combinaison du bicarbonate d'ammoniaque, de l'extrait de café et de l'essence de menthe forme un stimulant gastrique, hépatique et général très efficace. Le bicarbonate de soude et l'oxalate de cérium neutralisent l'acidité de l'estomac, en combattent l'irritabilité et calment les nausées. Ce produit est recommandé contre les acidités de l'estomac et la flatulence accompagnée d'insomnie et de palpitations. Il est d'un grand secours dans les dérangements de l'estomac associés à des troubles du foie, et on l'emploie avec un succès marqué contre les vomissements de la grossesse et le mal de mer.

Préparation

'COFFEE-MINT' *(Café-Menthe)* 'TABLOID' [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Bicarbonate de soude,	0 gr. 191
Bicarbonate d'ammoniaque,	0 gr. 004
Extr. de café,	0 gr. 032
Oxalate de cérium,	0 gr. 016
Essence de menthe poivrée,	*q. s.*

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à quatre, ou davantage, avec un peu d'eau, ou en laisser dissoudre un dans la bouche de temps en temps.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Colorants 'Soloid' pour la Microscopie

[VOIR LISTE B. W. & Cie]

La tendance à se décomposer qu'ont les solutions de colorants à l'aniline a toujours été une source d'ennuis dans la microscopie. Mais aujourd'hui ces désavantages se trouvent entièrement annulés par l'emploi des Colorants 'Soloid' pour la Microscopie. Ces produits contiennent des colorants d'aniline de la plus haute qualité et permettent de préparer promptement et facilement de petites quantités de solutions colorantes au moment *où l'on en*

[VOIR LISTE] Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Colorants 'Soloid' pour la Microscopie—*suite*

a besoin. De cette façon on évite le gaspillage et l'on s'assure des résultats excellents. *(Voir aussi pages* 130–137*)*

Une liste complète des Colorants 'Soloid' pour la Microscopie se trouve dans la liste des prix à la fin du volume.

Crème 'Hazeline' *(voir page* 40*)*

Dionine

La dionine, un dérivé de la morphine, possède des propriétés très semblables à celles de la codéine, mais son action semble plus prononcée et plus prolongée. Ce produit s'emploie comme anodin dans l'iritis, la kératite et le glaucome, et pour activer l'absorption de produits inflammatoires. La dionine est contre-indiquée dans l'artériosclérose chez les personnes âgées.

Préparations

DIONINE 'TABLOID' (OPHTHALMIQUE), (BB) 0 gr. 0005 et (FF) 0 gr. 005 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un produit peut être employé, et répété de temps en temps selon la nécessité.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Easton, Sirop d' *(voir page* 54*)*

'Enule,' Suppositoires Rectaux

Ces suppositoires possèdent des avantages très marqués sur les suppositoires ordinaires de forme conique, qui sont d'une introduction difficile, et quelquefois même expulsés. Les Suppositoires 'Enule' sont renfermés dans des enveloppes d'étain pur, qu'on enlève au moment de l'emploi. Ils contiennent des doses déterminées exactes de drogues pures, et leurs principes actifs sont distribués uniformément dans toute la masse du suppositoire.

Les Suppositoires 'Enule' sont faciles à introduire, ils sont propres dans leur usage, très commodes, et leur rétention est certaine. Avant l'introduction, ils conservent leur forme et leur consistance, et sont d'une manipulation aisée ; lorsqu'ils sont dans le rectum, les constituants actifs se trouvent libérés à la température normale du corps et agissent d'une façon continue et uniforme. Vider le gros intestin avant d'administrer des suppositoires.

Le PROFESSEUR CASPARI dit dans son *Treatise on Pharmacy* :

"La forme usuelle des suppositoires rectaux est celle d'un cône au sommet arrondi ; mais la difficulté que l'on éprouve à faire passer du premier coup ces suppositoires dans le rectum a amené *H. S. Wellcome, de Londres, à leur donner une forme nouvelle.* Les grands avantages de ce perfectionnement sont évidents si l'on considère que l'extrémité renflée est introduite la première dans le rectum, et qu'aussitôt que le plus grand diamètre a franchi l'anus, l'expulsion du suppositoire devient impossible par cette contraction même du sphincter qui rend si difficile la rétention des suppositoires coniques ordinaires."

'Enule' Suppositoires Rectaux—*suite*

Préparations

SUPPOSITOIRE RECTAL 'ENULE' DE GLYCÉRINE

[VOIR LISTE B. W. & Cie]

Chaque suppositoire contient 95 % de glycérine pure anhydre. Ils sont livrés en deux grosseurs—l'une pour les adultes, l'autre pour les enfants.

SUPPOSITOIRE RECTAL 'ENULE' D''HEMISINE,' 0 gr. 001

[VOIR LISTE B. W. & Cie]

Employé dans les inflammations de la muqueuse du rectum, et contre les fistules, fissures, ulcères et hémorrhoïdes. *(Voir aussi page 41)*

Les Suppositoires Rectaux 'Enule' doivent être gardés dans un endroit frais et sec.

Une liste complète des Suppositoires Rectaux 'Enule' se trouve dans la liste des prix à la fin du volume.

'Epinine'

Peu de temps après la découverte et l'isolation du principe actif de la moelle surrénale, un grand nombre de recherches, ayant pour but de le synthétiser, furent entreprises. Cette synthèse fut accomplie presque simultanément par Stolz et Dakin, la substance obtenue étant la modification racémique, optiquement inactive, la base naturelle étant lævogyre. Cushny montra que l'action de la substance synthétique sur la pression sanguine n'avait qu'une puissance égale à la moitié environ de celle du principe actif naturel, la base dextrogyre ayant seulement une petite partie de l'activité de la lævogyre. Ensuite la base lævogyre a été isolée avec succès du mélange racémique. Plus récemment, un grand nombre de substances synthétiques, possédant, à un plus ou moins grand degré, l'action de l'adrénine, ont été soumises à des essais physiologiques aux Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques.

L'action du principe surrénal naturel ressemble beaucoup à celui du vrai système sympathique : c'est-à-dire que les fibres du muscle et les cellules de la glande qui sont innervées par le sympathique répondent, habituellement, de même façon à l'action de la moelle surrénale. Certaines différences dans le mode de réponse furent trouvées en recherchant les actions d'un grand nombre de substances synthétiques se rapprochant de l'adrénine.

Toutes ces substances appartiennent à la classe des amines ou ammoniaques substituées. Cependant, l'action générale de la série entière présente une relation définie avec l'action du vrai système sympathique, et le terme "sympathomimétique" a été proposé par Barger et Dale *(Journal of Physiology*, 1910, vol. XLI, *pages* 19–59*)* pour désigner la forme d'action de tout le groupe de substances.

La série des amines qui possède l'action la plus marquée similaire à celle de l'adrénine sont les dérivés de la Pyrocatéchine, par exemple, ceux contenant les deux groupes hydroxyles du

'Epinine' —*suite*

phénol dans la position de 3 à 4 relativement à la chaîne latérale. Parmi ce groupe est 3 : 4-Dihydroxyphényléthylméthylamine, ou 'Epinine,' qui fut pour la première fois synthétisée dans les laboratoires des Usines Chimiques 'Wellcome' (Pyman, *Journ. Chem. Soc. Trans.*, 1910, vol. XCVII, *p.* 266).

Celle-ci a la formule : $C^6H^3(OH)^2CH^2CH^2AzH(CH^3)$ et se rapproche beaucoup de l'adrénine elle-même, comme le montre la formule ci-dessous.



'Epinine'



Adrénine

On verra que l' 'Epinine' ne diffère de l'adrénine que par l'absence d'un groupe hydroxyle alcoolique dans la chaîne latérale.

Donc l' 'Epinine' peut être décrite chimiquement comme 3 : 4-Dihydroxyphényléthylméthylamine, et l'adrénine comme 3 : 4-Dihydroxyphénylhydroxyéthylméthylamine.

L' 'Epinine' est un composé cristallin incolore, qui fond à 188°–189° C., et forme, avec les acides, de beaux sels cristallins. Par ce moyen il peut être purifié sans peine.

L' 'Epinine' a été soumise à de très nombreuses expériences pharmacologiques. Sa propriété la plus remarquable est, comme l'adrénine, de causer une augmentation marquée de la pression sanguine. L'augmentation de la pression sanguine produite par l'injection intraveineuse d' 'Epinine' fut comparée à celle produite par l'adrénine et par d'autres amines.

Les activités des substances variées se rapprochant de l' 'Epinine' et de l'adrénine peuvent être désignées comme les réciproques des doses nécessaires pour produire des augmentations égales de la pression sanguine atteignant presque le maximum, en ayant soin de faire les injections d'un volume uniforme et à intervalles égaux. On trouva que, chez la chatte, l'activité stimulante de l' 'Epinine,' comparée à celle de l'adrénine, était comme 1 est à 10. Mais on verra, d'après les tracés, que l'augmentation de la pression sanguine produite par l' 'Epinine' persiste plus longtemps que celle produite par une dose d'adrénine, qui augmente la pression à un maximum égal. L'action de l' 'Epinine' est similaire dans tous les autres points de vue à celle du principe actif surrénal naturel. L'augmentation de la pression sanguine par injection intraveineuse est due en grande partie à la contraction des artérioles, ainsi qu'à l'augmentation de la force du battement du cœur.

'Epinine'—*suite*

Appliquée localement à une muqueuse, l' 'Epinine' produit une constriction marquée des capillaires, et, par conséquent, une anémie locale. La dilatation de la pupille, la contraction de l'utérus gravide d'une chatte et l'inhibition de la contraction du même organe non gravide, la secrétion de la salive, qui sont les caractéristiques du principe surrénal naturel, sont tous produits par l' 'Epinine.' Une solution au 1000e, répandue dans l'œil, produit une pâleur marquée et soutenue de la conjonctive.

TRACÉS AU KYMOGRAPHION
MONTRANT LES EFFETS DE L''EPININE' ET DE L'ADRÉNINE SUR LA PRESSION SANGUINE



A = Injection de 0 mgr. 5 d''Epinine'
B = Injection de 0 mgr. 05 d'Adrénine

Noter les hauteurs égales de A et B, mais la plus grande persistance de A.

L' 'Epinine' possède un précieux avantage sur le principe actif surrénal naturel, car ses solutions sont plus stables et moins aptes à se détériorer. Étant une préparation synthétique pure, sa composition et ses caractères sont constants et on peut toujours avoir confiance en elle pour produire l'action caractéristique de l'extrait de la glande surrénale. Les solutions d' 'Epinine' peuvent être stérilisées sans entrer en décomposition.

Qualitativement, les actions de l' 'Epinine' et du principe surrénal naturel sont similaires. Quantitativement, le rapport de leurs activités est comme 1 est à 10. En conséquence, pour

'Epinine' *suite*

produire les effets thérapeutiques bien connus d'une solution au 1000e du principe surrénal naturel, on doit employer une solution d' 'Epinine' au 100e.

L' 'Epinine' peut être diluée par de la solution saline normale, suivant la dose requise.

Les usages de l' 'Epinine' correspondent sous tous les rapports à ceux de l'extrait surrénal naturel. Elle est principalement employée pour produire une hémostasie et une ischémie locales. Appliquée sur une muqueuse quelconque du corps, l' 'Epinine' a un effet ischémique local, en raison de son action vaso-constrictrice directe sur les capillaires. De nombreux rapports cliniques confirment son action styptique marquée. Un rapport établit qu'elle a été trouvée de valeur dans des résections sous-muqueuses de la cloison nasale.

La table suivante, basée sur des rapports cliniques, donne les principales indications pour l'usage thérapeutique de l' 'Epinine.'

MÉTHODE D'ADMINISTRATION	USAGE	DOSE OU FORCE EMPLOYÉE
Application locale	Astringent hémostatique. Pour les surfaces coupées ou écorchées et les muqueuses	Une solution de 1 : 1000 jusqu'à 1 : 100 peut être employée. La première est obtenue en diluant une partie d' 'Epinine' dans 9 parties de solution saline normale
Application sur l'œil	Astringent dans la conjonctive, l'iritis, etc.	Placer un produit d' 'Epinine' 'Tabloïd' (Ophthalmique) sur la conjonctive et répéter si c'est nécessaire. Une solution d' 'Epinine' au 1000e peut également être employée pour cet usage
Administration rectale	Astringent hémostatique pour hémorrhoïdes, fissures, etc.	On peut employer une solution d' 'Epinine' au 100e
Application aux dents et aux gencives. Pour l'anesthésie locale par injection sous-cutanée	Hémostatique pour les travaux dentaires	De 0 cmc. 5 à 1 cmc. d' 'Epicaine' ou 'Epicaine' 'Vaporole'; ou une solution d' 'Epinine' au 500e peut être employée pour cet usage, combinée avec une solution de chlorhydrate de cocaïne à 2 : 100

En ce qui concerne la valeur de l'administration orale, et des injections hypodermiques intraveineuses et intramusculaires d' 'Epinine,' il n'existe encore que peu de rapports cliniques : cependant, la très grande ressemblance qui existe entre son action et celle de l'adrénine indique que l' 'Epinine' peut être donnée aux doses et aux forces indiquées par le tableau ci-dessous.

'Epinine'—*suite*

MÉTHODE D'ADMINISTRATION	USAGE	DOSE OU FORCE EMPLOYÉE
Administration orale	(1) Effet local sur la muqueuse gastro-intestinale. Vaso-constricteur. Astringent hémostatique	Solution d' 'Epinine' au 100e. Dose : 0 cmc. 3
	(2) Effet général après absorption—tonique et stimulant—sur le système nerveux sympathique, le système circulatoire et l'utérus	Solution d' 'Epinine' au 100e. Dose : 0 cmc. 9
Injection hypodermique	Dans l'asthme	Solution d' 'Epinine' au 100e. Dose : de 0 cmc. 3 à 0 cmc. 6
Injection intraveineuse	Stimulant dans la faiblesse cardiaque et le collapsus	On peut employer de 10 cmc. à 50 cmc. de solution d' 'Epinine' de 1 : 25 000 à 1 : 5000, dans la solution saline normale
Injection intramusculaire	Stimulant de l'utérus dans l'hémorrhagie *post partum*	On peut employer une solution d' 'Epinine' au 1000e dans la solution saline normale.

Préparations

'EPININE' (au 100e), en flacons de 10 cmc. et de 25 cmc.
[VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Les concentrations varient du 1 : 10 000 au 1 : 100

'EPININE' 'TABLOID' (OPHTHALMIQUE) (AC), 0 gr. 006
[VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un produit doit être placé sur la conjonctive où il se trouve immédiatement dissous ; où bien dans 0 cmc. 6 d'eau pour produire une solution de 1 : 100. Des solutions de 1 : 100 à 1 : 1000, et même plus faibles, sont utiles pour l'usage général en oculistique.

COMPOSÉ D' 'EPININE' 'TABLOID' [VOIR LISTE B. W. & Cie]

'Epinine,'	0 gr. 000065
Chlorhydrate d'héroïne,	0 gr. 00065
Poudre d'ipécacuanha,	0 gr. 0013
Acide benzoïque,	0 gr. 0016
Essence de gaulthérie,	* 0 gtt. 08 (0 cmc. 002)

* Compte-gouttes international, Bruxelles, 1902

MODE D'EMPLOI.—Un produit, dissous dans la bouche, dans chaque période de une ou deux heures.

'EPININE' 'VAPOROLE' (au 100e), en ampoules de 1 cmc.
[VOIR LISTE B. W & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Les concentrations varient du 1 : 10 000 au 1 : 100.

'Epinine'—*suite*

'EPICAINE' ('Epinine' et Chlorhydrate de Cocaïne), en flacons de 10 cmc.

Chaque cmc. renferme 'Epinine,' 0 gr. 0003 et Chlorhydrate de Cocaïne, 0 gr. 02.

MODE D'EMPLOI.—De 0 cmc. 5 à 1 cmc., injecté dans les gencives, ou sous la peau, pour la production de l'anesthésie locale.

'EPICAINE' 'VAPOROLE' ('Epinine' et Chlorhydrate de Cocaïne) [Von Gerr B. W. & Cie]

'Epinine,'	0 gr. 0003
Chlorhydrate de cocaïne,	0 gr. 02
Eau,	ad 1 cmc.

MODE D'EMPLOI.—De 0 cmc. 5 à 1 cmc., injecté hypodermiquement, pour la production de l'anesthésie locale dans les travaux dentaires.

'Ergamine'

L''Ergamine' (β-Iminazolyléthylamine) est une base organique se présentant dans l'ergot et ses extraits et particulièrement dans ses préparations aqueuses.

C'est un dérivé de la base hexone d'histidine par l'élimination du bioxyde de carbone, un changement qui peut être produit par quelques bactéries putréfactives aussi bien que par le fongus de l'ergot, et qui a été également produit par certains agents chimiques. Sa base peut être maintenant preparée d'une façon chimiquement pure par la synthèse. C'est un stimulant très intense du muscle simple en général, particulièrement de celui de l'utérus, lequel se trouve affecté même par de faibles traces de cette substance très puissante.

TRACÉ AU KYMOGRAPHION



démontrant la contraction de l'utérus (non gravide) d'une chatte par une injection intraveineuse de 1 mgr. d''Ergamine,' la moelle épinière ayant été incisée au préalable.

'Ergamine'—*suite*

Chez les rongeurs, elle produit une élévation de la pression sanguine, causant chez le cobaye une constriction asphyxiante des bronchioles. Chez les carnivores et chez le singe (probablement chez l'homme), elle a une action plus faible sur les bronchioles et occasionne un abaissement de la pression sanguine due à la vaso-dilatation générale.

L'' Ergamine ' peut être ordonnée dans les cas où l'on désire une rapide contraction de l'utérus, par exemple dans l'hémorrhagie *post partum*.

Préparation

' ERGAMINE ' ' TABLOID ' (HYPODERMIQUE), 0 gr. 001
[VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un, injecté hypodermiquement ou intramusculairement, pour produire la contraction de l'utérus. La dose ne doit être augmentée qu'avec de grandes précautions.

Ergotoxine

L'ergotoxine est un nouvel alcaloïde de l'ergot de seigle, produisant une stimulation marquée de l'utérus, et élevant la pression sanguine par son action vaso-motrice.

L'Ergotoxine ' Tabloid ' (Hypodermique) présente ce principe actif sous la forme d'un sel soluble à l'état chimiquement pur. Elle s'emploie principalement pour prévenir ou arrêter les hémorrhagies puerpérales.

Préparations

ERGOTOXINE ' TABLOID ' (HYPODERMIQUE), 0 gr. 00065
[VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un ou deux, dissous dans l'eau et injectés sous la peau ou dans le tissu musculaire.

ERGOTOXINE ET SULFATE DE MORPHINE ' TABLOID ' (HYPODERMIQUE) [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Ergotoxine,	0 gr. 00065
Sulfate de morphine,	0 gr. 011

MODE D'EMPLOI.—Un ou deux dissous dans de l'eau et injecté sous la peau ou dans le tissu musculaire.

ERGOTOXINE ET SULFATE DE STRYCHNINE ' TABLOID ' (HYPODERMIQUE) [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Ergotoxine,	0 gr. 00065
Sulfate de strychnine,	0 gr. 0032

MODE D'EMPLOI.—Un dissous dans de l'eau et injecté sous la peau ou dans le tissu musculaire.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Ernutin'

Les effets caractéristiques sur la pression sanguine et sur l'utérus que produit l'administration de l'ergot sont dus à certains principes actifs. Beaucoup de préparations d'ergot, qui ne contiennent que peu ou point de ces principes, donnent des résultats négatifs, voire même nuisibles. Les Produits ' Ernutin '

'Ernutin'—*suite*

présentent ces principes actifs spécifiques à un état de pureté qui n'a jamais été approché jusqu'ici. Les Produits 'Ernutin' sont exempts de substances concomitantes inutiles, et produisent l'effet thérapeutique désiré d'une façon exacte et certaine.

Il sont titrés physiologiquement par l'observation de leurs effets sur la fonction vaso-motrice du système nerveux sympathique. On leur assure par ce moyen un degré d'activité uniforme.

(Pour de plus amples détails, voir la brochure spéciale)

Les préparations 'Ernutin' doivent être tenues à l'abri de la lumière.

Préparations

'ERNUTIN' (POUR L'ADMINISTRATION PAR LA BOUCHE) [B. W. & Cie]

Flacons de 30 cmc., 112 cmc. et 450 cmc.

MODE D'EMPLOI.—1 cmc. 5 à 3 cmc. 5.

'ERNUTIN' 'VAPOROLE'

Ampoules contenant 0 cmc. 6 de solution stérilisée.

MODE D'EMPLOI.—Pour injection hypodermique ou intramusculaire, 0 cmc. 3 à 0 cmc. 6.

Dans la parturition on recommande de ne pas administrer l' 'Ernutin' avant la fin de l'accouchement.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Eucaïne, Lactate d'

L'eucaïne, semblable à la cocaïne comme anesthésique, est moins toxique. Les solutions du lactate peuvent être stérilisées par ébullition sans se décomposer. Le lactate d'eucaïne est extrêmement soluble, des solutions à 20 pour cent pouvant s'obtenir dans l'eau froide.

On emploie des solutions à 2 pour cent pour les yeux, et pour la laryngoscopie et la rhinoscopie ; de 4 à 8 pour cent pour le nez avant de faire le galvano-cautère ; de 6 à 8 pour cent pour l'ablation des amygdales ; et de 2 à 4 pour cent pour passer les sondes et faire les examens endoscopiques.

Pour les opérations dentaires, on emploie généralement des solutions à 2 pour cent, quoique on puisse en employer de beaucoup plus concentrées. Dans la chirurgie générale, le lactate d'eucaïne s'emploie comme anesthésique local par injections hypodermiques faites avec des solutions à 4 pour cent.

Préparations

LACTATE D'EUCAÏNE 'TABLOID' (HYPODERMIQUE), 0 gr. 022 et 0 gr. 065 [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—De 0 gr. 02 à 0 gr. 15, dissous (selon l'emploi que l'on veut en faire) dans de l'eau tiède, et injecté sous la peau, ou dans les gencives pour produire une anesthésie locale.

Eucaïne, Lactate d'—*suite*

LACTATE D'EUCAÏNE 'SOLOID,' 0 gr. 065 et 0 gr. 324
[VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Très soluble ; on peut facilement préparer des solutions à 20 pour cent avec de l'eau froide.

COCAÏNE ET EUCAÏNE 'SOLOID' N° 2 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Chlorhydrate de cocaïne,	0 gr. 025
Lactate d'eucaïne,	0 gr. 025

LACTATE D'EUCAÏNE 'VAPOROLE,' 0 gr. 01 dans 1 cmc.
[VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un cmc. injecté hypodermiquement pour la production de l'anesthésie locale.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Extrait de Malt 'Kepler' [VOIR LISTE B. W. & Cie]

L'Extrait de Malt 'Kepler' fournit, sous une forme concentrée, agréable et digestible, les constituants qui sont essentiels pour remplacer les tissus, et son emploi est indiqué dans beaucoup de conditions dans lesquelles l'assimilation et la nutrition sont défectueuses.

Cet extrait est préparé avec la plus belle orge maltée en hiver, une céréale fortement azotée. Il possède le véritable ferment diastatique du malt et se trouve riche en maltose, en phosphates et en albuminoïdes. Sa diastase aide puissamment la digestion des farineux, et est moins facilement détruite par la chaleur que la diastase animale : car on constate son activité à une température de dix degrés au-dessus de celle qui détruit le ferment de la glande salivaire.

Dans les ulcères et les catarrhes gastriques, dans la diarrhée infantile, la dyspepsie et la diarrhée des phthisiques, l'Extrait de Malt 'Kepler' peut s'administrer avec avantage en petites doses répétées, soit pur, soit dans du lait peptonisé.

Les enfants maigres, pâles et d'une stature au-dessous de la moyenne profitent rapidement sous un régime continu de cet extrait, qu'on peut étaler sur du pain comme le miel, ou substituer au sucre, pour sucrer les desserts des dyspeptiques. On peut le prendre aussi étalé entre deux biscuits comme un sandwich. Pris avant et après les couches, il augmente la quantité de lait et en améliore la qualité.

MODE D'EMPLOI.—Donner depuis une cuillerée à café jusqu'à deux cuillerées à dessert de l'extrait pur, mélangé aux aliments farineux ; ou, comme boisson, étendu avec de l'eau gazeuse ou encore avec du lait. Ne pas mélanger l'extrait à la nourriture pendant la cuisson, mais l'ajouter quand celle-ci est suffisamment refroidie pour être mangée.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Voir aussi Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler,' *page* 42

Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Fer et d'Arsenic, Composé de

C'est une combinaison merveilleuse de toniques. Indiquée dans la faiblesse nerveuse, l'anémie et la débilité générale. On trouvera ce produit spécialement utile dans l'anémie et la convalescence prolongée après les fièvres.

Préparation

COMPOSÉ DE FER ET D'ARSENIC 'TABLOID' [B. W. & Cie]

Hypophosphite de fer,	0 gr. 13
Sulfate de quinine basique,	0 gr. 065
Acide arsénieux,	0 gr. 0013
Sulfate de strychnine,	0 gr. 0013

(Dragéifié ou non)

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à trois, avec un peu d'eau deux ou trois fois par jour, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Glande Pituitaire

Un extrait de la substance infundibulaire de la glande produisant une élévation puissante et durable de la pression sanguine lorsqu'il est injecté, soit intraveineusement, soit intramusculairement. Son action possède des avantages marqués sur les autres principes, notamment sur ceux de l'extrait surrénal, qui ne produisent qu'une élévation passagère de la pression sanguine. Il ralentit les battements du cœur quoique les renforçant, et il occasionne une sécretion abondante d'urine, ainsi que la contraction de l'utérus. Après la parturition, l'extrait infundibulaire peut être employé pour occasionner la contraction de l'utérus et on l'emploie généralement pour l'action qu'il produit sur l'utérus dans tous les cas où on fait usage de l'ergot. Il augmente la force des douleurs de l'enfantement ainsi que leur fréquence, et s'est montré de grande valeur dans les cas de shock ou de collapsus en raison de l'élévation prolongée qu'il produit sur la pression sanguine. Son emploi comme diurétique est également recommandé et il est indiqué comme alternatif à la digitale dans les maladies cardiaques, où il produit un renforcement et un ralentissement des battements du cœur. Dans la fièvre typhoïde, l'extrait pituitaire a été ordonné pour maintenir la pression sanguine, ainsi que pour favoriser le sommeil et opérer une action contraire dans la toxicohémie. Dans la débilité cardiaque post-influenzale, il semble restorer l'activité normale des fonctions du système cardio-vasculaire, et ce, d'une manière frappante. L'extrait pituitaire a été également trouvé de grande valeur dans les cas de parésie intestinale et d'atonie qui suivent les opérations. Lorsque l'on désire obtenir l'urine d'un rein au moyen d'un ségrégateur, l'extrait pituitaire est d'utilité pour exciter un épanchement. Dans le goître exophthalmique, l'extrait pituitaire calme la nervosité, facilite le sommeil, ralentit les battements du cœur, augmente la pression du sang, amoindrit et même quelquefois arrête entièrement le tremblotement.

L'extrait pituitaire est contre-indiqué chez les malades âgés ayant des artères fragiles.

DIAGRAMME DÉMONTRANT L'ACTION DE L'EXTRAIT D'HYPOPHYSE 'VAPOROLE' SUR LA PRESSION DU SANG FRÉQUENCE DU POULS ET DES DOULEURS D'ENFANTEMENT



La ligne pointillée ..... démontre la pression du sang, et le tracé en noir ———— la fréquence du pouls. Les colonnes en noir indiquent par leur largeur *la durée*, et par leur hauteur *la force* des douleurs utérines. Les intervalles par minute sont indiqués par les traits verticaux.

On verra, comme résultat suivant l'injection d'Extrait d'Hypophyse 'Vaporole,' que la pression du sang augmente, que la fréquence du pouls tombe et que la force et la fréquence des douleurs de l'enfantement augmentent.

(D'après "Hypophysen-Extrakt als Wehenmittel," par le Docteur Franz Jaeger, Erlangen, *Münchener Medizinische Wochenschrift*, N° 6, 1912.)

TRACÉ AU KYMOGRAPHION
MONTRANT LES EFFETS DE L'EXTRAIT D'HYPOPHYSE
SUR L'UTÉRUS ET LA PRESSION SANGUINE



B. P. – Pression sanguine

X = Injection d'extrait de 0 gr. 10 d'infundibulum frais (humide)

La ligne graduée indique des intervalles de 10 secondes

Glande Pituitaire—*suite*

Les symptômes de la paralysie tremblante sont souvent améliorés définitivement par l'extrait pituitaire. L'Hypophyse 'Tabloid' est employée dans l'acromégalie, dans laquelle la glande pituitaire se trouve généralement à l'état maladif.

Le tableau ci-après donne sommairement les principaux effets obtenus et quelques emplois de l'extrait pituitaire.

ACTION PHARMACOLOGIQUE	APPLICATION THÉRAPEUTIQUE
Produit une élévation prolongée de la pression sanguine, ralentit les battements du cœur et en augmente la force. Puissant tonique du cœur	Shock chirurgical et collapsus Asthénie avec basse pression sanguine: Fièvre typhoïde asthénique; Phthisie; Débilité cardiaque faisant suite à l'influenza; Myocardite toxique provenant de maladies infectieuses, par exemple: diphthérie
Stimule la contraction de l'utérus	Parturition prolongée Hémorrhagie et atonie utérines Placenta praevia Éclampsie
Stimule le péristaltisme	Parésie intestinale post-opératoire Hémorrhagie intestinale
Amène une diurèse marquée	Comme diurétique dans les cas autres que les maladies cardiaques ou des reins
Augmente la sécrétion du lait	Dans les cas de diminution de production du lait

Préparations

HYPOPHYSE 'TABLOID,' 0 gr. 13 [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un ou deux, augmenter graduellement si nécessaire, trois ou quatre fois par jour, préférablement après les repas.

EXTRAIT D'HYPOPHYSE (INFUNDIBULAIRE) 'VAPOROLE,' 0 cmc. 5 et 1 cmc. [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—De 0 cmc. 5 à 1 cmc. pour injection intramusculaire ou intraveineuse; ou alors dans une solution saline pour l'injection par le rectum.

Glande Thyroïde *(voir page 59)*

Glycérophosphates, Composé de

Renferme un mélange des glycérophosphates de chaux, de soude, de potasse, de magnésie et de fer unis au glycérophosphate de strychnine (0 gr. 00009), à la pepsine, la diastase et la cola, équivalant à 2 cmc. 60 du sirop-type de glycérophosphates.

Glycérophosphates, Composé de—*suite*

Le phosphore contenu dans le produit 'Tabloid,' étant à l'état organique dans lequel on le trouve dans l'organisme, s'assimile avec rapidité ; la pepsine et la diastase facilitent l'absorption et l'assimilation, tandis que la strychnine agit par son action tonique.

Le composé de glycérophosphates s'emploie dans beaucoup de maladies nerveuses, la phosphaturie, l'anémie, la débilité, le rachitisme, le scorbut et le développement tardif. La supériorité du produit 'Tabloid' tient à la facilité avec laquelle il peut être administré, grâce à son faible volume et à sa parfaite inaltérabilité.

Préparation

COMPOSÉ DE GLYCÉROPHOSPHATES 'TABLOID,' 2 gr. 60
(Dragéifié) [VOIR DETT. B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à quatre, avec de l'eau, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Hazeline' et ses Préparations

L' 'Hazeline,' produit de l'*Hamamelis virginica*, est une préparation des principes volatils de l'écorce fraîche des jeunes pousses de la plante. Elle constitue un fluide styptique et anodin d'une grande valeur. L' 'Hazeline' est exempte de matières colorantes et de résidus inertes, elle est beaucoup plus propre dans son usage et d'une activité beaucoup plus grande que les préparations ordinaires de la plante. On la préconise contre les hémoptysies, les hématémèses, les ménorrhagies et autres hémorrhagies ; comme astringent, dans la diarrhée et l'entérite ; localement, pour les congestions de la muqueuse du nez et du pharynx, pour les hémorrhoïdes ; et en injections uréthrales, dans la gonorrhée.

Préparations

'HAZELINE'—*Hamamelis virginica* [VOIR DETT. B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—De 3 cmc. à 9 cmc. peuvent être administrés par la bouche, et la dose répétée si on le juge nécessaire.

‡ Crème 'Hazeline' ('HAZELINE' CREAM)

[VOIR DETT. B. W. & Cie]

Les propriétés astringentes de l' 'Hazeline,' en combinaison avec l'action assouplissante d'un agréable émollient naturel d'une finesse et d'une pureté exceptionnelles, sont présentées sous une forme qui augmente beaucoup la valeur de la préparation. Elle calme les irritations, guérit les gerçures et fait disparaître les rugosités de la peau ; c'est aussi une application parfaite pour l'eczéma, l'acné, l'acné rosacée et autres affections de la peau. La Crème 'Hazeline' s'emploie couramment dans le traitement des hémorrhoïdes ; à cet effet l'on peut obtenir des bouts en vulcanite se vissant sur le tube compressible qui la contient.

MODE D'EMPLOI.—Appliquer directement ou avec du lint ou charpie.

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

‡ "Neige 'Hazeline'" ("'Hazeline' Snow")

[Voir aussi B. W. & Cie]

La "Neige 'Hazeline'" est une préparation contenant une forte proportion d' 'Hazeline' et spécialement préparée pour son application sur la peau, qu'elle pénètre promptement sans laisser trace de graisse, la rendant souple et veloutée, et faisant disparaître toute rougeur ou rugosité. Unique en son genre, elle fournit un moyen de faire ressortir les propriétés thérapeutiques de l' 'Hazeline' autrement que sous une forme liquide, quand les corps gras ne sont pas tolérés. Plus hygiénique que les poudres de toilette, la "Neige 'Hazeline'" est une application de grande valeur pour le teint abîmé, surtout après les cérémonies sociales dans des salles pleines de monde. Elle est d'un emploi fort agréable après les exercices du corps. Excellente pour faire passer le feu du rasoir, elle calme immédiatement tout irritation.

Mode d'emploi.—Appliquer directement ou avec du lint ou charpie.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Hemisine'

Le mot 'Hemisine' est une marque qui désigne des produits renfermant le principe actif de la moelle de la substance surrénale et livrés par la maison Burroughs Wellcome & Cie.

Les préparations d' 'Hemisine' sont fournies à l'état liquide et à l'état solide, et sont titrées physiologiquement et uniformément de façon à représenter l'activité intégrale de la moelle de la glande surrénale. Elles sont stables dans tous les climats, et leur valeur thérapeutique est certaine et précise.

L' 'Hemisine' au 1000e est fournie en flacons ambrés bouchés à l'émeri, et aussi en ampoules 'Vaporole' hermétiquement scellées. Cette solution, résultat d'expériences et de recherches persévérantes, est unique par sa stabilité, son degré d'activité et son absence de produits irritants, et remplace avantageusement les solutions ordinaires du principe de la glande surrénale.

Les concentrations employées varient du 250 000e au 1000e.

(Voir aussi la littérature spéciale relative à l' 'Hemisine')

Préparations

'Hemisine' (au 1000e), en flacons ambrés de 5 cmc. et 10 cmc.

Un approvisionnement de Chlorure de Sodium 'Soloid,' 0 gr. 23, est fourni avec ces produits, pour servir à la dilution.

'Hemisine' 'Tabloid,' 0 gr. 0003 et 0 gr. 001

'Hemisine' 'Tabloid' (Ophthalmique), (CC), 0 gr. 0006

'Hemisine' 'Soloid,' 0 gr. 0012 et 0 gr. 005

'Hemisine' 'Enule,' 0 gr. 001

'Hemisine' 'Vaporole' (au 1000e), 1 cmc.

Mode d'emploi.—Voir la brochure spéciale.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler' [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Cette préparation présente l'huile de foie de morue la plus fine incorporée à l'Extrait de Malt 'Kepler' de telle façon que l'assimilation en est absolument assurée. L'Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler' a un goût si agréable que même les malades les plus difficiles et les enfants la prennent avec plaisir. Les doses administrées doivent être petites pour commencer, et augmentées graduellement. On peut juger de sa valeur par l'augmentation rapide des forces et du poids du malade.

Les phthisiques et les rejetons de parents strumeux ou poitrinaires, qui ont une tendance à maigrir et qui perdent l'appétit et le pouvoir de digérer des aliments sains, reconnaissent une grande amélioration dans leur état après avoir pris régulièrement des doses modérées d'Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.' Dans la malnutrition et le marasme, dans la convalescence qui suit les fièvres, enfin dans toutes les maladies qui causent une perte des tissus, cette préparation est d'une utilité remarquable.

MODE D'EMPLOI.—Depuis une cuillerée à café jusqu'à deux cuillerées à dessert de ce produit, deux ou trois fois par jour, après les repas, soit pure, soit étalée sur du pain, soit mélangée avec un peu de lait ou d'eau.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Voir aussi Extrait de Malt 'Kepler,' *page* 37

Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt et les Hypophosphites 'Kepler' [VOIR LISTE B. W. & Cie]

L'Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt et les Hypophosphites 'Kepler' est ordonnée dans les maladies qui causent la perte des tissus, dans le marasme et le rhumatisme chronique. L'extrait de malt et l'huile de foie de morue fournissent de la graisse facile à digérer avec un aliment propre à former les tissus, tandis que les hypophosphites sont de puissants toniques et altératifs. L'administration de ce produit dans les cas précités est suivie d'une amélioration marquée.

Dans les affections des poumons, surtout dans la période prétuberculeuse de la phthisie, dans les bronchites, et pour les malades qui ont des tendances à avoir des complications sérieuses du côté de la poitrine, l'Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt et les Hypophosphites 'Kepler' est d'un immense secours. Les enfants faibles et enclins au rachitisme éprouvent par son emploi une amélioration marquée.

Elle contient approximativement par 100 cmc. :

Hypophosphite de chaux,	0 gr. 91
Hypophosphite de potasse,	0 gr. 45
Hypophosphite de soude,	0 gr. 45

MODE D'EMPLOI.—Depuis une cuillerée à café jusqu'à deux cuillerées à dessert, deux ou trois fois par jour, après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Hydrastine, Composé d'

Les ingrédients de ce composé sont prescrits dans diverses affections utérines pour contrôler l'hémorrhagie. L'hydrastine et l'ergotine sont des astringents et des stimulants de l'utérus, tandis que le tannate de cannabine exerce probablement une action sédative sur cet organe. La combinaison est indiquée dans les hémorrhagies provenant de fibroïdes, dans l'hémorrhagie puerpérale, et dans la ménorrhagie et la métrorrhagie généralement.

Préparation

COMPOSÉ D'HYDRASTINE 'TABLOID' [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Chlorhydrate d'hydrastine,	0 gr. 016
Extr. d'ergot (Ergotine),	0 gr. 032
Tannate de cannabine,	0 gr. 032

(Dragéifié ou non)

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à trois, avec un peu d'eau ; répéter si c'est nécessaire.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Hygiéniques, Bandes *(voir page 23)*

‡ Hypodermiques, Produits 'Tabloid'

[VOIR LISTE B. W. & Cie]

Par la méthode hypodermique l'action physiologique des drogues s'effectue rapidement. Injectés en solutions, les principes actifs sont vite absorbés, et l'action est dans beaucoup de cas plus sûre que lorsque les drogues sont administrées par voie stomacale. C'est pour ces raisons, qu'on adopte les injections hypodermiques dans les cas pressés lorsqu'il est de la plus grande importance que ces drogues soient pures, qu'elles soient d'une action certaine, d'une grande précision de dosage et prêtes à servir immédiatement. Les Produits Hypodermiques 'Tabloid' possèdent toutes ces qualités, et n'ont aucun des désavantages des solutions préparées d'avance, qui peuvent subir des altérations et devenir septiques et irritantes. Les préparations Hypodermiques 'Tabloid' restent inaltérées pendant des années sous n'importe quel climat. Avec ces préparations on peut préparer la dose voulue au moment désiré et de la façon suivante : Aspirer un peu plus d'un ½ gr. d'eau stérilisée dans la seringue, enlever le bec, et faire tomber un produit Hypodermique 'Tabloid' dans le cylindre (*fig.* 1). Replacer le bec. Ensuite, tenant toujours l'embouchure de la seringue en l'air, pousser doucement le piston de façon à expulser l'air



FIG. 1

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Hypodermiques, Produits 'Tabloid'—*suite*

de la seringue, puis après avoir placé l'index (stérilisé ou recouvert d'un morceau de caoutchouc stérilisé ou de charpie aseptique) sur l'embouchure, tirer sur le piston de façon à créer un vide partiel dans le cylindre (*fig.* 2). Remuer doucement. La dissolution se fait presque immédiatement sans la perte de la plus légère trace de la médication. On place alors l'aiguille en position sur l'embouchure, et l'injection peut se faire (*fig.* 3). Dans les cas où il n'est pas pratique ou possible de faire une injection hypodermique, on peut administrer n'importe quel produit Hypodermique 'Tabloid' par la bouche, en le plaçant sous la langue, où la préparation se trouve promptement absorbée et exerce une action rapide.



Fig. 3



Fig. 2

Une liste complète des Produits Hypodermiques 'Tabloid' se trouve dans la liste des prix à la fin du volume

Hypophosphites, Composé d'

Contient les hypophosphites de chaux, de potasse, de soude, de manganèse, de fer, de quinine et de strychnine. Les plus petits produits équivalent à une demi-cuillerée à café du sirop-type de composé d'hypophosphites et les plus gros à toute une cuillerée à café.

Le Composé d'Hypophosphites 'Tabloid' présente les principes actifs du sirop dans une condition stable, soluble et commode, et n'a pas le goût désagréable qui caractérise le sirop ordinaire. Ce produit est indiqué dans la phthisie, la débilité, l'anémie et la neurasthénie, dans la convalescence après les maladies graves, dans le rachitisme et en général pour renforcer la nutrition chez les débilités.

Ce produit peut être porté sur soi, ce qui facilite beaucoup le traitement méthodique, le malade continuant à vaquer à ses occupations habituelles.

Préparations

‡ Composé d'Hypophosphites 'Tabloid,' 0 gr. 10 et 0 gr. 20
(Dragéifié) [Voir USTA B. W. & Cie]

Mode d'emploi.—Un ou deux des produits de la plus faible dose, ou bien un produit de dose élevée ; avaler avec un demi-verre d'eau, deux ou trois fois par jour, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Kepler,' Produits *(voir pages 37 et 42)*

Laxatif Végétal

Cette combinaison de drogues végétales forme, selon la dose administrée, un excellent laxatif ou purgatif. Dans la constipation habituelle, un produit, une, deux ou trois fois par jour, assure une action régulière et facile ; tandis que trois, avalés au moment de se coucher, constituent une purge occasionnelle. L'extrait de jusquiame et l'essence de menthe suppriment les douleurs abdominales.

Le succès du Laxatif Végétal 'Tabloid' a donné lieu à beaucoup d'imitations inférieures qui n'ont ni la pureté, ni les effets constants, ni l'action douce de ce produit.

Préparation

LAXATIF VÉGÉTAL 'TABLOID' [B. W. & Cie]

Extr. de composé de coloquinte,	0 gr. 065
Extr. de jalap,	0 gr. 032
Résine de podophylle,	0 gr. 016
Leptandrine,	0 gr. 032
Extr. vert de jusquiame,	0 gr. 016
Extr. de taraxacum,	0 gr. 016
Essence de menthe poivrée,	*q. s.*
(Dragéifié ou non)	

MODE D'EMPLOI.—De un à trois en se couchant, comme purgatif ; ou bien un après les repas, deux ou trois fois par jour, dans la constipation chronique.

(Voir la liste des prix à la fin du volume)

Lithine, Citrate de

Employé avec de très bons résultats dans le traitement de la goutte et des rhumatismes. Étant un dissolvant de l'acide urique, le sel de lithine tend à dissoudre ou à empêcher la formation des dépôts causés par la goutte ou les rhumatismes. Son administration sous la forme d'une boisson effervescente semble augmenter encore la valeur thérapeutique du citrate de lithine. Afin d'assurer les meilleurs résultats, cependant, la préparation effervescente doit être fraîche.

Les préparations effervescentes ordinaires, en granules, ont le désavantage d'être volumineuses et de se détériorer. Le produit 'Tabloid' est commode, de volume restreint et portatif, et est bien moins sujet à s'abîmer au contact de l'air, grâce à la surface relativement petite qu'il offre. Cette préparation forme une boisson effervescente très efficace.

Préparation

CITRATE DE LITHINE 'TABLOID,' 0 gr. 25, *Effervescent*
[B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un ou deux, pulvérisés et ajoutés à un demi-verre d'eau, deux ou trois fois par jour, après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Lodal'

Le 'Lodal' (Chlorure de 6 : 7-Diméthoxy-2-méthyle-3 : 4-dihydro*iso*quinolinium) est un produit résultant de l'oxydation de la laudanosine.

Son action physiologique le classe avec les alcaloïdes cotarnine et hydrastinine, qui s'emploient en thérapeutique pour contrôler les hémorrhagies de l'utérus.

Le 'Lodal,' injecté aux animaux par la voie intraveineuse, cause une élévation de la pression sanguine, légère mais distincte et quelque peu persistante, accompagnée d'un ralentissement des battements du cœur. Cet effet est produit par l'action directe du 'Lodal' sur les muscles du cœur et des artérioles.

L'action du 'Lodal' sur l'utérus est très semblable à celle de l'hydrastinine ; il produit une contraction tonique très marquée de l'utérus, gravide ou non gravide. L'emploi du 'Lodal' a donné en clinique de bons résultats dans des cas d'hémorrhagie et douleurs utérines.

Préparation

'LODAL' 'TABLOID,' 0 gr. 065 *(dragéifié)* [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En avaler un avec un peu d'eau, trois fois par jour.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Malt, Extrait de 'Kepler' *(voir pages 37 et 42)*

Menthol, Composé de, pour Priser (B. W. & Cie)

Combinaison utile de menthol, de chlorure d'ammonium, d'oxychlorure de bismuth, de camphre, de lactate d'eucaïne ($\frac{1}{5}$ pour cent), d' 'Epinine' et de licopode. Ce composé pour priser possède des propriétés astringentes, antiseptiques et anesthésiques locales marquées, et est d'un grand secours dans les catarrhes des muqueuses nasales et la rhinite chronique. On en aspire par le nez à de courts intervalles pour calmer l'irritation et diminuer les éternûments dans la fièvre des foins. Dans le coryza, non seulement il remédie à cette impossibilité que l'on éprouve à respirer par le nez, et calme les lourdeurs de tête, mais aussi il arrête rapidement les écoulements désagréables.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Mercure, Iodure Jaune de

On n'ignore pas que la couleur verte de l'iodure de mercure ordinaire est due a un mélange de mercure à l'état métallique (en proportions indéterminées) avec le véritable iodure de mercure

Mercure, Iodure Jaune de—*suite*

jaune, et que, par conséquent, une préparation de ce genre varie quelque peu dans son action thérapeutique. L'Iodure Jaune de Mercure 'Tabloid' est un iodure de mercure pur et un sel chimique défini. Il ne faut pas le confondre avec la modification jaune de l'iodure mercurique, qui est une préparation peu stable et qui tourne au rouge.

La préparation 'Tabloid' ne contient pas de mercure à l'état métallique, et l'expérience a démontré qu'elle est suffisamment stable si l'on prend les précautions ordinaires pour la conserver. Des essais thérapeutiques portant sur plusieurs années ont aussi prouvé sa valeur.

L'Iodure Jaune de Mercure 'Tabloid' est employé dans le traitement de la syphilis, et combine dans cette maladie les effets du mercure avec ceux de l'iode.

Préparations

IODURE JAUNE DE MERCURE 'TABLOID,' 0 gr. 008 et 0 gr. 025 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un produit de la dose de 0 gr. 008, ou davantage si c'est nécessaire ; ou bien un produit de la dose de 0 gr. 025 ; avaler avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Microscopie, Colorants 'Soloid' pour la

(voir page 130)

Morphine, Sulfate de

Anodin hypnotique, diaphorétique, employé pour diminuer les douleurs et produire le sommeil. La morphine diminue les sécrétions et les mouvements péristaltiques ; elle agit plus vite que l'opium, a une action plus certaine comme anodin et soporifique, et s'adapte spécialement aux injections sous-cutanées.

Le produit 'Tabloid' fournit au médecin un sel de morphine d'une grande pureté, préparé spécialement pour l'usage hypodermique.

Préparations

SULFATE DE MORPHINE 'TABLOID,' 0 gr. 005 ; 0 gr. 008 ; et 0 gr. 01 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En avaler un ou davantage avec un peu d'eau. La dose maxima est de 0 gr. 032.

SULFATE DE MORPHINE 'TABLOID' (HYPODERMIQUE), 0 gr. 01 0 gr. 015 ; 0 gr. 02 ; 0 gr. 03 ; et 0 gr. 05 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En injecter hypodermiquement un du dosage voulu, dissous dans l'eau.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Naso-Pharyngien, Composé

Préparation

COMPOSÉ NASO-PHARYNGIEN 'SOLOID' [B. W. & Cie]

Chlorure de sodium,	0 gr. 454
Borax,	0 gr. 162
Acide borique,	0 gr. 049
Benzoate de soude,	0 gr. 032
Menthol,	0 gr. 0013
Thymol,	0 gr. 00065
Chlorhydrate de cocaïne,	0 gr. 011
Essence de gaulthérie,	*0 gtt. 13 (0 cmc. 003)

* Compte-gouttes international, Bruxelles, 1902

MODE D'EMPLOI.—Un, pulvérisé et dissous dans 30 gr. à 100 gr. d'eau tiède, forme une solution de force voulue pour aspiration par les narines, ou pour gargarisme ou vaporisation. La cocaïne qu'il contient rend ce composé particulièrement utile dans les irritations du nez et de la gorge. On a rapporté que deux produits dans 300 gr. d'eau ont été employés avec beaucoup de succès comme lotion dans la conjonctivite.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

"Neige 'Hazeline'" *(voir page 41)*

'Nizin'

Le 'Nizin,' sel de zinc de l'acide sulfanilique, est un produit nouveau doué d'avantages particuliers. C'est un antiseptique de valeur, facilement soluble dans l'eau, et ne produisant pas d'irritation ni d'effets toxiques. Les rapports cliniques prouvent sa supériorité évidente sur les sels de zinc employés jusqu'ici. Des lavages de l'urèthre et du vagin avec des solutions de 0 gr. 15 à 0 gr. 60 dans 30 gr. d'eau ont donné de très bons resultats. Le traitement ne provoque ni brûlure, ni enflure résultant d'une inflammation quelconque. Des solutions d'un titre de 0 gr. 15 dans 60 gr. d'eau s'emploient contre la gonorrhée ophthalmique, conjonctivite ou autres affections de l'œil, lorsqu'on veut faire des lavages antiseptiques et sédatifs.

Préparations

'NIZIN' 'SOLOID,' 0 gr. 15 et 1 gr. [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Pour injection uréthrale ou vaginale, de un à trois des produits de 0 gr. 15 dissous dans 30 gr. d'eau ; ou bien un produit de 1 gr. dans 200 gr. d'eau.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Noix Vomique, Composé de

Stomachique, tonique général et apéritif. L'aloïne seconde la noix vomique comme stimulant de l'estomac, empêchant aussi la constipation qui est commune dans la neurasthénie et chez les personnes surmenées ou de mœurs sédentaires. La myrrhe réagit contre les douleurs, tandis que le fer et la noix vomique sont des toniques sanguins et nerveux. Cette formule présente une combinaison absolument remarquable pour le traitement de la dyspepsie atonique, le manque d'appétit et la constipation chronique, ces troubles étant tous des symptômes communs dans l'anémie, la débilité nerveuse, ainsi que dans la convalescence qui suit les maladies débilitantes. La dose voulue peut se prendre

Noix Vomique, Composé de—*suite*

régulièrement avant ou après le dîner, et une expérience de longue date démontre qu'une administration prolongée ne diminue pas les effets de la drogue.

Préparation

COMPOSÉ DE NOIX VOMIQUE 'TABLOID' [VOIR DÉTT B. W. & Cie]

Extr. de noix vomique,
Aloïne,
Sulfate de fer,
Poudre de myrrhe,
Poudre de savon, āā 0 gr. 032
(Dragéifié)

MODE D'EMPLOI.—Un ou deux, même trois si c'est nécessaire, pris régulièrement pour la constipation chronique, une demi-heure avant ou après le dernier repas de la journée.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

‡ Ophthalmiques, Produits 'Tabloid'

[VOIR DÉTT B. W. & Cie]

D'une grandeur minuscule et minces comme du papier, d'un poids exact et préparés avec une base inoffensive, ces produits 'Tabloid' sont éminemment adaptés pour application directe aux yeux. Ils sont si parfaitement solubles que l'action caractéristique de la drogue s'effectue avec une grande rapidité.

Le malade doit regarder dans la direction de son nez pendant qu'on lui place le petit disque au coin externe de l'œil. La dissolution complète se fait dans les 30 secondes. Un autre moyen est de rabaisser la paupière inférieure, de placer le produit sur la conjonctive et de maintenir la paupière pendant 30 secondes; au bout de ce temps, la dissolution étant complète, on peut lâcher la paupière.

Une liste complète des Produits Ophthalmiques 'Tabloid' se trouve dans la liste des prix à la fin du volume.

Opium

L'opium à petites doses est un stimulant et souvent un laxatif, mais à fortes doses c'est un anodin, un narcotique et un astringent. Il ne faut le donner qu'avec la plus grande précaution aux enfants. On préconise aussi son emploi dans la bronchite avec sécrétion facile, dans les mauvais fonctionnements du rein, et dans les congestions du cerveau.

Préparations

‡ OPIUM 'TABLOID,' 0 gr. 025 et 0 gr. 065 [VOIR DÉTT B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un des produits de 0 gr. 025 pour l'administration prolongée. Pour une dose isolée, un ou deux des produits de 0 gr. 065, ou bien de deux à cinq de ceux de 0 gr. 025.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

‡ Pansements, Pliés et Comprimés, marque 'Tabloid' [VOIR DÉTT B. W. & Cie]

Les Pansements Pliés et Comprimés 'Tabloid' ont été créés et mis sur le marché par Burroughs Wellcome & Cie. Pour être

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

‡ Pansements, Pliés et Comprimés, marque 'Tabloid'—*suite*

certain d'obtenir ces produits originaux véritables, avoir soin de toujours spécifier la marque 'Tabloid' en faisant les commandes.

Les Pansements Pliés et Comprimés 'Tabloid' constituent des accessoires chirurgicaux supérieurs sous tous les rapports aux pansements ordinaires. Pour leur préparation, les matériaux de qualité parfaite sont soumis à une forte pression sous laquelle ils deviennent d'un volume excessivement réduit, tout en prenant une forme rectangulaire commode.

Les Pansements Pliés et Comprimés 'Tabloid' se déploient aussi facilement que les pansements volumineux ordinaires. Ils sont commodes pour l'emmagasinage ou le transport, et leur enveloppe spéciale les préserve de toute souillure et contamination. Les Pansements Antiseptiques sont surtout remarquables pour l'uniformité avec laquelle ils sont médicamentés sur tous les points de leur surface. Tous les Pansements 'Tabloid' peuvent s'obtenir *stérilisés*—autre progrès important dû à B. W. & Cie.

La portabilité des Pansements Pliés et Comprimés 'Tabloid' les rend précieux pour les trousses à médicaments. Pour les explorateurs, les touristes ou les voyageurs ces pansements sont indispensables. Les bandes triangulaires sont particulièrement utiles dans les premiers secours, d'autant plus que des dessins, montrant leurs divers usages, sont imprimés sur le tissu même.

La différence qui existe entre les Pansements Pliés et Comprimés 'Tabloid' et les pansements ordinaires est frappante, attendu que cinq paquets de Coton Plié et Comprimé 'Tabloid,' de 55 gr. chacun, occupent le même espace qu'un paquet du même poids de l'espèce ordinaire. On trouve le même avantage dans tous les pansements pliés et comprimés fournis sous la marque 'Tabloid.'

Le nouveau mode d'empaquetage des Gazes Pliées et Comprimées 'Tabloid' mérite une attention spéciale. La boîte est confectionnée de façon à permettre d'enlever la quantité de gaze désirée sans avoir à ouvrir tout un côté de la boîte. Ce but est atteint au moyen d'une fente qu'on peut découvrir et recouvrir instantanément en élevant ou en abaissant une petite languette. La gaze reste ainsi effectivement à l'abri de toute contamination.

Le Bandage Ajustable 'Tabloid' pour la tête, récemment créé et introduit par la maison Burroughs Wellcome & Cie, peut satisfaire un besoin longtemps désiré pour les premiers secours.

Les Gazes Pliées et Comprimées 'Tabloid' sont exceptionnelles par la qualité hors ligne du matériel employé et par l'uniformité parfaite de la médication sur leur surface.

Une liste complète des Pansements 'Tabloid' se trouve dans la liste des prix à la fin du volume.

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Para-aminophénylarsonate de Sodium

(voir 'Soamin,' *page* 54*)*

'Pepana'

Les cas sont assez nombreux dans lesquels à la fois la digestion pancréatique et la digestion gastrique sont défectueuses. Si donc, dans ces cas, un seul ferment est donné, soit la pepsine, soit la pancréatine, le malade ne bénéficie qu'en partie, puisque les deux ferments sont nécessaires. Et il est préférable de ne pas les administrer mélangés, car, pour obtenir l'action complète de la pancréatine (qui n'agit que dans un milieu alcalin), celle-ci doit échapper aux sucs acides de la digestion gastrique. Avec la construction spéciale du 'Pepana' 'Tabloid,' quand le produit est administré, la couche externe de sucre se dissout dans l'estomac, exposant ainsi la pepsine, tandis que la pancréatine, recouverte d'une couche de kératine insoluble dans un milieu acide, demeure inaltérée jusqu'au moment où elle pénètre dans l'intestin et y rencontre une sécrétion alcaline ; alors la kératine se dissout et libère la pancréatine, qui produit ensuite son effet utile.

Préparation

'PEPANA' 'TABLOID' [VOIR DÉTAIL B. W. & Cie]

Pepsine,	0 gr. 065
Pancréatine,	0 gr. 065
Lactophosphate de chaux,	0 gr. 065

(Dragéifié)

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à trois entiers, avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour, après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Phénacétine, Composé de

Prescrit couramment pour les céphalées, la névralgie (surtout du nerf trijumeau), pour les douleurs des maladies nerveuses progressives, dans les débuts de l'influenza et dans le rhumatisme articulaire aigu. La caféine réagit contre les effets déprimants que peut causer la phénacétine.

Préparation

COMPOSÉ DE PHÉNACÉTINE 'TABLOID,' N° 2 [VOIR DÉTAIL B. W. & Cie]

Phénacétine,	0 gr. 25
Caféine,	0 gr. 05

MODE D'EMPLOI.—De un à trois ; au besoin répéter après un intervalle.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Photographie, Produits 'Tabloid' pour la

[VOIR DÉTAIL B. W. & Cie]

Cette série fournit des produits chimiques pour la photographie, qui sont d'une pureté exceptionnelle, et exactement divisés en doses voulues pour faire des petites quantités de solution au

Photographie, Produits 'Tabloid' pour la—*suite*

moment désiré. Ils occupent peu de volume, sont portatifs et commodes, et remarquables par leur faculté de conservation.

Une liste complète des Produits 'Tabloid' pour la Photographie se trouve dans la liste des prix à la fin du volume.

Potasse, Chlorate de

Apprécié pour son action locale dans les conditions aphtheuses de la bouche et dans les pharyngites. Intérieurement, il a été employé dans les ulcères gastriques, avec des malades prédisposées aux fausses couches, et aussi comme galactagogue.

Le produit 'Tabloid,' sucé lentement, est plus utile que les gargarismes parce que l'ingrédient reste beaucoup plus longtemps en contact avec la muqueuse.

Préparations

‡ ‡ CHLORATE DE POTASSE 'TABLOID,' 0 gr. 10 ; 0 gr. 25 ; et 0 gr. 324 [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un produit qu'on laisse dissoudre lentement dans la bouche quand c'est nécessaire.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Poudre de Dover (Poudre d'Ipéca Opiacée)

Ce produit, habituellement prescrit comme diaphorétique rapide et efficace, est d'un grand secours dans les inflammations légères et les catarrhes, dans le rhume de cerveau par exemple. On l'administre aussi dans la dysenterie et contre l'insomnie.

Préparations

‡ ‡ POUDRE DE DOVER 'TABLOID' (POUDRE D'IPÉCA OPIACÉE), 0 gr. 016 et 0 gr. 25 [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—De un à quatre pour un adulte. Les produits de la plus faible dose sont destinés aux enfants.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Poudre Grise

La poudre grise est d'une grande valeur pour produire une légère action purgative. Elle convient donc particulièrement aux personnes fébriles ou atteintes de toxicohémie. Elle est largement employée comme apéritif et antiseptique intestinal pour les enfants ; à cause de cette action, aussi bien que pour ses propriétés antiacides, elle est d'un grand secours dans les troubles de la digestion et les fermentations qui se produisent souvent chez les enfants. La poudre grise peut s'employer avec avantage dans la syphilis, surtout pour une administration prolongée, la craie ayant dans ces cas une tendance à empêcher l'irritation causée par le mercure.

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Poudre Grise—*suite*

Préparations

‡ POUDRE GRISE 'TABLOID,' 0 gr. 05 et 0 gr. 15
[VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—La dose varie de 0 gr. 01 à 0 gr. 30 ; les doses faibles étant données à des intervalles rapprochés.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Prises de Composé de Menthol (B. W. & Cie) *(voir page 46)*

Produits 'ENULE' *(voir page 28)* ; HYPODERMIQUES 'TABLOID *(voir page 43)* ; OPHTHALMIQUES 'TABLOID' *(voir page 49)* ; PHOTOGRAPHIQUES 'TABLOID' *(voir page 51)* ; 'SOLOID' *(voir page 55)* ; 'TABLOID' *(voir page 58)* ; 'VAPOROLE' *(voir page 61)*

Quinine Neutre, Sulfate de

La quinine est la principale drogue pour le traitement de la malaria, où elle est non seulement curative mais préventive. C'est un antiseptique et un antipyrétique de grande valeur dans l'influenza, les rhumes de cerveau et autres conditions fébriles. La quinine est largement employée comme stomachique, principalement quand les indigestions sont causées par l'anémie, une mauvaise santé, le manque d'air, etc. ; d'une façon générale, quand l'estomac n'est pas la cause première de la dyspepsie.

Le produit 'Tabloid' présente un bisulfate de quinine neutre d'une grande pureté et d'une grande utilité. Il est facilement soluble dans l'estomac, même quand le contenu de celui-ci est anormal (dans un fort accès de malaria, par exemple), état qui favorise un excès de mucosités ou de bile.

Préparations

‡ SULFATE DE QUININE NEUTRE 'TABLOID,' 0 gr. 065 ; 0 gr. 10 ; et 0 gr. 25 *(dragéifié ou non)* ; 0 gr. 50 *(non dragéifié)*
[VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—La dose varie de 0 gr. 05 comme tonique, à 0 gr. 50 comme antipériodique et antipyrétique. Des doses beaucoup plus fortes sont recommandées par certaines autorités, et sont prises comme prophylactique, ou dans le traitement de la malaria.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

‡ Quinine 'Wellcome,' Sulfate Basique de

La quinine est employée comme agent prophylactique et curatif dans la malaria, et comme antipyrétique dans les conditions fiévreuses généralement. On l'emploie couramment aussi comme antipériodique et tonique dans les névralgies, et comme stomachique quand la mauvaise digestion est causée par la fièvre,

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Quinine 'Wellcome,' Sulfate Basique de—*suite*

l'anémie ou la neurasthénie. Le Sulfate de Quinine Basique 'Wellcome' met à la disposition des médecins un produit d'une pureté si exceptionnelle qu'il se conforme avec honneur aux exigences les plus rigoureuses des diverses pharmacopées.

Il est fourni sous deux formes—en "cristaux serrés" et en "gros flocons." Les "cristaux serrés" occupent environ le tiers de l'espace de la variété ordinaire, et sont plus commodes pour l'emmagasinage et la distribution.

Voir aussi la liste des Produits Chimiques 'Wellcome'

Réglisse, Poudre Composée de

Cette préparation n'irrite pas les intestins et peut s'administrer pendant la grossesse, alors que des purgatifs plus actifs pourraient amener des contractions de l'utérus et provoquer un avortement.

Chaque produit représente : Séné, 0 gr. 30 ; racine de réglisse, 0 gr. 30 ; soufre sublimé, 0 gr. 15, etc. C'est un laxatif doux, spécialement utile pour les femmes et les enfants.

Préparation

‡ POUDRE COMPOSÉE DE RÉGLISSE 'TABLOID,' 2 gr.
[B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à quatre, avec un peu d'eau.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Sirop d'Easton (Phosphate de Fer avec Quinine)

Présente la quantité de fer, de quinine et de strychnine contenue dans des doses correspondantes du sirop ordinaire. Bien connu comme un tonique général de grande valeur, le sirop d'Easton est prescrit pour l'anémie, la neurasthénie, la débilité générale et la convalescence après l'épuisement causé par certaines maladies. Le sirop ordinaire a les désavantages suivants : Son goût est fort désagréable, il est sujet à s'oxyder, et il perd de son activité en se précipitant. Les produits 'Tabloid,' étant dragéifiés, obvient à ces défauts.

Préparations

‡ SIROP D'EASTON (PHOSPHATE DE FER AVEC QUININE ET STRYCHNINE) 'TABLOID,' 2 gr. 60 et 5 gr. 20 *(dragéifié)*
[B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un ou deux des produits de petite dose, ou bien un produit de dose plus forte ; avaler avec un demi-verre d'eau, deux ou trois fois par jour, pendant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Soamin'

Le 'Soamin' (Para-aminophénylarsonate de Sodium) est une préparation organique d'une toxicité faible par comparaison avec celle des préparations arsenicales inorganiques. Il contient 22,8

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Soamin'—*suite*

pour cent d'arsenic (As) et est soluble dans 3 parties d'eau à la température du corps et dans 5 parties d'eau à 16° C. Il est employé dans la syphilis, la malaria, la trypanosomiase et autres maladies protozoaires.

Il a aussi donné de bons résultats dans les maladies de peau telles que le psoriasis et le lichen, dans l'anémie, et comme palliatif dans les carcinomes. Certains cas d'atrophie optique étant parfois survenus après l'emploi d'arylarsonates, on ne devra administrer ces sels qu'avec la plus grande prudence. *(Pour les précautions à prendre, voir le livret sur "Les Arylarsonates.")*

Préparations

'SOAMIN,' flacons de 5 gr. et 30 gr. [B. W. & Cie]

'SOAMIN' 'TABLOID,' 0 gr. 065 et 0 gr. 20 [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI—

Pour Administration orale :

De 0 gr. 016 à 0 gr. 065, dissous dans l'eau, deux ou trois fois par jour, après les repas.

Avis important.—La quantité totale par jour pour l'administration orale ne doit pas dépasser 0 gr. 20.

Pour Injection Hypodermique ou Intramusculaire :

De 0 gr. 065 à 0 gr. 20, dissous dans de l'eau stérilisée, tous les deux jours.

'Soloid,' Produits marque [B. W. & Cie]

Les Produits 'SOLOID' fournissent des antiseptiques, des astringents et des anesthésiques portatifs et sûrs, des colorants pratiques et exacts pour la microscopie, des réactifs pour l'analyse de l'eau, de l'urine, et des eaux d'égouts et milieux de culture pour les microrganismes.

Les Produits 'Soloid' se portent dans la poche, commodément et sans risque aucun, et ne nécessitent pour obtenir des solutions du titre désiré qu'une simple dissolution dans la quantité d'eau voulue immédiatement avant l'emploi.

Des solutions ainsi faites ont une plus grande activité et sont plus sûres que celles qui ont été gardées, celles-ci se trouvant fatalement exposées à des risques de contamination et de détérioration.

Le mot 'Soloid' est une marque de fabrique qui désigne des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque en faisant les commandes.

Une liste complète des Produits 'Soloid' se trouve dans la liste des prix à la fin du volume.

Soude, Salicylate de

Dans les cas de rhumatisme aigu, l'acide salicylique abaisse la température, calme les douleurs, diminue les enflures et amoindrit les risques de complications du cœur. Il est employé

† Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Soude, Salicylate de—*suite*

comme antiseptique dans la fermentation gastrique, et on le recommande pour la migraine, la sciatique et la glycosurie d'origine goutteuse.

On a remarqué que certaines préparations de salicylate produisent de la dépression cardiaque et autres symptômes regrettables. Les recherches ont démontré que ces effets sont dus à diverses impuretés, dont l'une est un déprimant puissant. Le Salicylate de Soude 'Tabloid' est *physiologiquement* pur et son administration produit l'action pharmacologique réelle, sans aucun symptôme fâcheux.

Préparations

‡ SALICYLATE DE SOUDE 'TABLOID' *(physiologiquement pur)*, 0 gr. 50 et 1 gr. [℠ B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En avaler un ou davantage avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour, après les repas. La dose maxima usuelle est de 1 gr.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Strophanthus

Employé comme stimulant cardiaque et diurétique. Analogue à la digitale pour son action sur le cœur. Le strophanthus n'amène pas la constriction des vaisseaux, et il n'y a pas le même risque d'accumulation qu'avec la digitale.

Le produit 'Tabloid' correspond en principes actifs à la teinture fluide fraîchement preparée, mais il est supérieur à cette dernière parce que son activité ne varie jamais, la décomposition, la précipitation ou l'évaporation étant toutes trois impossibles.

Préparation

‡ TEINTURE DE STROPHANTHUS 'TABLOID' (au 10e), *5 gtt. (0 gr. 10) [℠ B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—De un à trois ; répéter si c'est nécessaire.

* Compte-gouttes international, Bruxelles, 1902

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Sublimé Corrosif (Bichlorure de Mercure)

Les solutions de sublimé corrosif s'emploient comme lotions pour les maladies chroniques et parasitaires de la peau, et pour panser les blessures et les ulcères.

Ce sel est beaucoup employé dans la chirurgie et la gynécologie pour ses propriétés antiseptiques puissantes. On se sert des solutions aux titres suivants :

Pour stériliser la peau, les mains, les instruments, etc., des solutions au 1000e.

Pour laver les blessures et pour faire des injections vaginales et uréthrales, une solution au 2000e pour une seule application et

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Sublimé Corrosif (Bichlorure de Mercure)—*suite*

des solutions au 10 000e pour les irrigations répétées. Pour laver les yeux, des solutions au 5000e.

Les produits de Sublimé Corrosif 'Soloid' sont sûrs et commodes pour le transport. Ils présentent le bichlorure de mercure en quantités exactement dosées pour pouvoir préparer des solutions au moment voulu.

Préparations

SUBLIMÉ CORROSIF 'SOLOID,' 0 gr. 50 et 1 gr. [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Deux des produits de 0 gr. 50 ou un de ceux de 1 gr. dissous dans un litre d'eau donnent une solution de sublimé corrosif au 1000e.

SUBLIMÉ CORROSIF 'SOLOID' (OPHTHALMIQUE) (J), 0 gr. 000065 [B. W. & Cie]

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Sulfonal

Hypnotique de grande valeur ; produit un sommeil profond qui dure plusieurs heures, sans causer ni mal de tête, ni constipation.

Préparations

SULFONAL 'TABLOID,' 0 gr. 25 et 1 gr. [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—De un à six des produits de 0 gr. 25 ; ou bien un ou deux des produits de 1 gr. La dose maxima officinale est de 2 gr.

Le Sulfonal 'Tabloid' doit être pulvérisé, et pris dans un liquide tiède ou chaud quatre heures environ avant de se mettre au lit.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Suppositoires Rectaux 'Enule'

(Voir page 28)

Surrénale, Glande

Une injection intraveineuse de l'extrait de la glande surrénale produit les mêmes effets sur le cœur et la circulation que si l'on avait administré de l' 'Hemisine.'

L' 'Hemisine' est une préparation du principe actif de la moelle de la glande surrénale et les expériences de laboratoires semblent démontrer que c'est le seul principe actif que la glande possède. Néanmoins, dans la clinique, des préparations de la substance entière de la glande peuvent convenir à d'autres indications. La glande surrénale s'administre dans la maladie d'Addison, le goître, l'anémie et la neurasthénie.

La Glande Surrénale 'Tabloid' présente l'activité complète de la substance de la glande fraîche.

Préparation

GLANDE SURRÉNALE 'TABLOID,' 0 gr. 30 [B. W. & Cie]

Surrénale, Glande—*suite*

MODE D'EMPLOI.—En avaler un produit avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour, après les repas. Augmenter graduellement.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

‡ 'Tabloid,' Produits marque [B. W. & Cie]

Les Produits 'TABLOID,' dont l'excellence et les avantages sont maintenant universellement reconnus, ne contiennent que les drogues les plus fines, de sorte que leur activité thérapeutique est garantie ; ils sont d'un dosage exact, d'un transport facile, et se conservent dans n'importe quel climat. Ils sont fabriqués sous la surveillance de chimistes ayant fait des études spéciales et de pharmaciens diplômés comptant de nombreuses années d'expérience.

Dans la préparation de chaque produit 'Tabloid' on tient compte des usages particuliers pour lesquels les drogues en question sont employées. Ainsi les préparations 'Tabloid' pour une action thérapeutique générale sont faites de façon à se désintégrer immédiatement, tandis que celles qui doivent exercer une action locale (à la gorge, par exemple) sont préparées pour se dissoudre lentement et assurer une application prolongée de leurs constituants. Les Pastilles 'Tabloid' présentent des médicaments pour la gorge sous une forme agréable et amenant la diffusion d'une solution ayant une activité uniforme sur la muqueuse.

Les préparations 'Tabloid' de drogues désagréables sont recouvertes d'une mince couche de sucre facilement soluble dans l'estomac, et finalement celles qui ne doivent agir qu'après avoir quitté l'estomac sont recouvertes d'une couche de kératine, soluble seulement dans les sécrétions alcalines de l'intestin.

La supériorité reconnue des Produits 'Tabloid' n'est maintenue que par un soin incessant et une attention minutieuse apportés dans tous les détails de la préparation.

Les Produits 'Tabloid' ont souvent été imités, mais jamais la qualité des ingrédients, la perfection de la préparation, la précision du dosage et le degré d'activité thérapeutique de ces produits n'ont pu être approchés.

Les Produits 'Tabloid' occupent beaucoup moins de volume que leur équivalent sous la forme ordinaire, et comme ils sont dosés avec précision, ils évitent la perte de temps et l'ennui de peser et de mesurer, avantages qui les rendent précieux lorsqu'il s'agit de les transporter et de s'en servir dans des expéditions lointaines.

Le mot 'Tabloid' est une marque qui désigne des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque sur les ordonnances et dans les commandes.

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Tabloid,' Produits marque—*suite*

Voir aussi: Produits Hypodermiques 'Tabloid,' *page* 43 ;
Produits Ophthalmiques 'Tabloid,' *page* 49 ; *et*
Produits Photographiques 'Tabloid,' *page* 51

En outre, une liste complète des Produits 'Tabloid' se trouve dans la liste des prix à la fin du volume.

Thyroïde, Glande

La substance de la glande thyroïde a été reconnue d'une grande valeur dans le myxœdème, le crétinisme, l'obésité, et l'éclampsie puerpérale ; dans cette dernière elle est administrée pendant l'accès et comme préventif dans les couches ultérieures.

La médication thyroïdienne a rendu de grands services dans le goître simple, dans certaines maladies de la peau (psoriasis, lupus, eczéma, et chéloïde), dans la syphilis, la tétanie, l'hémophilie, le torticolis, l'acromégalie, les fractures non resoudées, les maladies pernicieuses, le béri-béri, certaines maladies de l'oreille, et dans les troubles utérins ; aussi pour aider le développement des enfants arriérés.

La Glande Thyroïde 'Tabloid' représente l'activité intégrale de la glande thyroïde normale. Elle est titrée par une méthode chimique contrôlée par des épreuves physiologiques, de façon que la substance de la glande desséchée, dont chaque produit 'Tabloid' représente une quantité déterminée, ne contienne pas moins de 0,2 pour cent d'iode en combinaison organique.

Préparations

GLANDE THYROÏDE 'TABLOID' *(Titrée)*, 0 gr. 0065 ; 0 gr. 016 ; 0 gr. 05 ; 0 gr. 065 ; 0 gr. 10 ; et 0 gr. 30 [Sgrc B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—On doit donner de petites doses pour commencer. Une bonne méthode est de prescrire au début un produit 'Tabloid' de 0 gr. 10 après chaque repas et en se couchant, augmentant la dose avec précaution selon l'effet produit.

Si des symptômes de "thyroïdisme" se développent, la dose doit rester stationnaire pendant quelques jours, et au bout de ce temps elle pourra encore être augmentée. La dose peut etre forcée plus rapidement si le malade s'étend pendant dix minutes après avoir pris le médicament. Certains malades supportent mieux la médication quand on leur administre la totalité de la dose journalière d'un seul coup au moment de se coucher. Pour les enfants la dose au début ne doit être que de 0 gr. 032, augmentée avec précaution.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Trinitrine (Nitroglycérine)

Dilate les vaisseaux sanguins, abaisse la pression artérielle et accélère le pouls. Son action, analogue à celle du nitrite d'amyle, se développe plus lentement et dure plus longtemps. On l'emploie, surtout comme produit 'Tabloid,' dans les conditions où la tension artérielle est élevée, dans les maladies aortiques, angine de poitrine, hémoptysie, ménorrhagie et autres hémorrhagies, asthme, mal de mer et néphrite.

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Trinitrine *suite*

Préparations

‡ TRINITRINE 'TABLOID,' 0 gr. 0005 et 0 gr. 0013 [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—De 0 gr. 0005 à 0 gr. 00065 en cas de nécessité.

‡ TRINITRINE 'TABLOID' (HYPODERMIQUE), 0 gr. 00026 et 0 gr. 00065 [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI. Un, injecté hypodermiquement, et répété au besoin.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Trois Bromures (Effervescent)

La présence des sels de sodium et d'ammonium tend à réagir contre l'effet déprimant causé parfois par l'administration du bromure de potassium. C'est un sédatif employé dans l'excitation nerveuse, pour le delirium tremens, la folie furieuse, l'épilepsie, le tétanos, l'empoisonnement par la strychnine, et aussi dans le mal de mer et les vomissements provoqués par des causes diverses. C'est aussi un hypnotique de valeur.

Préparation

TROIS BROMURES 'TABLOID,' EFFERVESCENT [B. W. & Cie]

Bromure de potassium,	0 gr. 40
Bromure de sodium,	0 gr. 40
Bromure d'ammonium,	0 gr. 20
Sel effervescent,	*q. s.*

MODE D'EMPLOI.—Un ou deux pulvérisés et dissous dans un demi-verre d'eau, après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Tyramine'

La base organique Para-hydroxyphényléthylamine, que la 'Tyramine' présente à l'état chimiquement pur, est le principal constituant actif des extraits aqueux de l'ergot, et est produit par l'action de ferments bactériens et autres sur la tyrosine amino-acide. Administrée par la méthode hypodermique, ou par la cavité buccale, la 'Tyramine' produit une élévation de la pression sanguine et donne au fonctionnement du cœur une vigueur très accentuée. On peut l'employer pour élever la pression sanguine dans les commotions et le coma et pour provoquer la contraction de l'utérus *post partum*.

La 'Tyramine' ressemble sous plusieurs rapports au principe actif surrénal (*voir* 'Hemisine,' *page* 41), mais elle est beaucoup moins toxique, plus lente et plus persistante dans son action.

Préparation

'TYRAMINE' 'TABLOID' (HYPODERMIQUE), 0 gr. 02 [B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En injecter hypodermiquement un, dissous dans de l'eau distillée.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Urotropine

L'urotropine est un antiseptique puissant des voies génito-urinaires et un diurétique efficace. Elle restaure à l'urine devenue alcaline sa réaction acide, et amène la disparition du pus, des microrganismes tels que le bacille typhoïde, et autres constituants anormaux. Se donne dans les cas de gravelle et de calculs biliaires.

Préparation

UROTROPINE 'TABLOID,' 0 gr. 50 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—Un ou davantage, selon le cas, dissous dans 300 gr. d'eau pure ou d'eau gazeuse, deux ou trois fois par jour. La dose totale journalière peut être de 2 gr.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Vana,' Vin Tonique [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Présente le glycérophosphate de chaux et l'alcaloïde de l'écorce du quinquina sous forme d'un vin nourrissant de qualité excellente. Par ses propriétés antipériodiques, antipyrétiques et toniques il est d'un grand secours dans la malaria et autres fièvres, et il peut être pris facilement par ceux qui ne supportent pas la quinine.

Le Vin Tonique 'Vana' améliore l'appétit, favorise la digestion et exerce une action reconstituante et nutritive dans la convalescence, la débilité générale, la malnutrition, la neurasthénie et l'épuisement nerveux.

MODE D'EMPLOI.—Un grand verre à liqueur, trois ou quatre fois par jour, avant ou après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Vaporole,' Produits marque [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Les Produits 'VAPOROLE' présentent une série nombreuse de médicaments pour l'injection hypodermique et pour l'inhalation.

Ils sont remarquables pour leur pureté, leur sûreté d'action, leur exactitude et l'uniformité de leur composition. Ceux qui sont destinés à l'emploi hypodermique ont plusieurs avantages :

La solution est stérile et prête à un usage immédiat ; chaque produit est fourni en petites quantités commodes, ce qui n'expose pas toute la masse du médicament, comme dans les préparations ordinaires, aux conditions atmosphériques nuisibles.

Les Produits 'Vaporole' pour l'Inhalation sont fournis dans des minces capsules en verre friable enveloppées de soie, et qui peuvent être facilement écrasées entre les doigts. D'un très petit volume, on les transporte aisément dans la poche ou le porte-monnaie.

Une liste complète des Produits 'Vaporole' se trouve dans la liste des prix a la fin du volume.

Véronal

Hypnotique et sédatif recommandé dans les cas cardiaques de préférence aux préparations chlorales, parce qu'il est considéré comme ne déprimant pas le pouls et n'irritant pas l'estomac. Employé avec succès en doses de 0 gr. 50 dans l'insomnie du morphinisme et la neurasthénie. De plus fortes doses ont été administrées dans l'insomnie accompagnée de troubles cérébraux, dans la folie furieuse et l'alcoolisme. N'employer que les faibles doses jusqu'à ce qu'on ait déterminé la susceptibilité du patient à la drogue.

Préparation

VÉRONAL 'TABLOID,' 0 gr. 50 [VOIR USIN B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En avaler un avec de l'eau, ou le prendre pulvérisé dans un peu d'eau ou de lait.

Voix (Composé de Cocaïne avec Chlorate de Potasse et Borax)

Employée dans les cas d'enrouement et d'inflammation de la gorge. Étant un antiseptique stimulant aussi bien qu'un anesthésique, cette préparation calme les douleurs et fait disparaître l'inflammation, détruisant en même temps l'infection souvent présente dans ces cas.

Préparation

VOIX (COMPOSÉ DE COCAÏNE AVEC CHLORATE DE POTASSE ET BORAX) 'TABLOID' [VOIR USIN B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En sucer un quand c'est nécessaire.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Xaxa' (Acide Acétyl-salicylique)

Le 'Xaxa' 'Tabloid' présente l'acide acétyl-salicylique pur. C'est un antirhumatismal, antipyrétique et analgésique qui produit l'action thérapeutique de l'acide salicylique et de ses sels, sans jamais causer de symptômes désagréables ou toxiques. Le 'Xaxa' est insoluble dans l'estomac, et ne produit aucun trouble gastrique. Il se désintègre facilement et est absorbé par les intestins.

Préparation

'XAXA' 'TABLOID,' 0 gr. 50 [VOIR USIN B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En avaler de un à deux avec de l'eau, deux ou trois fois par jour, après les repas. Pour calmer les douleurs, 1 gr. peut être donné comme première dose, suivie quand c'est nécessaire de doses de 0 gr. 50, à des intervalles d'une heure à une heure et demie, jusqu'à ce que trois ou quatre doses en tout aient été administrées.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

'Xaxaquin' (Acétyl-salicylate de Quinine)

Le 'Xaxaquin,' sel de quinine dont l'acide est le 'Xaxa' (acide acétyl-salicylique), possède des propriétés antiseptiques, antimalariennes et antipyrétiques marquées. Il combine les propriétés spécifiques de la quinine et des salicylates, sans avoir les désavantages de ces derniers. Le 'Xaxaquin' est ordonné comme préventif dans la première période du catarrhe et de l'influenza, et exerce une action salutaire dans les amygdalites, la névralgie, la goutte, les rhumatismes, la malaria et autres fièvres.

Préparation

'XAXAQUIN' 'TABLOID,' 0 gr. 25 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En avaler un ou deux avec un peu d'eau, après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Zinc, Composé de Valérianate de

Stomachique, antispasmodique et tonique des nerfs ; indiqué dans les hystéries, la dyspepsie nerveuse ou le manque d'appétit, contre les vomissements de la grossesse et dans les manifestations nerveuses de la ménopause.

Préparation

COMPOSÉ DE VALÉRIANATE DE ZINC, MARQUE 'TABLOID' [VOIR LISTE B. W. & Cie]

Valérianate de zinc,	0 gr. 065
Poudre de rhubarbe,	0 gr. 065
Extr. de belladone,	0 gr. 008
Poudre de gingembre,	0 gr. 065

(Dragéifié)

MODE D'EMPLOI.—En avaler un entier avec un peu d'eau, deux ou trois fois par jour, après les repas.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

Zinc, Permanganate de

Ce composé est de grande valeur pour injections ou applications locales ; il possède les propriétés oxydantes du permanganate, unies à l'action astringente qui caractérise les sels de zinc généralement. Un produit 'Soloid' dissous dans 30 gr. d'eau s'emploie avec un grand succès comme injection dans la gonorrhée. Une solution au même titre peut s'employer aussi pour faire des lavages de la bouche, comme gargarisme quand la gorge est enflammée, et pour seringuer les narines dans la rhinite chronique.

Préparation

PERMANGANATE DE ZINC 'SOLOID,' 0 gr. 008 [VOIR LISTE B. W. & Cie]

MODE D'EMPLOI.—En injecter hypodermiquement un, dissous dans 30 gr. d'eau.

(Voir aussi la liste des prix à la fin du volume)

SYMBOLES CHIMIQUES ET POIDS ATOMIQUES

Le Comité International donne aujourd'hui les poids atomiques en relation avec O = 16,00. Les valeurs correspondantes à H = 1 se calculent facilement au moyen de la proportion 1,008 : 1.

		O = 16
Aluminium ...	Al	27,1
Argent	Ag	107,88
Argon	A	39,88
Arsenic	As	74,96
Azote	Az	14,01
Baryum	Ba	137,37
Béryllium	Be	9,1
Bismuth	Bi	208,0
Bore	B	11,0
Brome	Br	79,92
Cadmium	Cd	112,4
Cæsium	Cs	132,81
Calcium	Ca	40,07
Carbone	C	12,00
Cérium	Ce	140,25
Chlore	Cl	35,46
Chrome	Cr	52,0
Cobalt	Co	58,97
Columbium (*Voir* Niobium)		
Cuivre	Cu	63,57
Dysprosium ...	Dy	162,5
Erbium	Er	167,7
Étain	Sn	119,0
Europium	Eu	152,0
Fer	Fe	55,84
Fluor	F	19,0
Gadolinium ...	Gd	157,3
Gallium	Ga	69,9
Germanium ...	Ge	72,5
Glucinium (*Voir* Béryllium)		
Hélium	He	3,99
Hydrogène ...	H	1,008
Indium	In	114,8
Iode...	I	126,92
Iridium	Ir	193,1
Krypton	Kr	82,9
Lanthane	La	139,0
Lithium	Li	6,94
Lutecium	Lu	174,0
Magnésium ...	Mg	24,32
Manganèse ...	Mn	54,93
Mercure	Hg	200,6

		O = 16
Molybdène ...	Mo	96,0
Néodymum ...	Nd	144,3
Néon	Ne	20,2
Niccolum	Ni	58,68
Niobium	Nb	93,5
Or	Au	197,2
Osmium	Os	190,9
Oxygène	O	16,00
Palladium	Pd	106,7
Phosphore ...	P	31,04
Platine	Pt	195,2
Plomb	Pb	207,10
Potassium	K	39,10
Praseodymum ...	Pr	140,6
Radium	Ra	226,4
Rhodium	Rh	102,9
Rubidium	Rb	85,45
Ruthénium ...	Ru	101,7
Samarium	Sa	150,4
Scandium	Sc	44,1
Sélénium	Se	79,2
Silicium	Si	28,3
Sodium	Na	23,0
Soufre	S	32,07
Stibium	Sb	120,2
Strontium	Sr	87,63
Tantale	Ta	181,5
Tellure	Te	127,5
Terbium	Tb	159,2
Thallium	Tl	204,0
Thorium	Th	232,0
Thulium	Tm	168,5
Titane	Ti	48,1
Tungstène ...	W	184,0
Uranium	U	238,5
Vanadium ...	V	51,0
Xénon	Xe	130,2
Ytterbium (Néo-ytterbium) ...	Yb	172,0
Yttrium	Y	89,0
Zinc	Zn	65,37
Zirconium ...	Zr	90,6



Index des Maladies et leur Traitement

Abcès

Pour l'usage interne :

Laxatifs.
*Aconit. *Sulfure de calcium.
*Sulfate de quinine neutre.
*Citrate de fer et de quinine.
*Acide arsénieux. *Strychnine.
Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt, 'Kepler.'

Localement :

Pommade de belladone.
Pommade à la cocaïne, 5% à 10%.
Oléate de morphine. Iode.
Fomentations.
†Acide phénique, 0 cmc. 30 à 0 cmc. 60 de solution à 2% dans la glande qui menace de suppurer.

Pour l'usage hypodermique :

Sérum Antistaphylococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'
Sérum Antistreptococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'
Vaccin Staphylococcique, Mélangé, 'Wellcome.'

Acné

Traiter toute indigestion, et insister sur un exercice régulier, une action libre des intestins, et un régime simple, avec peu ou point de viande, pas d'aliments gras, ni épices, fromages, pâtisseries. Vin, bière, thé, café, cacao en quantités modérées.
Bains turcs.

Pour l'usage interne :

*Sulfure de calcium.
*Acide arsénieux. Phosphore.
*Composé d'arsenic.
*Composé de fer et d'arsenic.
*Bromure de potassium.
Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt, 'Kepler.'
*Laxatifs salins.

Localement :

Vapeur d'eau, laver avec du savon à la Lanoline ichthyolée et frictionner avec une ser-

Acné *suite*

Localement — *suite :*

viette rugueuse. Fomentations seulement s'il y a de l'inflammation. Vider les comédons avec un extracteur pour acné.
Onctions avec de la Crème 'Hazeline.'
Pommades (préparées avec de la Lanoline) d'ichthyol, de soufre, de l'oxyde de zinc ou de mercure ; ou alors de la glycérine et du borax.

Pour l'usage hypodermique :

Sérum Antistaphylococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'
Vaccin Staphylococcique, Mélangé, 'Wellcome.'
Vaccin Staphylococcique, Aureus, 'Wellcome.'
Vaccin de Bacille d'Acné, 'Wellcome.'
Vaccin d'Acné, Mélangé, 'Wellcome.'

Acromégalie

*Glande pituitaire.
*Glande thyroïde.

Addison, Maladie d'

Veiller à l'état général.
Glycérine (doses maxima).
*Composé tonique. "Hemisine.'
*Noix vomique.
*Strychnine. 'Glande surrénale.
°§Digitaline (cristallisée).
§'Tyramine.'
°'Epinine.'
°Extrait d'Hypophyse (Infundibulaire).

Aigreurs d'Estomac

(*Voir* Estomac)

Albuminurie

Traiter la cause primitive. Si la coagulabilité du sang est défectueuse, donner du *Lactate de chaux.
(*Voir* Cœur, Bright, etc.)

---

* '*Tabloid*'
† '*Soloid*'
§ '*Tabloid*' *Hypodermique*
° '*Vaporole*'

Alcoolisme

Interdire absolument l'alcool et ordonner une nourriture abondante.
Bains d'air chaud, avec massage.
Bains d'eau chaude, avec massage.

Catarrhe Gastro-intestinal Aigu

POUR L'USAGE INTERNE :
*Calomel, suivi d'un purgatif 'Salin.
*Bismuth et soude.
Acide cyanhydrique dilué.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
°§Morphine. °§Atropine.
§Morphine et strychnine.

Catarrhe Gastro-Intestinal Chronique

Amers végétaux.
Acides minéraux.
*Acide arsénieux.
*Noix vomique. *Capsicum.
*Sel de Carlsbad, effervescent.
Lavages.

Pour le Système Nerveux

POUR L'USAGE INTERNE :
*Composé de bromure de sodium.
*Bromure de potassium.
*Bromhydrate d'ammoniaque.
*Chloral hydraté. *Quinine.
*Noix vomique. *Strychnine.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
§Atropine et strychnine.
°§Morphine. °§Atropine.
°§Sulfate de strychnine.
§Morphine et strychnine.
§Hyoscyamine. °§Hyoscine.
§Picrotoxine.

Pour le Cœur

POUR L'USAGE INTERNE :
*Digitale. *Strophanthus.
*Citrate de caféine. *Strychnine.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
°§Sulfate de strychnine.
§Sulfate de spartéine.

Pour le Delirium Tremens

Régime léger d'abord (par exemple, Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné), et sitôt que possible nourriture

Alcoolisme *suite*

Pour le Delirium Tremens *suite*

solide. Bain chaud ou couverture mouillée chaude.

POUR L'USAGE INTERNE :
*Composé de bromure de sodium.
*Bromure de potassium.
*Morphine. *Chloral hydraté.
*Teinture de cannabis indica.
*Digitale en fortes doses.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
°§Morphine. °§Apomorphine.
°§Hyoscine. §Hyoscyamine.

PAR VOIE RECTALE :
Morphine 'Enule.'

Pour Calmer la Passion de Boire

*Oxyde de zinc. Cocaïne.
*Teinture de capsicum.
Eau froide, à petites gorgées.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
§Atropine et strychnine.

Alopécie (Pelade)

POUR L'USAGE INTERNE :
*Blaud (Pil. fer.). *Acide arsénieux.

Si d'origine syphilitique :
*Iodure de potassium. Mercure.
*Bichlorure de mercure avec iodure de potassium.
*Iodure de mercure et de potassium.
*Iodure jaune de mercure.

LOCALEMENT :
Massage du cuir chevelu.
Ammoniaque. Térébenthine.
Cantharides. Acide acétique.
†Sublimé corrosif.
Eau de Cologne. Pilocarpine.
'Paroleine.' Glycérine.
Chrysarobine, 2 gr. à 1 gr. dans 30 gr. de Lanoline.

Aménorrhée

Traiter la cause (la maladie dépend souvent de l'anémie).
Bains de siège à la moutarde.
*Composé d'asa fœtida.
*Blaud (Pil. fer.). *Aloès et myrrhe.
*Blaud (Pil. fer.) et aloïne.
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
Aloès et asa fœtida. Apiol.

* '*Tabloid*'
† '*Soloid*'
§ '*Tabloid*' *Hypodermique*
° '*Vaporole*'

Aménorrhée—*suite*

*Composé de noix vomique.
*Bioxyde de manganèse.
*Citrate de Manganèse et de fer.
*Permanganate de potasse.

Amygdalite (Aiguë)

Pour l'usage interne :

*Sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.
*Gaïac et soufre.
*Gaïac et quinine.
*Sulfate de quinine neutre. *Aconit.
*Quinine, camphre et aconit.
*Salicylate de quinine. *Antifébrine.
*Salicylate de soude avec bicarbonate de potasse.
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxa' et caféine.
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Xaxa' et poudre de Dover.
*'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*Salicylate de soude. *'Aspirin.'

Par succion :

*Ratanhia et cocaïne.
¶Cocaïne. ¶Glycérine.
¶Glycérine et cassis.
¶Glycérine, tanin et cassis.
¶Morphine et ipécacuanha.
¶Gomme rouge et cocaïne.
¶Ratanhia, menthol et cocaïne.
¶Pectorale.
¶Composé de goudron végétal.
*Chlorate de potasse, et borax.
*Composé de chlorate de potasse, borax et cocaïne (Voix).
*Bicarbonate de soude.
*Acide tannique.
*Orme fauve.
*Acide phénique et orme fauve.

Localement :

Inhalations de vapeur d'eau.
Pulvérisations de *Chlorate de potasse, †'Hemisine,' *Borax, †Acide borique, †Chlorhydrate de cocaïne, †Chlorhydrate d'eucaïne, †Lactate d'eucaïne, ou solution de *Salicylate de soude.
Insufflations d'acide borique en poudre, de gaïac en poudre.
Applications au moyen d'un pinceau de — Glycéré de borax, Glycérine et acide tannique, Glycérine et Teinture de perchlorure de fer.

Amygdalite (Aiguë)—*suite*

Localement—*suite :*

Gargarismes de—†Alun, Chlorate de potasse et glycérine, †Chlorhydrate d'eucaïne, †Lactate d'eucaïne, Perchlorure de fer, †'Hemisine,' *Borax, †Acide borique, †Permanganate de zinc, †Sulfophénate de zinc, †Composé nasal 'Eucalyptia' ou †Composé nasal de phénol.

Anémie

Primaire

Pour l'usage interne :

Laxatifs.
*Blaud (Pil. fer.)
*Blaud (Pil. fer.) et aloïne.
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada. *Composé d'aloïne.
*Composé de fer réduit.
*Composé de fer réduit et de rhubarbe.
*Citrate de manganèse et de fer.
*Phosphate de manganèse et de fer. *Acide arsénieux.
Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.'
*Thymus. *Trois Sirops.
*'Hemisine.' *§§Moelle d'os.
Extrait de Malt 'Kepler' avec Hémoglobine.
*Residuum rubrum.
Fer Dialysé (B. W. & Cie).
*Pepsine et strychnine.
*Béta-naphtol.
*††Glycérophosphates.
*Composé d'hypophosphites.
*Fer, arsenic et digitaline.

Pour l'usage hypodermique :

*'Soamin.'
°Fer et Arsenic.
Sérum Normal de Cheval 'Wellcome.'

Secondaire

Traiter la cause : hémorrhagie ; leucorrhée ; cachexies de cancer, de syphilis, de malaria ; tuberculose ; empoisonnement par le plomb, par le mercure ou par l'arsenic ; constipation chronique.

Anévrysme

Repos ; diminuer le régime et la quantité de liquide.

---

* '*Tabloid*' ¶ *Pastille* '*Tabloid*' §§ '*Valule*'
† '*Soloid*' †† '*Elixoid*' ° '*Vaporole*'

Anévrysme—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE :

*Aconit. *Iodure de potassium.
*Noix vomique. *Morphine.
*Lactate de chaux.
*Iodo-ricinoléate de chaux.

LOCALEMENT :

Acupuncture. Électropuncture.
Injection de Perchlorure de fer.
Injection de gélatine.
Pression proximale.
Ligature proximale ou distale.
Excision dans certains cas.

Angine de Poitrine

POUR L'USAGE INTERNE :

*Aconit (entre les crises).
*Acide arsénieux. *Antipyrine.
*Trinitrine. Éther 'Wellcome.'
*Composé de trinitrine.
*Tétranitrate d'érythrol.
*Chloral hydraté.
Chloroforme 'Wellcome.'
*Bromure de potassium. Anodin de Hoffmann (Esprit d'éther composé, Pharm. Brit.).
*Composé de bromure de Sodium.
*Nitrite de soude.
*Iodure de potassium.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Morphine et strychnine.

INHALATIONS :

°Nitrite d'amyle.
Chloroforme 'Wellcome.'
Éther 'Wellcome.'

Anthrax

Chercher la cause avec soin.
Voir si les urines ne contiennent pas de sucre.
Éviter toute pression ou friction.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Quinine. *Acide arsénieux.
*Salicylate de bismuth. *Salol.
*Morphine. *Sulfure de calcium.
Acide sulfurique dilué.

LOCALEMENT :

Injections †d'Acide phénique (1 pour 3 de glycérine).
Fomentations †d'Acide borique.
Collodion. Belladone.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE ;

Sérum Antistaphylococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'

Anthrax—*suite*

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE —*suite* :

Vaccin Staphylococcique, Aureus, 'Wellcome.'
Vaccin Staphylococcique, Mélangé, 'Wellcome.'

Aphthes

Soigner les dents, et corriger le régime.

POUR L'USAGE INTERNE :

Acides minéraux. *Poudre grise.
*Quinine. *Poudre de Gregory.

LOCALEMENT :

*Borax. Glycéré de borax.
*Chlorate de potasse et borax.
†Sulfate de cuivre. †Alum.
Eau Oxygénée.

Apoplexie

POUR L'USAGE INTERNE :

*Aconit. *Iodure de potassium.
*Bromure de potassium.
*Élatérine. Huile de croton.
*Calomel. *Glande thyroïde.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Atropine, si la respiration cesse. °§Strychnine.

LOCALEMENT :

Sangsues. Saignées.
Glace à la tete (maintenue élevée).
Moutarde aux pieds (maintenus bas).

Appendicite

Repos absolu. Glace. Sangsues. Opération.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Sulfate de magnésie effervescent.
*Mistura alba.
*Calomel. *Opium. *Morphine.

PAR VOIE RECTALE :

Lavements de térébenthine.
Lavements d'huile de ricin.
Lavements d'eau savonneuse.
Suppositoires 'Enule' au composé de savon.

Arthrite Rhumatoïde

Régler le régime et l'alcool.

POUR L'USAGE INTERNE :

Préparations 'Kepler.'
*Glande thyroïde. *Glande thymus.
*Salicylate de quinine.

* *'Tabloid'*
† *'Soloid'*
§ *'Tabloid' Hypodermique*
° *'Vaporole'*

Arthrite Rhumatoïde —*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite:*
*Composé de benzoate de lithine.
*Gaïac et soufre.
*Carbonate de gaïacol.
*Camphorate de gaïacol.
*Pipérazine. *Acide arsénieux.
††Composé de formiates.
*Iodure de potassium. Iodure de fer.
*Composé de colchique.
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*'Aspirin.' *Bleu de méthylène.

LOCALEMENT :
Aconit. Arnica. Capsicum.
Huile de Chaulmougra. Cataphoresis.
Électricité. Sangsues.
Pommade ichthyolée.

PAR VOIE RECTALE OU PAR INJECTIONS HYPODERMIQUES :
Sérum Antistreptococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'

Ascite (*voir* HYDROPISIE)

Asthme

Éviter les causes d'excitation, nourriture ou occupations pouvant amener une crise. Traiter désordres pulmonaires, cardiaques, gastro-intestinaux, rénaux et autres, y compris toutes les conditions anormales du nez et de la gorge.

POUR L'USAGE INTERNE :
*Glande surrénale. *Aconit.
Acide arsénieux. *Strychnine.
*Citrate de caféine. *Ipécacuanha. "Hemisine.'
*Composé de Trinitrine.
*Bromure de potassium. *Iodure de potassium.
*Belladone. *Pepsine et strychnine.
Café. Thé vert. Alcool.
*Hypophyse.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
°§Sulfate d'atropine. §Sodio-salicylate de caféine.
°§Apomorphine. §Hyoscyamine.
°§Morphine. §Nitrate d'aconitine.
°'Hemisine.' °'Epinine.' °Extrait d'hypophyse.

POUR FUMIGATIONS DIVERSES :
Papiers de nitrate de potasse.
Feuilles de stramoine, digitale,

Asthme—*suite*

POUR FUMIGATIONS DIVERSES —*suite :*
lobélie, belladone, tabac et cubèbe sous formes de différentes poudres ou cigarettes, ou fumées dans une pipe.

INHALATIONS :
Chlorhydrate d'ammoniaque (Inhalateur 'Vaporole'). Menthol.
Chloroforme 'Wellcome.'
°Composé de chloroforme et d'iodure d'éthyle.
Éther 'Wellcome.' Oxygène.
°Nitrite d'amyle.
Pulvérisations de solution d'†'Hemisine' ou d'"Epinine.'

Ataxie Locomotrice (*Voir* TABES)

Béribéri

S'abstenir de riz.
Précautions contre syncope cardiaque.
Tenir le malade tranquille. Donner des stimulants cardiaques. S'il y a beaucoup de fluide dans la plèvre (ou le péricarde), l'extraire. Donner des aliments fréquemment et en petites quantités ; viande, légumes frais ou fruits (éviter les aliments volumineux).
Transférer le malade le plus tôt possible dans un lieu non infecté.

POUR L'USAGE INTERNE :
*Teinture de digitale.
*Teinture de strophanthus.
*Sulfate de spartéine.
Glande thyroïde.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
°§Digitaline. §Strophanthine.

INHALATIONS :
°Nitrite d'amyle.
Ammoniaque. Oxygène.

DANS LA CONVALESCENCE :
*Fer, arsenic et digitaline.

Bilieux, Accès

Examiner les yeux séparément pour astigmatisme ou autres défauts de réfraction—causes fréquentes de troubles qui sont souvent pris pour des "accès bilieux." Voir si l'urine contient de l'albumine.
*Calomel. *Pilule bleue.
*Rhubarbe. "Gingament.'

---

* '*Tabloid*' § '*Tabloid*' *Hypodermique* ° '*Vaporole*'
† '*Soloid*' †† '*Elixoid*'

Bilieux, Accès—*suite*

*Pilule bleue et rhubarbe.
*'Coffee-Mint.' *Podophylline.
*Composé de cascara.
*Évonymine. *Noix vomique.
Podophylline et évonymine.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent.
*Sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.
*Sel de Carlsbad, effervescent.
*Phosphate de soude, effervescent. *Laxatif végétal.
*Sulfate de soude, effervescent.
*Salicylate de soude. *Aconit.
*Bichlorure de mercure.
Acide nitro-chlorhydrique.
*Chlorhydrate d'ammoniaque.

Blennorhagie Cordée

Pour l'usage interne :

*Composé de sulfate de magnésie, effervescent.
*Mistura alba. *Aconit.
*Tartre stibié. *Belladone.
*Poudre de Dover. *Bromure de potassium. *Camphre.

Localement :

Glycéré de belladone.
†Chlorhydrate de cocaïne (injections uréthrales).
°§Morphine (injections sous-cutanées au périnée).

Par voie rectale :

Morphine 'Enule.'
Belladone 'Enule.'
Morphine et belladone 'Enule.'

Blépharite

Examiner les yeux séparément, chercher tout défaut de réfraction et le corriger.

Pour l'usage interne :

*Aliment chimique.
*Sirop d'Easton. *Quinine.
Préparations 'Kepler.'

Localement :

†Acide borique, lotions tièdes.
†Nitrate d'argent.
†Sulfate de zinc. †'Nizin.'
†Sulfate de cuivre.
Pommades mercurielles.

Bright, Maladie de

Aiguë

Boisson "Impériale" :—
Crème de tartre, 4 gr. ; jus d'un demi-citron ; eau, un demi-litre.
Nitrate de potasse. *Digitale.
*Tartre stibié. *Jalap.
*Nitrate de pilocarpine. *Élatérine.
Poudre grise. *Strophanthus.
*Composé cathartique.
*Calomel et *Salins.
*Citrate de caféine.
*Bleu de méthylène.

Subaiguë ou Chronique

Serpentaire. Buchu.
*Citrate de caféine. Genêt.
*Sulfate de spartéine. Scille.
*Pilocarpine. *Strychnine.

Urémie

Bains chauds, bains de vapeur, envelopper de linges humides, ventouses sèches et scarifiées.

Pour l'usage interne :

*Trinitrine. *Composé de trinitrine.
*Jalap. *Calomel et *Salins.
*Élatérine. *Chloral hydraté.
*Bromure de potassium.
*Citrate de caféine.

Localement :

Ventouses. Sangsues.
Saignées.

Pour l'usage hypodermique :

§Nitrate de pilocarpine.
°§Digitaline. °§Strychnine.
°Extrait d'hypophyse (infundibulaire).

Inhalations :

°Nitrite d'amyle.
Chloroforme 'Wellcome.'
Oxygène.

Par voie rectale ou par injections intraveineuses :

†Solutions salines.

Bronchite

Aiguë

Bains de pieds chauds, bains chauds, boissons chaudes et nourriture légère, comprenant Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.

Pour l'usage interne :

*Pilule bleue. *Calomel.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent.

* '*Tabloid*'
† '*Soloid*'
§ '*Tabloid' Hypodermique*
° '*Vaporole*'

Bronchite—*suite*

Aiguë—suite

POUR L'USAGE INTERNE—*suite* :

*Nitrate de potasse.
Éther 'Wellcome.'
*Ipécacuanha. *Antimoine.
*Poudre de Dover. *Strychnine.
*Carbonate d'ammoniaque.
Polygala. Serpentaire. Scille.
*Héroïne.

LOCALEMENT :

Sinapismes de moutarde. Ventouses.
Liniment de térébenthine.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Chlorhydrate d'apomorphine.

INHALATIONS :

Air chaud humide.
Teinture composée de benjoin.
Essence d'eucalyptus ('Eucalyptia').

Chronique

POUR L'USAGE INTERNE :

*Pilule Bleue. *Calomel.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura Alba.
Éther 'Wellcome.'
Polygala. Créosote.
*Térébène.
*Digitale. *Ipécacuanha.
*Caféine. *Chlorhydrate d'ammoniaque.
*¶Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse. *Goudron et codéine.
*¶Codéine. *Essence de santal.
*Carbonate d'ammoniaque.
*Composé d'asa fœtida.
*Composé de menthol.
*¶Menthol. *Héroïne.
¶Menthol et eucalyptus.
¶Morphine et ipécacuanha.
¶'Pinol.' ††¶Composé de goudron végétal.
*Ipécacuanha et scille. *Goudron.
*Iodure de potassium. *Oxyde de zinc.
*Chlorhydrate d'apomorphine.
Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.'

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Sulfate de strychnine.

INHALATIONS :

Chlorhydrate d'ammoniaque (Inhalateur 'Vaporole').
Térébène (B. W. & Cie).
Teinture composée de benjoin.

Bronchorrhée

Examiner s'il n'y a pas de corps étranger dans les bronches, par la bronchoscopie.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Carbonate d'ammoniaque.
*Chlorhydrate d'ammoniaque.
*Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse. *Goudron.
*Goudron et codéine.
*Chlorhydrate d'apomorphine.
¶Morphine et ipécacuanha.
¶'Pinol.' ††¶Composée de goudron végétal.
*Iodure de potassium.
*Cubèbe et belladone.
*Acide arsénieux. *Strychnine.
*Carbonate de gaïacol.

INHALATIONS :

Térébène (B. W. & Cie).
Créosote.
Teinture composée de benjoin.

Brûlures (PAR LE FEU OU LES LIQUIDES BRÛLANTS)

POUR L'USAGE INTERNE :

*Opium ou *Morphine pour calmer la douleur.
Irrigation du côlon avec †Solution saline (pendant le shock).
*Sulfate de quinine neutre.
*Strychnine. *Noix vomique.

LOCALEMENT :

*Gaze au Bismuth.
Liniment oléo-calcaire.
Huile phéniquée (au 20e) et eau de chaux en parties égales.
Acide picrique.
Lotion de †Bicarbonate de soude.
Oxyde de zinc et amidon.
'Borofax.'
Acide borique et Lanoline.
Oxyde de zinc et Lanoline.
Lanoline de Toilette.
'Hazeline.'
Pommade ichthyolée.
Lavages continus (dans les cas graves)

Calculs

Biliaires

Préventifs :

Régime régulier et exercice.
Grandes quantités de liquide.
*Salicylate de soude.

* '*Tabloid*' § '*Tabloid*' *Hypodermique* †† '*Elixoid*'
† '*Soloid*' ¶ *Pastille* '*Tabloid*' ° '*Vaporole*'

Calculs — *suite*

Biliaires — *suite*

Préventifs — suite :

*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*Sulfate de magnésie, effervescent. *'Aspirin.'
*Hippurate d'ammoniaque.
*Sulfate de soude, effervescent.
*Phosphate de soude, effervescent.
*Sel de Vichy, effervescent.
*Sel de Carlsbad, effervescent.
*Sel de Kissingen, effervescent.
*Citrate de lithine et sulfate de soude, effervescent.
*Composé de mucine.
*Urotropine. *Composé d'iridine.
Huile d'olive. *Calomel.

Pendant la crise :

POUR L'USAGE INTERNE :

*Belladone. *Morphine.
*Chloral hydraté. *'Aspirin.'
*'Xaxa.' *'Xaxa' et phénacétine.
*Bicarbonate de soude dans de grandes quantités d'eau tiède.
Térébenthine et Éther 'Wellcome' (en parties égales).

INHALATIONS :

Chloroforme 'Wellcome.'
Éther 'Wellcome.'
°Nitrite d'amyle.

PAR VOIE RECTALE :

†Injections salines.

Rénaux

Boissons alcalines en abondance. Pas de stimulants. Nourriture légère.

Calculs d' { *Acide Urique :* / *Acide Oxalique :* }

Citrate de potasse effervescent en fortes doses aux malades qui émettent des urines sanguinolentes contenant beaucoup d'acide urique.
*Pipérazine. *Urotropine.

Calculs Phosphatiques :

Acides minéraux. *Acide benzoïque.

Cancer

POUR L'USAGE INTERNE :

*Bleu de Méthylène. *Ichthyol.
*Opium. *Chloral hydraté.

Cancer — *suite*

POUR L'USAGE INTERNE — *suite :*

*Morphine. *Glande thyroïde.
*Glande thymus.
Extrait de Malt 'Kepler.'
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.

LOCALEMENT :

†Chlorhydrate de cocaïne.
†Sublimé corrosif.
Huile d'olive mentholée.
†Hemisine.' Radium.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Fluide de Coley. *'Soamin.'
§Morphine et atropine.
§Morphine et strychnine.

PAR VOIE RECTALE :

†Acide borique (lavements chauds pour les cancers du rectum).
Belladone 'Enule.'
Morphine 'Enule.'
Morphine et Belladone 'Enule.

Catarrhe

Si ces rhumes sont fréquents, examiner avec beaucoup de soin le nez, afin de se rendre compte que les cornets ne sont pas élargis, et que les fosses nasales ne montrent pas de points sensibles ; examiner la gorge, pour voir si les amygdales ne sont pas enflées et s'il n'y a pas d'excroissances adénoïdes ; examiner aussi la poitrine.
Bains chauds. Bains turcs.

POUR L'USAGE INTERNE :

*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxa' et poudre de Dover.
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Xaxaquin."
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*Poudre de Dover. *Aconit.
*Composé de phénacétine et de quinine.
*Iodure de potassium.
*Morphine, strychnine et belladone. *Antifébrine.
¶Morphine et ipécacuanha.
*Ipécacuanha et antimoine.
*Chlorhydrate d'ammoniaque.
¶Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse.
*Quinine ammoniacale.
¶Composé d'acide benzoïque.
*Sulfate de quinine neutre.

* *'Tabloid'* § *'Tabloid' Hypodermique* ° *'Vaporole'*
† *'Soloid'* ¶ *Pastille 'Tabloid'*

Catarrhe — *suite*

POUR L'USAGE INTERNE — *suite :*

*Quinine et camphre.
*Quinine, camphre et aconit.
Quinine, belladone et camphre.
¶Menthol.
*Composé de menthol.
¶Menthol et eucalyptus.
††¶Composé de goudron végétal.
¶Pectorale. ¶'Pinol.'
¶Graine de lin, réglisse et chlorodyne.
*Nitrate de potasse.
*Composé de cubèbe.
*Composé de chlorate de potasse, borax et cocaïne (Voix).

Après la période aiguë :

Quinine. *Sirop d'Easton.
*Composé d'hypophosphites.
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.

INSUFFLATIONS :

Composé de menthol pour priser (B. W. & Cie).

PULVÉRISATIONS DES FOSSES NASALES :

†Composé nasal 'Eucalyptia.'
†Composé naso-pharyngien.
†'Hemisine.' 'Epinine.'

APPLICATIONS AUX NARINES :

'Hazeline.' Crème 'Hazeline.'

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Vaccins de Coryza 'Wellcome.'

Catarrhe de la Gorge

POUR L'USAGE INTERNE :

*Aconit. *Belladone.
*Morphine, strychnine et belladone.
*Nitrate de potasse. *Pilule bleue.
*Calomel. *Acide arsénieux.
*Salicylate de soude. 'Hazeline.'
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxa' et poudre de Dover.

PAR SUCCION :

*Composé de cubèbe.
*Cubèbe et belladone.
*Composé de menthol. *Gomme rouge.
¶Gomme rouge et cocaïne.
*Chlorate de potasse.
*Composé de chlorate de potasse, borax et cocaïne (Voix).
*Chlorhydrate d'ammoniaque.
*¶Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse.

Catarrhe de la Gorge — *suite*

PAR SUCCION — *suite :*

¶Glycérine.
¶Glycérine et cassis.
¶Glycérine, tanin et cassis.
¶Glycérine, tanin, capsicum et cassis.
*Ratanhia et cocaïne.
¶Ratanhia, menthol et cocaïne.
¶Graine de lin, réglisse et chlorodyne. *Orme fauve. ¶Composé de goudron végétal.
¶Pectorale. *Acide phénique et orme fauve. ¶'Pinol.'

BADIGEONNAGES DE LA GORGE :

Glycéré de borax ou de tanin.
Glycérine phéniquée.
Baume du Pérou ou de tolu.

INHALATIONS :

Térébène (B. W. & Cie).
Teinture composée de benjoin.
Chlorhydrate d'ammoniaque (Inhalateur 'Vaporole').

GARGARISMES :

'Hazeline.'
†Acide phénique.
†Composé naso-pharyngien.
†'Hemisine.' °'Epinine.'
†Composé d'alun et de zinc.
†Acide borique.
†Sulfate de zinc.
†Permanganate de zinc.

PULVÉRISATIONS :

'Hazeline.' 'Paroleine.'
†'Hemisine.'
†Composé naso-pharyngien.

Chigre

Nettoyer la maison à fond. Répandre de la poudre insecticide, désinfecter la chambre avec de l'acide phénique, du paraforme, etc. Défendre de marcher pieds nus. Bains chauds. Déloger les chigres. Envelopper toute la jambe dans des pansements humides jusqu'à ce que les piqûres soient cicatrisées.

Chlorose (*voir* ANÉMIE)

Choléra

Vaccin de Choléra 'Wellcome,' comme prophylactique.
Liquides en abondance. Stimulants. Soupes chaudes, bouillons. Si la nourriture

* 'Tabloid' ¶ 'Pastille' 'Tabloid' ° 'Vaporole'
† 'Soloid' †† 'Elixoid'

Choléra—*suite*

est rejetée, en redonner immédiatement.

POUR L'USAGE INTERNE :
Huile de ricin et *Opium.
Acide sulfurique dilué et *Opium.
*Mixture astringente.
*Calomel. *Cannabis indica.
*Béta-naphtol. *Morphine.
*Salol. *Asa fœtida et opium.
*Camphre. Stimulants.

LOCALEMENT :
Sinapismes de moutarde ou de capsicum à l'abdomen.
Cataplasmes de graine de lin à l'abdomen.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
§Morphine et strychnine.

PAR VOIE INTRAVEINEUSE :
Injections salines incessantes.
Solutions salines hypertoniques (†Composé de chlorure de calcium).

Chorée

Dans les cas graves repos au lit, et isolation. Voir s'il n'y a pas de défaut de réfraction, de végétations adénoïdes, d'enflure des amygdales, de vers intestinaux, d'hémorrhoïdes, ou autres irritations périphérales.
Régime réconfortant.
*Acide arsénieux en doses élevées.
Ergot de seigle. 'Ernutin.'
*Salicylate de soude.
*Salicylate de soude et bicarbonate de potasse.
*'Xaxa'(Acide acétyl-salicylique)
*'Aspirin.'
*Blaud (Pil. fer.).
*Sulfate de strychnine.
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
Monobromate de camphre.
*Valérianate de quinine.
*Cérébrine. *Valérianate de zinc.
*Oxyde de zinc.
*Fer, arsenic et digitaline.
††Composé de formiates.
*Trional. *Sulfonal.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
§Sulfate d'hyoscyamine.

S'il y a du rhumatisme articulaire :
*Salicylate de quinine.

Chorée—*suite*

S'il y a du rhumatisme articulaire suite :
*Salicylate de soude.
*'Xaxa'(Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxaquin.' *'Aspirin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*Iodure de potassium.

Cirrhose

Corriger le régime. Régler l'alcool. *Calomel.
*Chlorhydrate d'ammoniaque.
*Iodure de potassium. Iodoforme.
*Phosphate de soude, effervescent.
*Pilule bleue, scille et digitale.
*Élatérine. *Jalap.

Cœur, Maladies du

Maintenir l'état général en bonne condition.
Interdire le surmenage ou la fatigue du corps ou de la tête.
Surveiller la digestion.
Exercice régulier.
Si nécessaire, repos au lit.
Stimulants dans certains cas.
Exercices et bains spéciaux.

POUR L'USAGE INTERNE :
*Teinture de digitale.
*Digitaline.
*Citrate de caféine. Muguet.
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Acide citrique.
*Lactate de chaux.
*Strophanthus. *Chloralamide.
*Acide arsénieux. *Strychnine.
*Fer, arsenic et digitaline.
*Trinitrine.
*Composé de trinitrine.
*Tétranitrate d'érythrol.
*Iodure de potassium.
††Composé de formiates.
*Sulfate de spartéine.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
°§Digitaline. §Strophanthine.
°§Strychnine.
§Morphine et strychnine.
§Sulfate de spartéine.
°Extrait d'Hypophyse (infundibulaire).

INHALATIONS :
°Nitrite d'amyle.

Contre les Douleurs

Repos. Stimulants.
Sinapismes de moutarde à la région du cœur.

* 'Tabloid' § 'Tabloid' Hypodermique ° 'Vaporole'
† 'Soloid' †† 'Elixoid'

Cœur, Maladies du—*suite*

Contre l'Insomnie

Repos. Stimulants.
Sulfonal. *Trional. *Véronal.
*Chloralamide.

Contre l'Hydropisie

POUR L'USAGE INTERNE :

*Digitale. *Strophanthus.
*Sulfate de spartéine. Genêt.
*Citrate de caféine. *Jalap.
*Pilule bleue, scille et digitale.
*Élatérine. *Coloquinte.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Digitaline. §Strophanthine.

Coliques (*voir aussi* CALCULS)

Rénales

Bains chauds ; fomentations avec térébenthine et opium.
*Belladone. *Opium.
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).

Hépatiques

*Morphine. *Belladone.
*Chloral hydraté.
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
Sangsues à la région du foie.

Intestinales

Des coliques répétées peuvent être dues à un empoisonnement par le plomb, ou à une maladie locale, telle que ulcère gastrique ou appendicite.
Régime prudent.
Huile de ricin et *Opium.
*Calomel et *Salins.
*Morphine. *Belladone.
Chloroforme 'Wellcome.'
Éther 'Wellcome.' *'Xaxa.'

LOCALEMENT :

Fomentations. Anodins.
Fomentations de térébenthine.
Cataplasmes.

INHALATIONS :

Chloroforme 'Wellcome.'
Éther 'Wellcome.'

Collapsus
(OU ÉVANOUISSEMENTS)

Maintenir la tête basse.
Appliquer de l'eau froide au visage.

Collapsus—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE :

Alcool. Sal volatile.
Éther 'Wellcome.'

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Strychnine.
Éther 'Wellcome.'
°Extrait d'hypophyse (infundibulaire). §'Tyramine.'

INHALATIONS :

°Nitrite d'Amyle.
°Ammoniaque Aromatique.

Condylomes

Insister sur une propreté absolue.

POUR L'USAGE INTERNE :

Mercure. *Iodure de potassium.
*Iodure de mercure et de potassium. *'Soamin.'
*Bichlorure de mercure avec iodure de potassium.
*Iodure jaune de mercure.
*Iodo-ricinoléate de chaux.

LOCALEMENT :

Lotions †d'Acide phénique.
Lotions de †Sublimé corrosif.
Lotions †d'Iodure de mercure et de potassium.
Calomel et zinc en poudre.
Pommades mercurielles.

Conjonctivite

Examiner les yeux séparément et s'il y a des défauts de réfraction les corriger.

LOCALEMENT :

Mouche derrière l'oreille. Sangsues aux tempes. Compresses chaudes ou froides. Calomel en poudre. Oléate de mercure et morphine sur la partie externe des paupières dans la conjonctivite palpébrale.
‖Alun. ‖'Hemisine.' ‖'Epinine.'
Gouttes d'huile de ricin dans l'œil.
Lotions de :—†Alun, †Argyrol, †'Nizin,' †Acide borique, †Sulfate de cuivre, †Sublimé corrosif, †Protargol, †Chlorure de zinc, †Sulfate de zinc, †Nitrate d'argent, †Sous-acétate de plomb, ou † 'Hemisine' ; ou contre les douleurs, lotion de †Chlorhydrate de cocaïne.

* '*Tabloid*' ‖ '*Tabloid*' *Ophthalmique* ° '*Vaporole*'
† '*Soloid*' § '*Tabloid*' *Hypodermique*

Constipation

Faire prendre l'habitude d'aller régulièrement à la selle.
Bains froids au réveil.
Exercice. Massages de l'abdomen.

POUR L'USAGE INTERNE :

De l'eau froide en se levant, ou un verre d'eau chaude avalé à petites gorgées en s'habillant. Un verre d'eau chaude en se couchant.
Liquides en abondance (de la première importance).
Pain bis. Gruau.
Fruits. Légumes.
*Laxatif végétal. *Aloïne.
¶Fruit laxatif. 'Alaxa.'
*Cascara sagrada. *Pilule bleue.
*Composé de cascara et de gentiane. *Composé d'aloïne.
*Composé de cascara. *Calomel.
*Noix vomique.
*Composé de noix vomique.
*Composé de soufre.
*Composé d'iridine. *Strychnine.
*Pilule bleue et rhubarbe.
*Poudre composée de rhubarbe.
*Poudre composée de réglisse.
*Composé cathartique.
*Fiel de bœuf. *Fiel de porc.
*Pilule bleue, coloquinte et jusquiame. *Gaïac et soufre.
*Teinture de belladone.
*Citrate de magnésie (véritable), effervescent.
*Sulfate de magnésie, effervescent.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.
*Sulfate de Soude, effervescent.
*Sel de Carlsbad, effervescent.
'Paroleine.'

PAR VOIE RECTALE :

Glycérine 'Emule.' Lavements.
Composé de Savon 'Emule.'

Contusions

LOCALEMENT :

'Hazeline.' Teinture d'arnica.
Lotions d'alcool.
Lotion de †Sous-acétate de plomb.
Lotion de †Plomb et opium.

Convulsions (des Enfants)

Traiter la cause excitante, telle que dentition, troubles gastro-intestinaux, vers, constipation, rachitisme, commencement de maladie aiguë, coqueluche, lésions du cerveau, méningite, blessures.
Bains chauds, avec glace à la tête. *Bromure de potassium.
*Chloral hydraté. *Belladone.

INHALATIONS :

Chloroforme 'Wellcome.'

Coqueluche

Beaucoup d'air ; bonne nourriture.
S'il y a de la fièvre, repos au lit.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Ipécacuanha et scille.
*Teinture de belladone.
Composé de bromure de sodium.
*Quinine.
Morphine. *Chloral hydraté.
*Cannabis indica. *Jusquiame.
*Acide salicylique.
'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Xaxa' et poudre de Dover.
*'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
'Aspirin.' *Strychnine.
*Antipyrine. *Phénacétine.
*Composé de phénacétine.
*Valérianate de zinc.
*Composé de caféine.
*Composé d'antifébrine.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Hyoscyamine. °§Atropine.

LOCALEMENT :

Liniment d'acide acétique, térébenthine, Chloroforme 'Wellcome,' ou moutarde.

INHALATIONS :

†Acide phénique, créosote ou teinture composée de benjoin.
°Composé de chloroforme et iodure d'éthyle.

Pendant la Convalescence

Changement d'air. *Aliment chimique.
*Composé d'hypophosphites.
*Sirop d'Easton. *Strychnine.
Préparations 'Kepler.'

---

* *'Tabloid'* § *'Tabloid' Hypodermique* ° *'Vaporole'*
† *'Soloid'* ¶ *Pastille 'Tabloid'*

Cornée (Inflammation de la)

Pour l'usage interne :

*Iodure de potassium. Mercure.
*Perchlorure de mercure et iodure de potassium.
*Iodo-ricinoléate de chaux.
*Iodure jaune de mercure.

Localement :

†‖Atropine. †‖Cocaïne. ‖Dionine. ‖Physostigmine. ‖Pilocarpine. Pommade d'oxyde jaune de mercure. Poudre de calomel. ‖Fluorescéine (pour le diagnostic).

Cors aux Pieds

Localement :

Chaussures allant bien.
Emplâtres pour cors.
Tremper le cor dans l'eau chaude, ou dans une lotion de Carbonate de soude et le racler.
Appliquer une combinaison de collodion, d'acide salicylique et de cannabis indica.
S'il y a de l'inflammation, repos et cataplasmes. Iode.
Acide acétique. Acide chromique. †Nitrate d'argent.

Crampes

Si elles sont récurrentes, examiner l'urine pour voir si elle ne contient pas d'albumine ou de sucre ; veiller au régime, et libérer les intestins.

Pour l'usage interne :

*Morphine. Chlorodyne.
*Essence de gingembre.
*Soda-Mint. *'Gingament.'
*Teinture de belladone.

Localement :

Belladone. Opium.
Bains chauds.

Craw-Craw

Tremper dans l'eau chaude les parties affectées.
Percer les pustules et enlever les croûtes de celles qui ont crevé.
Racler les ulcères indolents ou appliquer vésicatoire fluide.

Craw-Craw *suite*

Saupoudrer avec acide borique ou iodoforme, couvrir de Coton sec et bander convenablement. Changer les pansements une ou deux fois par semaine.

Crétinisme (sporadique)

*Glande thyroïde.
*Iodo-ricinoléate de chaux. Iode.

Croup

Spasmodique

Souvent associé au rachitisme.
Traiter le catarrhe s'il y en a.
*Bromure de potassium.
*Chloral hydraté.
*Vin d'ipécacuanha.
*Ipécacuanha et antimoine.

Inhalations :
Chloroforme 'Wellcome.'

Faux (*voir* Laryngite)

Membraneux (*voir* Diphthérie)

Cystite

Repos au lit. Régime simple.
Liquides émollients en abondance.
Traiter la cause, telle que gonorrhée, rétrécissement, prostate enflée, calculs, goutte. S'assurer qu'il n'y a pas d'urine stagnante.
Examiner l'urine pour le *Bacillus coli*.

Pour l'usage interne :

*Salicylate de soude. Acide borique. *'Aspirin.'
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxa' et poudre de Dover.
*¶Composé d'acide benzoïque.
*Poudre de Dover. *Belladone.
*Urotropine. *Salol. Buchu.
*Essence de santal.
*Cubèbe et belladone.
*Teinture de jusquiame.
Hydroxyde de Potassium dissous.
Bleu de méthylène.

Localement :

Lavages de la vessie avec des solutions chaudes de— †Argyrol. †Acide borique, †'Hemisine,' †'Nizin,' †Nitrate d'argent, †Protargol,

* *'Tabloid'*
† *'Soloid'*
‖ *'Tabloid' Ophthalmique*
¶ *Pastille 'Tabloid'*

Cystite—*suite*

LOCALEMENT—*suite :*

†Permanganate de potasse, Acide salicylique, *Sulfate de quinine neutre, ou faibles solutions alcalines ou acides, selon la réaction de l'urine.

PAR VOIE RECTALE :

Suppositoires 'Enule' de Morphine et Belladone.

Suppositoires de Jusquiame. Lavements avec Opium et eau chaude.

Vaccins autogeniques si indiqués par l'examen bactériologique de l'urine.

Débilité (SANS CAUSE APPARENTE)

Beaucoup d'air, repos, changement d'air ; bains froids ou tièdes le matin et frictions de la peau.

*Strychnine. Acides minéraux.

*Composé d'hypophosphites.

*Quinine. *Noix vomique.

*Sirop d'Easton. *Blaud (Pil. fer.).

*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.

*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada. *Manganèse et fer.

*Fer, arsenic et digitaline.

††Composé de formiates.

*Trois Sirops.

*††Glycérophosphates.

Fer Dialysé (B. W. & Cie).

Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.

'Bivo,' Vin Ferrugineux à l'Extrait de Viande.

Préparations 'Kepler.'

Décubitus

Atténuer la pression en changeant la position du malade, ou en employant un matelas ou coussin d'eau, et emplâtre de feutre.

Laver les parties affectées avec de l'*Hazeline' ou de l'alcool et de l'eau ; sécher et saupoudrer avec de l'amidon, de l'oxyde de zinc, ou de l'†Acide borique en poudre.

Traiter l'exfoliation avec des lotions antiseptiques ou des cataplasmes au charbon.

Tenir la surface aseptique avec de l'acide borique ou du bismuth.

Stimuler avec 'Hazeline,' teinture composée de benjoin,

Décubitus—*suite*

baume du Pérou, †Nitrate d'argent, glycéré de borax, ou glycérine et acide tannique.

Délire (DANS LES FIÈVRES)

Bains froids et application d'eau froide au moyen d'éponges.

Glace à la tête.

*Composé d'antifébrine.

Composé de bromure de Sodium.

*Opium. *Chloral hydraté.

*Phénacétine.

*Tartre stibié.

*Sulfate de quinine neutre.

*Antifébrine.

*Salicylate de quinine.

*'Xaxaquin.'

*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'

*'Xaxa' et Phénacétine.

Delirium Tremens

(*Voir* ALCOOLISME)

Dengue

Isoler le malade. Repos au lit.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Salicylate de soude.

*'Xaxa' (acide acétyl-salicylique).

*'Xaxa' et poudre de Dover.

*'Xaxa' et phénacétine.

Antipyrine. *Phénacétine.

*Teinture de belladone.

POUR L'USAGE EXTERNE :

Chloroforme, Belladone ou liniment camphré. Entourer de *Coton les parties douloureuses.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Composé d'hyoscine (A ou B selon les cas).

Pendant la Convalescence

*Sirop d'Easton. *Quinine.

*††Glycérophosphates.

††Composé de formiates.

*Salicylate de soude. *'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).

Aliments substantiels. Changement d'air.

Dents, Maux de

POUR L'USAGE INTERNE :

Purgatifs.

*Morphine. *Chloral hydraté.

* *'Tabloid'*
† *'Soloid'*

§ *'Tabloid' Hypodermique*
†† *'Elixoid'*

Dents, Maux de—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite :*

*Antipyrine. *Phénacétine.
*Composé de phénacétine.
*Teinture de gelsémium.
"Xaxa" "Xaxa" et caféine.
*"Xaxa" et phénacétine.
*"Xaxa" et poudre de Dover.
*"Xaxaquin."
*"Xaxa" et "Xaxaquin."
*"Aspirin." *Butyl-chloral hydraté et gelsémine.

LOCALEMENT :

Huile de clous de girofle, appliquée chaude, sur du *Coton, à la dent.
†Acide phénique concentré, ou créosote, appliqués sur du *Coton à la dent avec le plus grand soin afin de ne brûler ni la peau ni la muqueuse.
Frotter les gencives avec Chlorhydrate d'ammoniaque, Laudanum, lotion de †Cocaïne, lotion †d'Eucaïne, Chloroforme "Wellcome," ou camphre et chloral hydraté.
En frottant les gencives avec le chloroforme, prendre bien soin de ne pas l'approcher des lèvres.
Fomentations chaudes à l'intérieur de la bouche.

Diabète Insipide

Régime sec.
*Atropine. *Ergotine.
"Ernutin." *Opium.
*Sel de Carlsbad, effervescent.
*Sel de Vichy, effervescent.
*Valérianate de zinc. *Belladone.
††Composé de formiates.
*Bromure de potassium.
¶Glycérine.

Diabète Sucré

Lévulose au lieu de sucre.
*Codéine. *Opium. ¶Glycérine.
*Codéine et noix vomique.
*Salicylate de soude. *Salicylate de soude et bicarbonate de potasse. *"Xaxa" (Acide acétyl-salicylique).
*"Aspirin." *Strychnine.
††Composé de formiates.
*Bicarbonate de soude en fortes doses.
*Bromhydrate d'ammoniaque.
*Chlorhydrate d'ammoniaque.
*Acide arsénieux avec *Carbonate de lithine. *Antipyrine.

Diabète Sucré—*suite*

Dans le Coma

*Bicarbonate de soude en fortes doses.
§Nitrate de pilocarpine.
Injections intraveineuses ou rectales de †Solutions salines.
Inhalations d'oxygène.

Diarrhée

Peut provenir d'une constriction de l'intestin, d'une impaction de matières fécales, de carcinomes au rectum, ou d'ulcération. Dans les diarrhées aiguës ou d'été, il y a des selles abondantes et molles, généralement causées par une nourriture impropre ou par la fermentation d'aliments non digérés dans les intestins. Chez les enfants, examiner le biberon, et, au besoin, ajouter au lait du *Citrate de soude.

Purgatifs :

*Calomel. *Pilule bleue. *Huile de ricin.
*Rhubarbe.

Astringents :

*Mixture astringente.
*Poudre composée de Kino.
*Poudre de craie aromatisée.
*Acide tannique. Eau de chaux.
†Sulfate de cuivre. "Hazeline."
Acide sulfurique aromatisé.
Décoctions de bois de campêche.
Catechu. *Bismuth.
*Opium. *Plomb et opium.

Antiseptiques intestinaux :

*Poudre grise. *Acide phénique.
*Bichlorure de mercure.
*Salicylate de quinine. *Salol.
*Sous-gallate de bismuth.
*Salicylate de bismuth.
*Béta-naphtol. *Benzo-naphtol.
*Carbonate de gaïacol.
*Camphorate de gaïacol.
*"Xaxaquin."
*"Xaxa" et "Xaxaquin."

Sédatifs :

*Poudre de Dover. *Bismuth.
*Ipécacuanha.
*Bismuth et poudre de Dover.
Lavements d'amidon et opium.
Suppositoires "Enule" de Sous-gallate de bismuth ou de morphine.

* *"Tabloid"* § *"Tabloid" Hypodermique* †† *"Elixoid"*
† *"Soloid"* ¶ *Pastille "Tabloid"*

Diarrhée — *suite*

Chronique

Chercher la cause. Examiner le rectum.
*Sous-nitrate de bismuth.
*Bichlorure de mercure.
*Poudre aromatique de craie et d'opium.

Diphthérie

POUR L'USAGE INTERNE :

*Perchlorure de fer et *Chlorate de potasse. *Noix vomique.
*Sulfite de magnésie.
*Citrate de caféine.
*Composé de fer et d'arsenic.
Bleu de méthylène.

Dans les périodes avancées :

°'Hemisine.' §'Tyramine.'

PULVÉRISATIONS :

Glycérine phéniquée.
†Composé naso-pharyngien.
*Chlorate de potasse.
†Composé nasal de phénol.
Eau de chlore.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérum antidiphthérique 'Wellcome,' ou Antitoxine Diphthérique Concentrée 'Wellcome,' immédiatement.

S'il y a de la Paralysie

Repos au lit ; régime complet ; nourrir au moyen du tube nasal ou stomacal.
*Noix vomique. *Strychnine.
*Blaud (Pil. fer.). *Quinine.
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
Massages. Électricité.

Dracontiase (OU FILAIRE)

Fréquentes fomentations chaudes pour encourager le ver à pondre ses embryons, après quoi (15 à 20 jours) le ver est facilement enlevé. Panser avec des lotions boriquées et du lint ou charpie jusqu'à ce que la blessure guérisse.

Ou bien injecter dans le ver ou dans le tissu avoisinant une solution de †Bichlorure de mercure (au 1000e).

Dysenterie

Repos au lit. Veiller au régime.

Dysenterie — *suite*

POUR L'USAGE INTERNE :

Stimulants.
Sulfate de magnésie effervescent ou *Mistura alba, au début, en fortes doses.
*Poudre de Dover. *Salol.
*Bismuth et poudre de Dover.
Plomb et Opium.
*Mixture astringente.
*Bichlorure de mercure, en petites doses, fréquemment.
Sous-nitrate de bismuth. 'Hazeline.' Canelle.
Désinfectants intestinaux.
*Chlorhydrate d'ammoniaque.
*Santonine. Soufre sublimé.

POUR LA DYSENTERIE AMIBIENNE :

Ipécacuanha à forte dose.

PAR VOIE RECTALE :

Suppositoires 'Enule' de Morphine.
Lavements d'eau chaude avec astringents : †Alun, †Sulfate de cuivre, †'Hemisine,' †Nitrate d'argent, †Sulfate de zinc, †Acétate de plomb et opium, ou †Sous-acétate de plomb.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Serum antidysentérique 'Wellcome.'
Vaccin dysentérique

Dysménorrhée

Repos. Bain de siège de moutarde. Fomentations avec térébenthine.

POUR L'USAGE INTERNE :

Glande thyroïde.
Chlorhydrate de cotarnine.
*Aconit. Apiol. *Camphre.
*Morphine. *Poudre de Dover.
*Belladone. *Ergotine.
*Bromure de potassium.
*Antifébrine. 'Ernutin.'
*Antipyrine. *Phénacétine.
*Composé de caféine.
*Composé de phénacétine.
*Gaïac et soufre. *'Xaxa.'
*Préparations de fer. *'Varium.'
*Extrait de viburnum prunifolium. *'Aspirin.'
Pyramidon. *'Lodal.'
*Valérianate de zinc.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Citrate d'ergotinine.
§Ergotinine et strychnine.
°'Ernutin.' °§Morphine.
§Chlorhydrate de cotarnine.

* 'Tabloïd'
† 'Soloïd'

§ 'Tabloïd' Hypodermique
° 'Vaporole'

Dyspepsie

Aiguë

Repos au lit.

POUR L'USAGE INTERNE :
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.
Eau gazeuse. Glace. Glycérine.
Huile de ricin et *Opium.
*Bismuth. *Composé de Mucine.
*Calomel. *Pilule bleue.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.
*Opium.
*Menthol. *Composé de menthol.
Eau chaude ou émétiques.
Acide cyanhydrique dilué.

LOCALEMENT :
Sinapismes de moutarde.
Fomentations.

Chronique

Acides minéraux dilués.
*Pepsine et strychnine.
*Pepsine, bismuth et strychnine.
*Pepsine, bismuth et charbon.
*'Pepana.' *Gingembre.
*Fiel de bœuf ou *Fiel de porc.
Extrait de Malt 'Kepler.'
*Acide phénique.
*Capsicum.
*Rhubarbe et gentiane.
*Rhubarbe et soude.
Cardamome.
Chloroforme 'Wellcome.'
*Soda-Mint. *'Gingament.'
*Noix vomique.
*Composé de carbonate de chaux.
*Benzo-naphtol. *Chinosol.
*Bicarbonate de soude.
*Sous-nitrate de bismuth.
*Composé de béta-naphtol.

Éclampsie (PUERPÉRALE)

POUR L'USAGE INTERNE :
Purgatifs. *Morphine.
*Glande thyroïde.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
°§Morphine.
*Glande thyroïde (sous les seins).

PAR VOIE RECTALE :
†Injections salines.
*Bromure de potassium et *Chloral hydraté, 3 gr. 89 de chacun dans une solution d'amidon.
*Glande thyroïde.

POUR L'USAGE EXTERNE :
Saignées. Envelopper dans couvertures mouillées.

Éclampsie (PUERPÉRALE) — *suite*

INHALATIONS :
Chloroforme 'Wellcome.'
Éther 'Wellcome.' Oxygène.
°Nitrite d'amyle.

Eczéma *(voir aussi* PEAU)

Protéger contre toute irritation : chaleur, soleil, écoulements. Laver peu, employer lait et eau, ou eau de farine d'avoine, ou huile d'amande sur un linge fin.

Lanoline ou Savon à la Lanoline ichthyolée.
Empêcher le contact des plis du corps entre eux.
Veiller au régime et à la digestion. Tenir les intestins libres.
Voir si l'urine ne contient pas de sucre ni d'albumine.

POUR L'USAGE INTERNE :
Stomachiques, toniques, purgatifs.
*Sulfate de magnésie, effervescent.
*Mistura alba.
Soufre. *Belladone.
*Glande thyroïde.
*Acide phénique.
Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.'
*Composé d'arsenic.

LOCALEMENT :

A l'État Aigu

Poudres de :

Oxyde ou Carbonate de zinc.
Amidon. †Acide borique.
Bismuth. Acide salicylique.

Lotions de :

†Nitrate d'argent, †Acide borique, †Sous-acétate de plomb ou liniment oléo-calcaire.

Pommades sédatives de :

Oxyde de zinc ou sous-acétate de plomb ou acide borique dans Lanoline. Crème 'Hazeline.' Acide borique avec Crème 'Hazeline.' 'Borofax.'
Glycéré de borax.
Savon à la Lanoline ichthyolée.
Savon au goudron végétal.

Pour calmer les démangeaisons

Lotions de calamine.

* *'Tabloid'*
† *'Soloid'*

§ *'Tabloid' Hypodermique*
° *'Vaporole'*

Eczéma—*suite*

LOCALEMENT—*suite :*

Pour calmer les démangeaisons—*suite*

Lotions de carbonate de soude.
Acide cyanhydrique dilué.
Teinture composée de benjoin appliquée avec un pinceau.
Borax. Menthol. Camphre.
†Chlorhydrate de cocaïne.
†Acide phénique (lotion diluée).

Chronique

Applications plus stimulantes.
Bains de soufre. Glycérine.
Pommades mercurielles.
Pommade ichthyolée.
Pommade d'iodure de soufre.

Emissions

(Nocturnes ; Séminales ; Spermatorrhée).

Provoquer des selles régulières ; vermifuges s'il y a des vers ; éviter les stimulants ; supprimer tout liquide deux heures avant le moment du coucher ; faire uriner après le premier somme ; éviter un lit de plumes ou trop mou ; éviter la position sur le dos ; si les urines sont trop acides ou alcalines, traiter en conséquence.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Sulfate de magnésie, effervescent.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent.
*Mistura alba.
*Bromure de potassium.
*Sulfate de quinine neutre.
*Strychnine (doses complètes).
*Ergotine et strychnine.
*Acide arsénieux (doses complètes).
Camphre. *Chloral hydraté.
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
††Composé de formiates. 'Ernutin.'
*Composé d'hypophosphites.
*Teinture de belladone.
Cantharides et fer.
*Trois Valérianates.

Empoisonnement par le Plomb

Chronique

Mesures prophylactiques.
Acide sulfurique dilué.
*Sulfate de magnésie, effervescent.
*Morphine. *Opium.
*Iodure de potassium.

Engelures

POUR L'USAGE INTERNE :

*Glande surrénale.
*Lactate de chaux.

LOCALEMENT :

Chaleur ; frictions sèches.
Exercice. Bains de pieds électriques.

Si elles sont intactes, les badigeonner avec :

Iode. Laudanum.
Huile de cajuput et menthol.
Teinture de capsicum.
Pommade ichthyolée.
Liniment de belladone.
Collodion et cocaïne.

Si elles sont crevées, appliquer :

†Acide borique et Lanoline.
Baume du Pérou. Collodion.
Laudanum.
"Neige 'Hazeline.'"

Épilepsie

Traiter toute cause possible d'irritation, telle que tumeur au cerveau, gomme, carie des dents, pression dentale, et abcès de l'oreille, troubles utérins, astigmatisme, ou autre défaut de réfraction. Maintenir l'état générale avec une nourriture de bonne qualité, beaucoup d'air et des toniques. Limiter ou supprimer les viandes. Tenir libres les intestins.

POUR L'USAGE INTERNE :

Bromhydrate d'ammoniaque.
*Bromure de potassium.
*Bromure de sodium.
*Cérébrine.
*Bromure de strontium.
*Trois Bromures, effervescents.
*Composé de bromure de sodium.
*Trinitrine. *Valérianate de zinc.
*Acide borique. *Ipécacuanha.
*Borax. *Belladone. *Camphre.
*Lactate de chaux. *Calomel.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Hyoscine. §Hyoscyamine.
§Picrotoxine.

INHALATIONS :

Chloroforme 'Wellcome.'

* *'Tabloid'* § *'Tabloid' Hypodermique* ° *'Vaporole'*
† *'Soloid'* †† *'Elixoid'*

Épilepsie—*suite*

INHALATIONS—*suite :*

Éther 'Wellcome.'
°Nitrite d'Amyle.

Epistaxis

Examiner le nez pour s'assurer qu'il n'y a pas de cause locale. Traiter les conditions associées, telles que maladies de Bright, fièvre typhoïde, excroissance en formation.
Repos avec la tête élevée.
Glace derrière le cou.
Chaleur aux mains et aux pieds.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Ergotine. 'Ernutin.'
*Aconite. *Acide tannique.
*Lactate de chaux.
*Sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.
Teinture de perchlorure de fer.

LOCALEMENT :

Injections d'eau glacée. †Alun.
Perchlorure de fer. 'Hazeline.'
†'Hemisine.' °'Epinine.'
Acide tannique. Tampons aux narines.
Appliquer aux narines qui saignent de petits tampons de *Coton saturé d'†'Hemisine.'
Tampons dans les fosses nasales pour les cas graves.
Application du cautère électrique (dans les cas qui s'y prêtent) au point d'où provient l'hémorrhagie.

Érysipèle

POUR L'USAGE INTERNE :

Teinture de perchlorure de fer, avec *Sulfate de magnésie.
*Sulfate de quinine basique.
*Salicylate de soude. *Ichthyol.
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique). *'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérum Antistreptococcique de l'Érysipèle, 'Wellcome.'
Sérum Antistreptococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'

LOCALEMENT :

Amidon. Collodion.
Glycéré de belladone.
†Nitrate d'argent. Iode.
Ichthyol et Lanoline.
Savon à la Lanoline ichthyolée.

Estomac, Aigreurs et Brûlures d'

Grands verres d'eau.
Carbonates alcalins.
*Soda-Mint.
*'Coffee-Mint.' *'Gingament.'
*Composé de carbonate de chaux.
*Composé de carbonate de magnésie. *Mistura alba.
*Acide phénique. *Béta-naphtol. *Benzo-naphtol.
*Acide salicylique.

Évanouissements (*voir* COLLAPSUS)

Fibroïdes (UTÉRINS)

Opération.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Glande thyroïde. *'Varium.'
*Ergotine. 'Ernutin.' *'Lodal.'
*'Hemisine.' *'Mamos.'
*Chlorhydrate d'hydrastine.
*Composé d'hydrastine.
*Composé d'hydrastine avec Chlorhydrate de cotarnine.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Ergotinine. °'Ernutin.'
§Ergotinine et strychnine.
§Ergotoxine.

Fièvres

POUR L'USAGE INTERNE :

Lait et aliments peptonisés.
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné (très dilué).
Extrait de Malt 'Kepler.'

Diaphorétiques :

Solution d'acétate d'ammoniaque.
*Nitrate de potasse.
Carbonates alcalins.
*Antimoine. *Aconit.
*Antifébrine. *Poudre de Dover.

Stimulants :

Alcool. Térébenthine. *Camphre.

Antipyrétiques :

*Antipyrine. *Antifébrine.
*Composé d'antifébrine.
*Composé de phénacétine.
*Composé de phénacétine et de quinine.
*Sulfate de quinine neutre.
*Salicylate de quinine.
*Teinture de Warburg.

* '*Tabloid*'
† '*Soloid*'

§ '*Tabloid*' *Hypodermique*
° '*Vaporole*'

Fièvres — *suite :*

POUR L'USAGE INTERNE — *suite :*

Antipyrétiques — suite :

*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique)
*'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'

Sédatifs :

*Chloral hydraté.
*Bromure de potassium.
*Opium. *Sulfonal. *Trional. *Véronal.

POUR L'USAGE EXTERNE :

Compresses humides, applications d'eau froide au moyen d'éponges, ou douches, vessies de glace, bains froids, bains d'air.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérums dans certaines fièvres :

Sérum Antistreptococcique de la fièvre puerpérale, 'Wellcome.'
Sérum Antistreptococcique du rhumatisme articulaire, 'Wellcome.'
Sérum Antistreptococcique de la fièvre scarlatine, 'Wellcome.'
Sérum Antibacille du côlon, 'Wellcome.'
Sérum Antiméningococcique 'Wellcome' (par injection intraspinale).
Sérum Antityphoïde 'Wellcome.'

Fièvre des Foins

Séjour au bord de la mer ou sur les montagnes, évitant les régions agricoles et poussiéreuses.

Traiter toute affection nasale.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Acide arsénieux. *Noix vomique.
*Belladone. *Iodure de potassium.
*Chlorhydrate d'ammoniaque. *Quinine.
*Valérianate de quinine.
*Valérianate de zinc.
*Glande surrénale. *'Hemisine.'

LOCALEMENT (aux yeux et au nez) :

†‖'Hemisine.' °‖'Epinine.' Pollantine.

INSUFFLATIONS NASALES :

Composé de menthol pour priser (B. W. & Cie).
Sulfate de quinine neutre.

Fièvre des Foins *suite*

PULVÉRISATIONS DANS LES FOSSES NASALES :

'Paroleine' mentholée ou camphrée.
†Eucaïne. †'Hemisine.' 'Epinine.'
†Composé de phénol, nasal.
†Composé antiseptique et alcalin, nasal.
†Composé naso-pharyngien.

Fièvre Hémoglobinurique

POUR L'USAGE INTERNE :

*Chlorhydrate de quinine.
*Euquinine.
*Acide arsénieux.
*Sulfate de strychnine.
*Bicarbonate de soude.
*Bichlorure de mercure.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Bichlorhydrate de quinine.
*'Soamin.'

PAR VOIE RECTALE :

Suppositoires 'Enule' de Quinine.

Fièvre Intermittente

*Sulfate de quinine neutre.
*Teinture de Warburg.
*Salicylate de quinine.
*Euquinine. *Opium.
*Trinitrine. *Composé de Trinitrine.
Nitrite de Soude. *Pilocarpine.
°Iodure de potassium.
*'Aspirin.'
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
Acide arsénieux. *Strychnine.
*Blaud (Pil. fer.) *Acide salicylique.
Suppositoires 'Enule' de Quinine.
*'Soamin.'

Fièvre Jaune

Isoler le malade.
Protection contre les moustiques.
Au commencement (si l'urine ne contient pas d'albumine) 1 gr. 30 de *Qumine et 1 gr. 30 de

---

* *'Tabloid'* ‖ *'Tabloid' Ophthalmique* ° *'Vaporole'*
† *'Soloid'* § *'Tabloid' Hypodermique*

Fièvre Jaune—*suite*

*Calomel, suivis d'un purgatif salin. Glace à la tête. S'il y a de l'albumine dans les urines, libérer les intestins en administrant un lavement.

Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné, gelée de bœuf. Lavements de lait peptonisé avec de l'eau de vie.

POUR L'USAGE INTERNE :

Glace. *Bicarbonate de soude. *Bichlorure de mercure. ¶Jus de citron. *Sulfate de quinine. *Acide arsénieux. *Acide phénique, souvent.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

(Dans la syncope cardiaque)

°§Strychnine.

§Sulphate de spartéine.

LOCALEMENT :

(Si l'urination a cessé)

Ventouses aux lombes, suivies de fomentations chaudes ou d'emplâtres de moutarde.

Fièvre Puerpérale

POUR L'USAGE INTERNE :

*Perchlorure de fer.

LOCALEMENT :

Injections utérines de †Sublimé corrosif ou †d'Iodure de mercure et de potasse.

Curettage.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérum Antistreptococcique de la fièvre puerpérale, marque 'Wellcome.'

Sérum Antistreptococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'

Sérum Antibacille du côlon, marque 'Wellcome.'

Fièvre Typhoïde

Aliments peptonisés.

Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.

*Acide phénique. *Salol.

*Composé de béta-naphtol.

*Benzo-naphtol. *Urotropine.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE, OU POUR INJECTION PAR VOIE RECTALE :

Sérum Antityphoïde 'Wellcome.'

Fièvre Typhoïde—*suite*

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE, OU POUR INJECTION PAR VOIE RECTALE—*suite* :

†Solutions salines (pour hémorrhagie).

°Extrait d'hypophyse (infundibulaire).

Filaire (*voir* DRACONTIASE)

Filariose

Repos au lit.

Combattre les vomissements par glace, boissons effervescentes ou contre-irritants à l'estomac.

S'il y a des douleurs rénales très fortes, ventouses et fomentations aux lombes.

S'il y a de la chylurie, vider la vessie au moyen de la sonde.

Quitter l'endroit où le mal a été contracté.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Antipyrine.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Hyoscine. §Morphine et atropine.

LOCALEMENT :

Applications de belladone aux glandes enflées de l'aine.

Fissure de l'Anus

Propreté extrême localement.

Provoquer des selles molles jusqu'au moment de l'opération.

LOCALEMENT :

†Nitrate d'argent. Ichthyole.

†Eucaïne et Lanoline.

†Cocaïne et Lanoline.

PAR VOIE RECTALE :

Suppositoires 'Enule' de—Sous-gallate de Bismuth, Composé d' 'Hazeline,' Noix de galle et Opium, 'Hemisine,' Cocaïne, Morphine, Belladone ou Morphine et Belladone combinées.

Fistule de l'Anus

Propreté extrême localement.

PAR VOIE RECTALE :

Jusqu'au moment de l'opération Suppositoires 'Enule' de :—Sous-gallate de Bismuth,

* '*Tabloid*' † '*Soloid*' § '*Tabloid*' *Hypodermique* ¶ *Pastille* '*Tabloid*' ° '*Vaporole*'

Fistule de l'Anus—*suite*

PAR VOIE RECTALE—*suite* :

Morphine et Belladone, Noix de galle et Opium, 'Hemisine' au Composé d' 'Hazeline.'
Suppositoires d' 'Hazeline.'
Suppositoires de Jusquiame.

Flatulence

Eau chaude une heure avant les repas. Aliments secs. Nourriture compacte. Bien mâcher.
Tenir les intestins complétement libres.
*'Coffee-Mint.' *Soda-Mint.
*'Gingament.'
*Composé de carbonate de chaux.
*Composé de carbonate de magnésie.
*Rhubarbe, soude et magnésie.
*Bicarbonate de potasse.
*Composé de mucine.
*Teinture de capsicum.
*Bicarbonate de soude.
*Asa fœtida et opium.
*Charbon. Huile de Cajuput.
*Benzo-naphtol. *Menthol.
*Composé de béta-naphtol.
*Acide salicylique. *Acide phénique.
Menthe. Sal volatile.
Cardamome. Lavande.
'Paroleine.'

Foie

(*Voir* BILIEUX, HÉMATÉMÈSE, HYDROPISIE)

Folie

Aiguë

POUR L'USAGE INTERNE :

*Chloral hydraté.
*Belladone.
*Morphine.
*Bromure de potassium.
*Teinture de cannabis indica.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine. °§Hyoscine.
§Hyoscyamine.

POUR L'USAGE EXTERNE :

Douches froides.

Foulures

Repos ; fomentations très chaudes, suivies par l'application de bandages un peu serrés ; lotions froides ou évaporantes ; douches froides ; compression au moyen de bandes ; des massages commencés immédiatement après la foulure ont souvent un bon effet ; bains électriques d'air chaud ; chaleur et lumière rayonnantes.

LINIMENTS :

Aconit, opium, belladone, térébenthine, iode ou arnica.

Furoncles

Voir si l'urine ne contient pas de sucre. Supprimer toute cause de pression ou irritation, comme le frottement du faux col ou des manchettes.

POUR L'USAGE INTERNE :

Acides minéraux. *Sirop d'Easton. Acide sulfurique dilué. *Salicylate de soude.
*'Aspirin.'
*Acide arsénieux. *Quinine.
*Salicylate de quinine. *Sulfure de calcium. *'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxaquin.' *Nucléine.
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.

LOCALEMENT :

Fomentations. Cataplasmes. Belladone. Opium. Collodion. Injections †d'Acide phénique.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérum Antistaphylococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'
Vaccin Staphylococcique, Mélangé, 'Wellcome.'

Gale

Désinfecter le linge à la vapeur à haute tension. Soufre, goudron, mercure ammoniacal ou storax, avec Lanoline.
Enduire le corps d'une couche de baume du Pérou, et pendant le traitement voir s'il n'y a pas d'albuminurie.

Gangrène

Chercher attentivement la cause, surtout la condition des vaisseaux. Voir si l'urine contient de l'albumine ou du

* '*Tabloid*'
† '*Soloid*'
§ '*Tabloid*' *Hypodermique*
° '*Vaporole*'

Gangrène—*suite*

sucre. Régime complet et alcool.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Opium. *Codéine. *Morphine.
*Quinine. *Strychnine.
Quinine et arsenic.

LOCALEMENT :

Empêcher la sepsie.
Activer l'évaporation du fluide des parties mortes.
*Coton boriqué.
*Coton au cyanure.
*Coton iodoformé.
Coton à l'acide salicylique.
*Gaze au cyanure.
*Gaze boriquée.
*Gaze au sel alembroth.
*Gaze iodoformée.
Gaze au chinosol.
Oléate de morphine.
Glycéré de belladone.
Morphine et menthol.
'Borofax.'
Glycéré de Borax.

Glaucome (AIGU)

Veiller à l'état général.
Considérer une opération *immédiate*.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Sulfate de magnésie effervescent. *Mistura alba.
*Calomel. *Opium. *Morphine.
*Quinine. Quinine et arsenic.
*Strychnine. *Noix vomique.

LOCALEMENT :

‖Physostigmine. ‖Pilocarpine.
Sangsues (à la tempe).
Fomentations chaudes.

Glycosurie

(*Voir aussi* DIABÈTE)

Traiter la cause, telle que la goutte.
Modifier ou restreindre le régime.
Bains turcs ; exercice.
Lévulose au lieu de sucre.
*Salicylate de soude (en doses complètes).
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Aspirin.' *Antipyrine.
*Chlorhydrate d'ammoniaque.
*Strychnine. *Acide arsénieux.
*Codéine. *Morphine.

Goître (BRONCHOCÈLE)

Soigner l'état général.
Changer de lieu de résidence.

POUR L'USAGE INTERNE :

Iode. *Iodure de potassium.
*Thymus. *Iodo-ricinoléate de chaux.

LOCALEMENT :

Teinture d'iode.
*Iodure de potassium ou *Iodure rouge de mercure et Lanoline.
Injections de teinture d'iode.
Ablations dans certains cas.

Goître (EXOPHTHALMIQUE)

Repos au lit.
Éviter les soucis et les excitations.
Vessie de glace au cou et à la région du cœur. Électricité au cou.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Opium. *Morphine. *Quinine.
*Belladone. *Ergotine.
'Ernutin.'
*Digitale. *Strophanthus.
*Acide arsénieux. *Blaud (Pil. fer.).
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Fer, arsenic et digitaline.
*Composé de bromure de sodium. Sérum (Mœbius).
*'Hemisine.'
*Hypophyse. *Glande Surrénale.

Gonorrhée

Éviter exercice, alcool, tabac, café, fromages, poivre, épices et toute nourriture stimulante.
Repos, suspensoir, bains, chauds, fomentations fréquentes au périnée.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Sulfate de magnésie, effervescent
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.
Boissons émollientes en abondance. Buchu.
*Ipécacuanha et antimoine.
*Aconit. *Camphre. Copahu.
*Essence de santal.
*Poudre de Dover. *Urotropine.
*Cubèbe et belladone. *Salol.
*Bleu de méthylène. *Jusquiame.
Hydroxyde de potassium dissous, très étendu.

'Tabloid' ‖ *'Tabloid' Ophthalmique*

Gonorrhée—*suite*

PAR VOIE RECTALE :

Suppositoires 'Enule' de Belladone, si c'est nécessaire, pour calmer les douleurs.

INJECTIONS URÉTHRALES :

Eau chaude. †Acide borique. †Permanganate de potasse. †Sulfate de cuivre, †Sublimé corrosif, †'Nizin,' †Sulfophénate de zinc, †Chlorure de zinc, †Sulfate de zinc, †Acide borique et sulfate de zinc, †Permanganate de zinc, †Alun, †Alun et sulfate de zinc, †Plomb et opium, 'Hazeline,' †Protargol, ou †Argyrol.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérum Antigonococcique 'Wellcome.'
Sérum Antistreptococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'
Ces sérums peuvent aussi être administrés par le rectum.
Vaccin Gonococcique 'Wellcome.'

Gourme (*voir* IMPÉTIGO)

Goutte

Bains électriques d'air chaud. Chaleur et lumière rayonnantes. Bains turcs. Fluides en abondance.

POUR L'USAGE INTERNE :

Lévulose au lieu de sucre.
*Bicarbonate de potasse.
*Citrate de lithine, effervescent.
*Citrate de lithine et sulfate de soude effervescent.
*Hippurate d'ammoniaque.
*Teinture d'aconit.
*Carbonate de lithine.
*Sulfate de soude, effervescent.
*Sel de Carlsbad, effervescent.
*Sel de Vichy, effervescent.
*Iodure de potassium. *Piperazine.
*Gaïac et soufre.
††Composé de formiates.
*Composé de colchique.
*Salicylate de colchicine.
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique). *'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*Composé de benzoate de lithine. *'Aspirin.'
*Salicylate de soude.
*Composé de carbonate de chaux.

Goutte—*suite*

Pendant l'Accès

POUR L'USAGE INTERNE :

*Calomel et *Salins.
*Composé de colchique.
*Bromhydrate d'ammoniaque.
*Opium. *Phénacétine.

LOCALEMENT :

Éviter les applications très froides aux articulations enflammées ; tenir ces parties élevées et les entourer de *Coton. Employer des lotions évaporantes ou des fomentations alcalines chaudes.
Liniments sédatifs.
Collodion. Essence de menthe.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Aconitine. °§Morphine.

Haleine fétide

Examiner le nez, les dents, les amygdales et la gorge. Traiter dyspepsie, constipation, bronchite fétide, bronchectasie, gangrène, cavités fétides, empyèmes fétides.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Térébène. Musc. Pepsine 'Pepule.' Créosote.
*Salicylate de bismuth. *Salol.
*Composé de béta-naphtol.

LOCALEMENT :

Au nez (*voir* OZÈNE).

A LA BOUCHE :

Lavages ou sprays de *Chlorate de potasse et borax, †Permanganate de potasse, †Acide phénique, †Acide borique, Camphre ou †Composé nasal antiseptique et alcalin.
¶'Pinol.'
¶Menthol et eucalyptus.

INHALATIONS :

Essence d'eucalyptus ('Eucalyptia').
'Pinol.' Menthol. *Thymol.
Teinture d'iode. Créosote.
Acide phénique.
Éther, 'Wellcome.'

Hématémèse

(*Voir aussi* ULCÈRE GASTRIQUE)

Repos absolu au lit.

---

* *'Tabloid'* § *'Tabloid' Hypodermique* ¶ *Pastille 'Tabloid'*
† *'Soloid'* †† *'Elixoid'* ° *'Vaporole'*

Hématémèse—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE :

Sucer de la glace. Tisane d'orge.
Lait peptonisé. Petit lait.
Huile d'olive et crème en faibles doses.
*Morphine. *Opium. *Tanin.
*Lactate de chaux.
*'Hemisine.' 'Epinine.'
*Plomb et opium. 'Hazeline.'
Térébenthine, doses d'une goutte.
*Glande surrénale.
*Composé de Mucin.

PAR VOIE RECTALE :

Lavements nutritifs.
Suppositoires 'Enule' de Viande ou de Lait.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Ergotinine. °§Morphine.
°'Ernutin.'
§Morphine et strychnine.
Sérum Normal de Cheval, 'Wellcome.'

Hématurie

Traiter la cause—telle que purpura et autres maladies du sang (*voir* PURPURA), gonorrhée, calculs, excroissances en formation, tubercule du rein ou de la vessie, néphrite, prostatite, etc.

Dans la Néphrite Aiguë

POUR L'USAGE INTERNE :

*Teinture de digitale.
Ergot de seigle. *Ergotine. 'Ernutin.'
*Ipécacuanha et antimoine.
*'Hemisine.'

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Citrate d'ergotinine. °'Ernutin.' °'Epinine.' °'Hemisine.'

LOCALEMENT :

Ventouses sèches ou scarifiées.
Contre-irritants aux lombes.

Hémophilie

Éviter lésions, blessures ou abrasions.

POUR L'USAGE INTERNE :

Chlorure de chaux.
*Lactate de chaux.
*Perchlorure de fer.

Hémophilie—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite :*

*Acide tannique. Acide gallique.
*Ergotine. *Hypophyse.
'Hemisine.' 'Epinine.'

LOCALEMENT :

'Hemisine' ou 'Epinine.'

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérum Normal de Cheval, 'Wellcome' (peut aussi être administré par voie buccale).

Hémoptysie

Repos au lit.
Éviter de parler.

POUR L'USAGE INTERNE :

Glace. *Bromure de potassium.
*Morphine. *Teinture d'opium.
*Plomb et opium. Térébenthine.
*Acide tannique. Acide gallique.
*Lactate de chaux.
*Aconit. 'Hazeline.' *Ergotine.
*Perchlorure de fer. Acide sulfurique.
*Trinitrine (nitroglycérine).
*Tétranitrate d'érythrol.
Sérum Normal de Cheval, 'Wellcome.' *'Lodal.'

LOCALEMENT :

Chloroforme 'Wellcome,' glace ou ventouses à la poitrine.
Vessie d'eau chaude (à l'épine dorsale).

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine. §Ergotinine.
§Ergotinine et strychnine.
§Morphine et strychnine.

INHALATIONS :

°Nitrite d'amyle.
Térébène (B. W. & Cie).
Astringents en général.

Hémorrhagie

Intestinale

Chercher la source, et traiter la cause.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Opium. Térébenthine. 'Hazeline.'
*Strychnine. Teinture de perchlorure de fer. *Ipécacuanha.
*Lactate de chaux.
*'Hemisine.' 'Epinine.' *Plomb et opium.
Acide sulfurique dilué.

* '*Tabloid*'
§ '*Tabloid*' *Hypodermique*

° '*Vaporole*'

Hémorrhagie—*suite*

Intestinale—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite :*
Sérum Normal de Cheval, 'Wellcome.' *'Lodal.'

INHALATIONS :
°Nitrite d'amyle.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
Ergotine. °'Ernutin.' §Citrate d'ergotinine.
§Ergotinine et morphine.
§Ergotinine et strychnine.
§Morphine et strychnine.

PAR VOIE RECTALE :
'Hemisine' 'Enule.'
Composé d' 'Hazeline' 'Enule.'
†Injections salines. 'Hazeline.'

Puerpérale

Désinfecter à l'extérieur.
Injections vaginales avec solution saturée d'†Acide borique; injections utérines avec même solution très chaude : faire des injections utérines avec solution d' 'Hemisine' au 100 000e ou d' 'Epinine' au 10 000e. Comprimer fermement le fondement. Si nécessaire mettre un tampon dans la cavité de l'utérus ; élever le pied du lit ; bander les jambes ; comprimer l'aorte.

POUR L'USAGE INTERNE :
Ergot de seigle. *Ergotine. 'Ernutin.' *'Hemisine.' 'Epinine.'
*Composé d'hydrastine.
*Composé d'hydrastine et chlorhydrate de cotarnine.
'Hazeline.' *Lactate de chaux.
Alcool. Sal volatile.
*'Lodal.'

INHALATIONS :
°Nitrite d'amyle.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
§Ergotinine. °'Ernutin.'
§Ergotinine et strychnine.
§Morphine et strychnine.
°§Digitaline. °§Strychnine.

DANS LE TISSU INTRAMUSCULAIRE :
†'Hemisine' avec Sulfate d'atropine. °'Ernutin.'
°Extrait d'hypophyse (infundibulaire).
§'Ergamine.'

PAR VOIE RECTALE :
'Hemisine' 'Enule.'

Hémorrhagie—*suite*

Puerpérale—*suite*

PAR VOIE RECTALE—*suite :*
Composé d' 'Hazeline' 'Enule.'
†Injections salines. 'Hazeline.'

Hémorrhagie Utérine

(*Voir* MÉNORRHAGIE, HÉMORRHAGIE PUERPÉRALE)

Hémorrhoïdes

Traiter la cause, telle que :—constipation, pression pelvienne, obstructions portales, rétrécissement.

POUR L'USAGE INTERNE :
*Calomel et *Salins. *Rhubarbe.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent.
*Mistura alba.
*Phosphate de soude, effervescent.
*Sulfate de soude, effervescent.
*Pilule bleue et rhubarbe.
*Podophylline. *Évonymine.
*Cascara sagrada (précieux dans la constipation chronique) pour amener des selles régulières. 'Alaxa.'
*Teinture de noix vomique.
Préparations soufrées. Séné.
*Soufre et gaïac.
*Poudre composée de réglisse.
¶Fruit laxatif.

PAR VOIE RECTALE :
Eau chaude ou froide avec †Alun, 'Hazeline,' ou †'Hemisine.'
Suppositoires Rectaux 'Enule' de : Composé d' 'Hazeline,' 'Hemisine,' Noix de galle et Opium, Morphine, Belladone, Morphine et Belladone, ou Sous-gallate de Bismuth.
Suppositoires d' 'Hazeline.'

LOCALEMENT :
'Hazeline.' Crème 'Hazeline.'
Lanoline de toilette.
†Cocaïne et Lanoline.
†Eucaïne et Lanoline.

Herpes Zoster

POUR L'USAGE INTERNE :
*Fer et citrate de quinine.
*Composé d'hypophosphites.
*Quinine. *Opium. *Morphine.
*Acide arsénieux.
*Composé de phénacétine et de quinine. *Phénacétine.

Herpes Zoster—*suite*

LOCALEMENT :

Poudre d'oxyde de zinc.
Menthol et 'Paroleine.'
Oléate de morphine.
Crème 'Hazeline.'

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine.
§Morphine et strychnine.

Hodgkin, Maladie de

(*Voir* ANÉMIE)

Hoquet

Généralement dyspeptique ; retenir la respiration, éternuer, avaler de l'eau froide, boire de l'eau chaude à petites gorgées.
Corriger le régime, et donner des aliments secs.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Bicarbonate de soude. *Opium.
*Soda-Mint. *'Gingament.'
*'Coffee-Mint.'
*Composé de carbonate de chaux.
*Morphine. *Bromure de potassium.
Chloroforme 'Wellcome.'
Éther 'Wellcome.'
Menthe.
*Essence de camphre.
Térébenthine. *Trinitrine.
*Acide phénique. *Béta-naphtol.
*Acide salicylique.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine. §Pilocarpine.

INHALATIONS :

°Nitrite d'amyle.

Hydrophobie

Traitement avec le sérum Pasteur (sitôt décidé, expédier le malade sans délai).

POUR L'USAGE INTERNE :

*Morphine. *Belladone.
*Trinitrine. *Bromure de potassium.

LOCALEMENT (à la morsure) :

Excision.
†Permanganate de potasse.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine. §Curare.
°§Hyoscine. §Hyoscyamine.

Hydrophobie—*suite*

INHALATIONS :

°Nitrite d'amyle.
Chloroforme 'Wellcome.'
Éther 'Wellcome.'

Hydropisie

Traiter la cause : rein, cœur, foie, cachexie, anémie.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Digitale. *Strophanthus.
*Élatérine. Genêt. Scille.
*Sulfate de spartéine. *Jalap.
Citrate de potasse, effervescent.
Composé de calomel et de coloquinte.
*Composé de coloquinte.
*Fer réduit. *Pilule Bleue.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Pilocarpine. °§Digitaline.

Hystérie

Veiller à l'état général.
Traiter avec fermeté et douceur.
Massage.

POUR L'USAGE INTERNE :

Purgatifs. Toniques.
*Belladone. *Oxyde de zinc.
*Bromure de potassium.
*Valérianate de zinc. *Cérébrine.
*Valérianate de fer.
*Valérianate de quinine.
*Trois valérianates.
*Composé d'asa fœtida.
*Composé de bromure de Sodium.
*Trois Bromures, effervescent.

Impétigo

Faire tomber les croûtes au moyen d'un cataplasme ou d'huile chaude.

POUR L'USAGE INTERNE :

Toniques, avec de petites doses *d'Acide arsénieux.
*Composé d'arsenic.

LOCALEMENT :

Précipité blanc et Lanoline.

Impuissance

Traiter l'état général et les conditions locales.
*Acide arsénieux. Cantharides.
*Ergotine. *Sirop d'Easton.
Strychnine. Phosphore.

* '*Tabloid*'
† '*Soloid*'

§ '*Tabloid*' *Hypodermique*
° '*Vaporole*'

Impuissance—*suite*

††Composé de formiates.
'Ernutin.'
*††Glycérophosphates.
*Composé d'hypophosphites.
*Blaud (Pil. fer.). Phosphure de zinc.
*Didymine. Damiana.
Yohimbine.

Incontinence d'Urine

Chez les adultes c'est souvent un signe de rétention, indiquant de l'urine en stagnation, comme dans une hypertrophie de la prostate ou autres obstructions de longue date, et dans certaines maladies nerveuses.
Cantharides. *Strychnine.
*Composé d'hypophosphites.
*Urotropine.
Chez les enfants, peut être due à un état général défectueux ou à des vers intestinaux, constipation, phimosis, amygdales enflées, excroissances adénoïdes, grossissement des cornets, urine anormale ou irritation de la vessie (causée par exemple par un calcul).
Interdire toute boisson dans la soirée.
Réveiller l'enfant la nuit pour le faire uriner.
*Belladone. *Fer réduit.
*Composé de fer et d'arsenic.
*††Glycérophosphates.
††Composé de formiates.
*Sulfate de strychnine.
Extrait liquide de sumac aromatisé.
*Chloral hydraté. *Ergotine.
'Ernutin.' *Glande thyroïde.
*Bromhydrate d'ammoniaque.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
Citrate de potasse, effervescent.
Alcalis (si l'urine est trop acide).

Influenza

Faire garder le lit même dans les cas bénins.

POUR L'USAGE INTERNE :

Alcool (généralement). *Aconit.
*Quinine ammoniacale.
*Salicylate de quinine. *Antipyrine. *Salicylate de soude.
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).

Influenza—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite :*

*'Xaxa' et Caféine.
*'Xaxa' et poudre de Dover.
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*'Aspirin.' *Phénacétine.
*Acide phénique. *Strychnine.
*Composé de phénacétine.
*Composé de phénacétine et de quinine.
*Quinine, belladone et camphre.
*Quinine, camphre, et aconit.
*Quinine. *Composé de caféine.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Vaccin d'Influenza 'Wellcome.'

Pendant la Convalescence

Alcool. Bonne nourriture.
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.
*Sirop d'Easton. *Noix vomique.
*Composé d'hypophosphites.
*††Glycérophosphates.
††Composé de formiates.
Préparations 'Kepler.'
*Quinine. *Acide arsénieux.
*Strychnine. Acides minéraux.

Insolation

POUR L'USAGE INTERNE :

*Thé. Café.
Alcool, dans certains cas.
*Carbonate d'ammoniaque.
*Trinitrine. *Digitale.
*Composé de trinitrine.
*Bromure de potassium.

POUR L'USAGE EXTERNE :

Glace à la poitrine, au dos et à l'abdomen. Saignée.
Bains chauds et respiration artificielle, dans le collapsus.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Apomorphine.

PAR VOIE RECTALE :

†Injection saline.

Insomnie

Traiter la cause si possible.
Bains chauds à l'heure du coucher ; bains de pieds chauds avec de la moutarde à l'heure du coucher. Faire quitter le littoral si le séjour au bord de la mer n'est pas reposant ; éviter un intervalle trop long entre le dernier repas et le coucher.

* 'Tabloid' § 'Tabloid' Hypodermique ° 'Vaporole'
† 'Soloid' †† 'Elixoid'

Insomnie—*suite*

Se nourrir sagement. Traiter la dyspepsie.
Alcool (de préférence dans l'eau chaude) avec prudence ; dans certains cas il produit de l'excitation.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Chloral hydraté.
*Chloralamide. *Opium.
*Bromure de potassium.
*Morphine.
*Bromhydrate d'ammoniaque.
*Composé de bromure de sodium.
*Véronal. *Sulfonal. *Trional.
*Teinture de cannabis indica.
*Soda-Mint (si causée par la dyspepsie acide). *'Gingament.'
*'Coffee-Mint.'

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Hyoscyamine. °§Hyoscine.
°§Morphine.

Intertrigo

Empêcher le contact des surfaces entre elles.

Poudres :

Poudre de Toilette à la Lanoline.
Oxyde de zinc. Bismuth.

Lotion :

Glycérine. Glycéré de borax.

Pommades :

'Borofax.'
Acide tannique, calamine ou sous-acétate de plomb et Lanoline.
Crème 'Hazeline.'

Iritis

Traiter la cause, c'est-à-dire traumatisme, syphilis, rhumatisme, goutte.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Quinine. *Acide arsénieux.
*Iodure de potassium.

LOCALEMENT :

† Atropine ou †‖Homatropine, pour dilater la pupille.
‖Chlorhydrate de cocaïne.
†‖Atropine et cocaïne.
†Homatropine et cocaïne.
†Cocaïne et eucaïne.
‖'Hemisine.' 'Epinine.'
Sangsues ou mouches aux tempes. Tenir lœil couvert.

Jaunisse

Chercher et traiter la cause.
Bains chauds.
*Calomel. *Pilule bleue.
*Pilule bleue et rhubarbe.
*Podophylline et évonymine.
*Sulfate de magnésie, effervescent
*Composé du sulfate de magnésie, effervescent.
*Mistura alba.
*Sulfate de soude, effervescent.
*Fiel de bœuf ou *Fiel de porc.
*Chloral hydraté.
*Acide citrique.
Acides minéraux dilués.

Kala-Azar

POUR L'USAGE INTERNE :

*Sulfate de Quinine en fortes doses—jusqu'à 4 gr. dans les 24 heures.
*'Xaxa' (Acide Acetyl-salicylique).

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

*'Soamin.' °§Strychnine.

Lactation

Pour augmenter :

POUR L'USAGE INTERNE :

Nourriture substantielle, bière brune (porter), toniques.
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.
Extrait de Malt 'Kepler.'
*Glande thyroïde.
*Chlorate de potasse.
*'Mamos.'
Anis, ou eau d'aneth.
Extrait de semences de coton.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Nitrate de pilocarpine.

Pour diminuer :

POUR L'USAGE INTERNE :

*Teinture de belladone.
Ergot de seigle. *Ergotine.
'Ernutin.'

LOCALEMENT :

Emplâtre de belladone.

Laryngite

Aiguë

Chauffer la chambre, et rendre l'air humide ; défendre de parler, calmer la toux.

POUR L'USAGE INTERNE :

Mixtures fébrifuges.
*Aconit. *Chlorhydrate d'ammoniaque.

---

* '*Tabloid*' ‖ '*Tabloid*' *Ophthalmique* ° '*Vaporole*'
† '*Soloid*' § '*Tabloid*' *Hypodermique*

Laryngite—*suite*

Aiguë—suite

POUR L'USAGE INTERNE—*suite :*

*Chlorhydrate d'ammoniaque et borax.
*Composé de chlorhydrate d'ammoniaque.
*Opium. *Nitrate de potasse.
*Chlorate de potasse.

POUR SUCCION :

*¶Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse.
¶Graine de lin, réglisse et chlorodyne.
¶Morphine et ipécacuanha.
¶Pectorale.
¶Composé de goudron végétal.

LOCALEMENT :

Fomentations chaudes.
Sangsues au larynx.

INHALATIONS :

Teinture composée de benjoin.
*Thymol. 'Pinol.'
Belladone et ciguë.
Chlorhydrate d'ammoniaque (Inhalateur 'Vaporole').
Essence d'eucalyptus ('Eucalyptia').
°Composé de Chloroforme et d'Iodure d'Éthyle.

PULVÉRISATIONS :

Menthol et 'Paroleine.'
†Acide borique (solutions chaudes).
†'Hemisine.'

Chronique

Voir si les expectorations ne révèlent pas le bacille de la tuberculose.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse.
*Composé de chlorhydrate d'ammoniaque.
*Codéine. *Composé de cubèbe.
*Cubèbe et belladone.
*Composé de chlorate de potasse, borax et cocaïne (Voix).
*Goudron et codéine.
††Composé de goudron végétal.

POUR SUCCION :

¶Codéine.
¶Morphine et ipécacuanha.
¶'Pinol.' ¶Glycérine.
¶Glycérine et cassis.
¶Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse.
¶Glycérine, tannin et cassis.
¶Glycérine, tannin, capsicum et cassis.
¶Ratanhia, menthol et cocaïne.

Laryngite—*suite*

Chronique—suite

POUR SUCCION—*suite :*

¶Gomme rouge et cocaïne.
¶Pectorale. ¶Cocaïne.
¶Composé de goudron végétal.
*Orme fauve.
*Acide phénique et orme fauve.

PULVÉRISATIONS :

†Acide phénique.
†Composé nasal de phénol.
†Composé nasal 'Eucalyptia.'

INSUFFLATIONS :

Sous-gallate de bismuth.
Sous-nitrate de bismuth.
Bismuth et morphine.
Acide tannique.

APPLICATIONS LOCALES :

†Cocaïne. †Eucaïne, Morphine, †'Hemisine,' 'Epinine.' Acide tannique, généralement dans une base de glycérine.

Lèpre

Bains chauds tous les jours (40° C. ou au-dessus).
Changer fréquemment de vêtements.
Régime libéral et varié.
Tension des nerfs pour calmer les douleurs.

POUR L'USAGE INTERNE :

Huile de Chaulmougra ou baume de Gurjun 0 cmc. 30 (à augmenter graduellement) trois fois par jour après les repas.
Salicylate de soude.
Citrate de fer et de quinine.
'Soamin.'
Ichthyol. Huile de foie de morue.
Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.'
Nastin.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Huile de Chaulmougra (0 cmc. 30 jusqu'à 3 cmc. 55).

POUR L'USAGE EXTERNE :

Lanoline et acide pyrogallique (10 %) pour les membres.
Lanoline et chrysarobine (10 %) pour la figure et le tronc.

Leucorrhée

Améliorer l'état général.
Traiter toute cause locale.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Sulfate de quinine neutre.
*Ergotine. 'Ernutin.'

* *'Tabloid'* ¶ *Pastille 'Tabloid'* ° *'Vaporole'*
† *'Soloid'* †† *'Elixoid'*

Leucorrhée—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite* :

*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Chlorhydrate d'hydrastine.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
*Citrate de manganèse et fer.
*'Mamos.'
*Perchloure de fer.
Préparations 'Kepler' avec Fer et Phosphore.

LOCALEMENT :

Injections vaginales d'eau chaude, et lotions de—†Acide borique, †Alun, †Alun et sulfate de zinc. †Sulfate de zinc, †Acide tannique, †Acide phénique, †Sulfophénate de zinc, †Permanganate de zinc, Sulfanilate de zinc ou †'Nizin.'

Lumbago

POUR L'USAGE INTERNE :

*Iodure de potassium.
*Chlorhydrate d'ammoniaque.
*Gaïac et soufre.
*Salicylate de quinine.
*Salicylate de soude.
*'Xaxa.' *'Xaxa' et caféine.
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Xaxa' et poudre de Dover.
*'Xaxaquin.' *'Aspirin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*Salicylate de soude et bicarbonate de potasse.
*Composé de colchique.
*Belladone. *Poudre de Dover.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.

LOCALEMENT :

Fomentations. Bandages de flanelle. Glace. Spray d'éther. Vésicatoires. Moutarde. Camphre. Capsicum. Térébenthine. Fers chauds.
Une aiguille passée dans la masse sacro-lombaire.
Courant constant.
Ionisation avec †Chlorhydrate de cocaïne ou †Iodure de potassium.
Emplâtres de belladone.
Emplâtres de Composé de Menthol (B. W. & Cie).
Liniment de chloroforme.
Liniment de menthol et d'aconit.
Bains turcs. Bains d'air chaud.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine. §Aconitine.

Lupus

Bonnes conditions hygiéniques.

POUR L'USAGE INTERNE :

Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.'
*Quinine. *Acide arsénieux.
*Sirop d'Easton. Iode.
*Composé d'hypophosphites.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
*Glande thyroïde. Créosote.
*Calomel et créosote.

LOCALEMENT :

Rayons de Finsen. Radium.
Rayons de Röntgen. Racler.
Scarification.
Ponctions multiples. Cautère.
Ionisation avec †Sulfate de cuivre.
Pâte arsénicale.
Emplâtres à la créosote et à l'acide salicylique.
Pâte de chlorure de zinc.
Pommade de chrysarobine.
Savon à la Lanoline ichthyolée.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Tuberculine.

Malaria

(*Voir* FIÈVRE INTERMITTENTE)

Mal de Mer

Position allongée.
Vêtements serrés autour de l'abdomen.

POUR L'USAGE INTERNE :

Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.
Champagne frappé.
*Bromure de potassium.
*Chloral hydraté.
*Composé de caféine.
*Oxalate de cérium.
*Chloralamide. *'Coffee-Mint.'
Chlorhydrate de cocaïne.
*Composé de phénacétine.
*Composé de trinitrine.
*Composé d'antifébrine.
Composé de Zymine 'Pepule.'
*Trois Bromures, effervescent.

LOCALEMENT :

Contre-irritants à l'épigastre.
Glace à l'épine dorsale.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine. °§Atropine.

* '*Tabloid*'
† '*Soloid*'

§ '*Tabloid*' *Hypodermique*
° '*Vaporole*'

Mamelons Douloureux

Si pendant l'allaitement :

Employer un appareil protecteur en allaitant.
Laver le mamelon après les tétées.
Lavages avec alcool et glycérine, 'Hazeline' ou alcool et eau de chaux en parties égales.
Glycérine et acide tannique.
Onctions avec Lanoline, Crème 'Hazeline,' 'Borofax' ou Borax et Lanoline.

Si la femme n'allaite pas :

Baumes du Pérou ou de tolu.
Teinture composée de benjoin.
Lotion de †Cocaïne. Collodion.
Lotion de †Nitrate d'argent.

Marasme

Traiter la cause.
Aliments peptonisés si nécessaire.
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné
'Bivo,' Vin Ferrugineux à l'Extrait de Viande.
Préparations 'Kepler.'
Bains froids tous les matins, si supportés par le malade.
*Bland (Pil fer.)
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
*Composé de fer et d'arsenic.
*††Glycérophosphates.
††Composé de formiates. 'Vana.'

Ménorrhagie

Traiter la cause.
Repos ; élever le pied du lit.
Éviter les boissons chaudes et les stimulants.
Mettre un tampon dans le vagin.

Pour l'usage interne :

Ergot. *Ergotine. 'Ernutin.'
*'Tanin.
*Extrait de viburnum prunifolium.
Acétate de plomb. *Glande thyroïde.
*Perchlorure de fer. *'Mamos.' 'Hazeline.' *Plomb et opium.
*Chlorhydrate d'hydrastine.
*Composé d'hydrastine.
*Composé d'hydrastine et chlorhydrate de cotarnine.
*Lactate de chaux.
*'Hemisine.' 'Epinine.'
*Bromure de potassium.
*Digitale. *Lodal.

Ménorrhagie—*suite*

Pour l'usage hypodermique :

§Citrate d'ergotinine.
°'Ernutin.'
°Extrait d'hypophyse (infundibulaire).

Migraine (*voir* Tête)

Miliaire

Faire porter sur la peau du linge de toile ou de soie. Interdire l'usage du savon.
Si l'irritation est très forte supprimer tout exercice.
Recommander de boire très peu, et seulement en très petites quantités à la fois, quelle que soit la boisson.

Pour l'usage interne :

°Extrait d'hypophyse (infundibulaire). 'Hemisine.'
*Glande surrénale.

Pour l'usage externe :

Soulager les démangeaisons avec des lotions d'†Acide phénique (au 80e) ou de calamine.
Oindre le corps, matin et soir, avec 1 partie de Lanoline et 8 parties d'huile d'amande, ou bien saupoudrer avec de la terre à foulon (ou de l'amidon) et de l'oxyde de zinc.

Morsures et Piqûres

Localement :

Enlever le dard. 'Lanesine.'
*Carbonate d'ammoniaque.
°Ammoniaque Aromatique.
'Hazeline.' †Sous-acétate de Plomb. †Acide phénique.
Alcool. Alcool mentholé. Chloroforme 'Wellcome.'
†Chlorhydrate de cocaïne.

Morsures de Serpents—

Pour l'usage interne :

*Carbonate d'ammoniaque.
Alcool.
*Atropine. *Belladone.
Éther 'Wellcome.'

Localement :

Faire une ligature au-dessus de la morsure, inciser les bords de la blessure, sucer la blessure, et faire pénétrer du †Permanganate de potasse en poudre.

' *'Tabloid'* § *'Tabloid' Hypodermique* ° *'Vaporole'*
† *'Soloid'* †† *'Elixoid'*

Morsures et Piqûres—*suite*

Morsures de Serpents—*suite*

LOCALEMENT—*suite :*

Injecter une solution de *§Permanganate de potasse ou de §Chlorure de sodium.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Sulfate ou §Nitrate de strychnine.

POUR INJECTION HYPODERMIQUE OU INTRAVEINEUSE :

Sérum Antivenin 'Wellcome.'

Myxœdème

*Glande thyroïde.

Néphrite

(*Voir* BRIGHT)

Neurasthénie

Nourriture en abondance.

Repos absolu et isolement si nécessaire. Massage.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Blaud (Pil. fer.). *Acide arsénieux.

*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.

*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.

*'Hemisine.' *Trois valérianates.

*††Glycérophosphates. 'Vana.'

††Composé de formiates.

*Quinine. *Strychnine.

*Didymine.

*Citrate de manganèse et de fer.

††Composé de formiates.

Préparations 'Kepler.'

Névralgies

Corriger tout astigmatisme, ou autre défaut de réfraction des yeux ; examiner soigneusement chaque dent, et traiter syphilis, goutte, rhumatisme, anémie ou fièvre intermittente, si l'une ou l'autre de ces affections existent. Produire des conditions hygiéniques favorables.

*Blaud (Pil. fer.). *Acide arsénieux.

*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.

*Préparations de manganèse et de fer.

*Composé d'hypophosphites.

*Sulfate de quinine neutre.

*Salicylate de quinine.

*Noix vomique. *Belladone.

Névralgies—*suite*

Pour l'Accès

POUR L'USAGE INTERNE :

*Calomel.

*Antipyrine. *Chloral hydraté.

*Butyl-chloral hydraté et gelsémine. *Cannabis indica.

*Composé d'antifébrine. *Aconit.

*'Xaxa.' *'Xaxa' et caféine.

*'Xaxa' et phénacétine.

*'Xaxa' et poudre de Dover.

*'Xaxaquin.'

*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'

*'Aspirin.' *Composé de phénacétine.

*Teinture de gelsémium.

*Valérianate de zinc.

*Phénacétine.

*Trois Valérianates.

*Composé de caféine.

*Bromure de potassium.

*Chlorhydrate d'ammoniaque.

*Trinitrine.

*Morphine ou *Opium.

*Composé de menthol.

LOCALEMENT :

Applications chaudes ou froides.

Moutarde. Mouches. Capsicum.

Menthol. Lotion de †Cocaïne.

Emplâtres de Composé de Menthol (B. W. & Cie).

Pulvérisations de menthol et 'Paroleine.'

Camphre et menthol (en parties égales).

Éther 'Wellcome.'

Chlorure d'Éthyle 'Wellcome.'

Courant continu.

Tension des nerfs et excision.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Nitrate d'aconitine.

°§Sulfate d'atropine.

§Sodio-salicylate de caféine.

§Morphine et atropine.

°§Morphine, dans la gaine du nerf.

Alcool, dans la gaine du nerf.

INHALATIONS :

Chloroforme 'Wellcome.'

Éther 'Wellcome.'

Obésité

*Glande thyroïde.

Lévulose au lieu de sucre.

*Iodure de potassium. Iode.

*Sel de Carlsbad, effervescent.

*Sel d'Eau de Vichy. *Sel d'Eau de Kissingen.

---

* '*Tabloid*' § '*Tabloid*' *Hypodermique* ° '*Vaporole*'
† '*Soloid*' †† '*Elixoid*'

Ophthalmie

(*Voir* CONJONCTIVITE)

Orchite

Traiter la cause excitante, telle que syphilis, oreillons, gonorrhée, etc.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Opium. *Aconit.
*Ipécacuanha et antimoine.
*Iodure de potassium, fortes doses.
*Sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.

LOCALEMENT :

Repos. Suspensoir.
Pression au moyen de bandes.
Lotion évaporante. Glace.
Lotion de †Plomb et opium.
Glycéré de belladone.
Gaïacol. Teinture d'iode.
Iode et Lanoline.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Nitrate d'aconitine.

Oreille, Mal d'

Examiner avec soin les oreilles, la bouche, les dents, la gorge et le nez. Laver la bouche, et gargariser la gorge fréquemment avec de l'eau chaude.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Aconit. *Belladone.
*Poudre de Dover. *'Aspirin.'
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxa' et phénacétine.
*Calomel. *Pilule bleue.
*Huile de ricin ou Composé de séné.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent.
*Mistura alba.
*Antipyrine. *Phénacétine.
*Composé de phénacétine.

LOCALEMENT :

Fomentations chaudes (têtes de pavot, de camomille, etc.).
Irrigations chaudes avec †Solution saline.
Monche derrière l'oreille.
Sangsues derrière l'oreille.
Huile et opium dans le méat.
Solution mentholée.

Otorrhée

Traiter la cause, telle que végétations adénoïdes, mastoïdite.

Seringuer doucement avec lotions de †Sublimé corrosif au 4000e ou lotions d'†Iodure de mercure et de potassium au 4000e ; sécher ; avec l'insufflateur, saupoudrer légèrement d'une poudre composée d'iodoforme et d'acide borique en parties égales ; et mettre dans le méat auditif un tampon peu serré de *Gaze au cyanure double. Répéter l'opération tous les jours, ou deux fois par jour, jusqu'à ce que l'écoulement ait diminué ; alors seringuer légèrement tous les jours avec lotions de :—alcool, †Alun, †Composé d'alun et de zinc, †Acide borique, Glycérine et acide tannique, †'Nizin' ou †Permanganate de zinc.

Ozène

Traiter la cause.

PULVÉRISATIONS OU LAVAGES :

†Composé nasal antiseptique et alcalin. 'Hazeline.'
†Composé nasal de phénol.
†Permanganate de potasse.

INSUFFLATIONS :

Composé de Menthol pour priser (B. W. & Cie).
†Chinosol.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Vaccin autogène.

Palpitations (*voir* CŒUR)

Paralysie Tremblante

Repos. Bon régime. Éviter les ennuis ou les excitations. Massage (dans certains cas).
Galvanisme ou Faradisme (dans quelques cas).
§Sulfate d'hyoscyamine.
°§Bromhydrate d'hyoscine.
Toniques. ††Composé de formiates. Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.'
*††Glycérophosphates.
°Extrait d'hypophyse (infundibulaire).

---

* 'Tabloid' § 'Tabloid' Hypodermique ° 'Vaporole'
† 'Soloid' †† 'Elixoid'

Parotidite (Oreillons)

Repos au lit ; chaleur ; régime restreint.

Pour l'usage interne :

*Pilule bleue et rhubarbe, composé de.
*Sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba. *Aconit.
*Salicylate de quinine. *Antifébrine. *Phénacétine.

Localement :

Glycéré de belladone.

Peau (Maladies Diverses)

Pour l'usage interne :

*Sulfure de chaux.
*Acide arsénieux.
*Ichthyol.
*Composé d'arsenic.
*Lactate de chaux.
*Iodo-ricinoléate de chaux.
*Calomel et créosote.
*Glande thyroïde.
*'Soamin.'

Saupoudrer avec:

Oxyde de zinc, bismuth, amidon, calamine, acide borique, acide salicylique, Poudre de Toilette à la Lanoline.

Liniments:

Liniment oléo-calcaire.
Térébenthine.

Lotions

Calamine. †Sous-acétate de plomb.
Soufre. *Thymol. †Alun. †Nitrate d'argent. *Acide tannique.
†Acide borique. Collodion.

Pommades

Lanoline, Lanoline de Toilette, 'Borofax,' Crème 'Hazeline,' "Neige 'Hazeline.'" 'Phenofax,' et combinaisons avec Lanoline, des suivants :
Spermaceti. Ichthyol. Calamine. Sous-acétate de plomb. Acide borique. Oléate de bismuth. Iodoforme. Iodol. Acide phénique. Acide salicylique. Mercure ammoniacal. Soufre. Iodure de soufre. Goudron. Créosote. Chrysarobine. Acide pyrogallique.

Peau (Maladies Diverses) —*suite*

Emplâtres

Plomb. Ichthyol. Goudron. Belladone. Mercure. Acide salicylique.

Pour injections intra-musculaires :

*Soamin.

Peau, Gerçures de la

Localement :

Crème 'Hazeline.'
"Neige 'Hazeline.'"
'Borofax.' 'Phenofax.'
Glycérine. Glycéré d'amidon.
Lanoline de Toilette. Collodion.
Acide borique et Lanoline.
Oxyde de zinc et Lanoline.
Teinture composée de benjoin et glycérine (1 pour 4).
Lotion de †Plomb et opium.

Pelade (*voir* Alopécie)

Péricardite

Traiter la cause. Repos au lit.

Pour l'usage interne :

*Aconit. *Quinine. *Digitale.
*Iodure de potassium. *Opium.
*Morphine. *Salicylate de soude.
*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Aspirin.' *'Xaxaquin.'
*Salicylate de soude et bicarbonate de potasse.

Localement :

Vessies de glace. Sangsues. Vésicatories.

Péritonite

Traiter la cause.

Pour l'usage interne :

Contre les vomissements, eau glacée ou chaude par cuillerées à bouche.
*Poudre de Dover. *Morphine.
*Aconit. *Antifébrine.
*Calomel, dans certains cas par petites doses toutes les heures —ce dernier peut être combiné avec *Opium.
*Salins dans certains cas.
*Salol. Térébenthine.

Localement :

Vessies de glace à l'abdomen.
Fomentations de térébenthine.
Sangsues.

* '*Tabloid*' † '*Soloid*'

Péritonite—*suite*

PAR VOIE RECTALE :

Injections de térébenthine, s'il y a de la tympanite.
†Solutions salines (Traitement d'après Murphy).

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine. °§Strychnine.
§Morphine et Strychnine.
Sérum Antistreptococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'
Sérum Antibacille du côlon, marque 'Wellcome.'
Sérum Antigonococcique 'Wellcome.'
Sérum Antistaphylococcique, Polyvalent 'Wellcome.'

Peste (BUBONIQUE)

Repos absolu au lit ; bonne aération ; température modérée ; chaleur ; stimulations.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Calomel, 0 gr. 30 à 0 gr. 60 en une dose, puis au bout de 5 heures un purgatif salin.
*Strophanthus. *Strychnine.
*Carbonate d'ammoniaque.
Éther 'Wellcome.' *Hyoscine.
*Morphine.
*Hemisine.' 'Epinine.'
*Bromure de potassium.
*Camphre.
*Salol (pour la diarrhée).
Nourriture liquide fréquemment, en petities quantités.
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.
Glace. Lait glacé.
Eau de vie. Bière blonde ou brune.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérum antipesteux.
Vaccin antipesteux.
°§Hyoscine. °§Morphine.
§Morphine et atropine.
°§Strychnine. Éther 'Wellcome.
§Strophanthine.

LOCALEMENT (aux glandes) :

Injections d'Acide phénique.
Incision sous-cutanée.

POUR L'USAGE EXTERNE :

Envelopper le malade dans une couverture mouillée. Éponger avec de l'eau tiède. Froid à la tête. Tubes de Leiter. Sinapismes de moutarde. Vésicatoires.

Peste (BUBONIQUE)—*suite*

INHALATIONS :

Ammoniaque. Oxygène.
°Nitrite d'amyle.

PAR VOIE RECTALE :

Lavements d'amidon et d'opium.
Morphine 'Enule.'
Cocaïne 'Enule.'
†Injections salines.

Pharyngite

Éloigner toute cause d'irritation, telle que fumée de tabac, températures froides ; ne pas trop parler.
Traiter constipation ou autre défectuosité de l'état général.

LOCALEMENT :

Application du cautère électrique aux régions granulées.
*Chlorhydrate d'ammoniaque.
*Chlorhydrate d'ammoniaque et borax.
*Composé de chlorhydrate d'ammoniaque.
*¶Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse.
*¶Composé d'acide benzoïque.
*Chlorate de potasse et borax.
*Composé de chlorate de potasse, borax et cocaïne (Voix).
*Gomme rouge.
*Composé de cubèbe.
*Cubèbe et belladone.
*Orme fauve.
*Acide phénique et orme fauve.
Perchlorure de fer, solutions dans de la glycérine.
*Ratanhia et cocaïne.
¶Cocaïne. ¶Codéine.
¶Glycérine.
¶Glycérine et cassis.
¶Glycérine, tanin et cassis.
¶Glycérine, tanin, capsicum et cassis.
¶Graine de lin, réglisse et chlorodyne.
¶Morphine et ipécacuanha.
¶Pectorale.
¶Composé de goudron végétal.
¶'Pinol.'
¶Gomme rouge et cocaïne.
¶Ratanhia, menthol et cocaïne.

GARGARISMES :

†Cholorure de sodium.
†'Hemisine.' 'Hazeline.'
*Chlorate de potasse.
Perchlorure de fer.
†Composé naso-pharyngien.

* *'Tabloid'* § *'Tabloid' Hypodermique* ° *'Vaporole'*
† *'Soloid'* ¶ *Pastille 'Tabloid'*

Pharyngite—*suite*

GARGARISMES—*suite :*

†Composé nasal alcalin.
†Alun. Acides minéraux.
Ratanhia. Myrrhe. *Borax.
†Acide borique.
†Acide borique et sulfate de zinc.

BADIGEONNAGES :

Glycérine et acide tannique.
Mucine. †Nitrate d'argent.
†Sulfate ou †Chlorure de zinc.
Perchlorure de fer.

INHALATIONS :

Teinture composée de benjoin.
Baume de tolu ou de Pérou.
*Teinture de belladone.
Chlorhydrate d'ammoniaque (Inhalateur ' Vaporole ').
' Hazeline.' *Thymol.

PULVÉRISATIONS :

†Chlorhydrate de cocaïne.
†Cocaïne et eucaïne.
Menthol et ' Paroleine.'
†Composé nasal antiseptique et alcalin. †Acide phénique.
†' Hemisine.' ' Hazeline.'

Phthisie

POUR L'USAGE INTERNE :

Préparations ' Kepler.'
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.
Alcool. Glycérine. *Quinine.
*Composé d'hypophosphites.
*Composé d'hypophosphites et créosote.
*Blaud (Pil. fer.) avec arsenic et strychnine. Créosote.
*Calomel et créosote.
*Strychnine. *Sirop d'Easton.
*Carbonate de gaïacol.
*Camphorate de gaïacol.
*Atropine (contre les sueurs).
*Poudre de Dover (contre les sueurs).
*Trional (contre les sueurs).
*Oxyde de zinc. *Chinosol.
*Ichthyol.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Tuberculine.
°§Atropine ou §Picrotoxine (contre les sueurs).
§Pilocarpine (de 0 gr. 0032 à 0 gr. 0065 une demi-heure avant l'heure des transpirations ; les arrête souvent si la médication a été répétée plusieurs nuits de suite).
§Morphine et strychnine.

Phthisie—*suite*

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE—*suite :*

Vaccin de Tubercule ' Wellcome.'
§Succinimure de mercure.

PAR INJECTION INTRAVEINEUSE :

Iodoforme et ' Paroleine.'

INHALATIONS :

Teinture composée de benjoin.
Iodoforme.

SUR LA POITRINE :

Sinapismes. Feuilles de moutarde.
Huile camphrée.
Liniment d'iode. Térébenthine.

Piqûres (*voir* MORSURES)

Pleurésie

POUR L'USAGE INTERNE :

*Aconit. *Antimoine.
*Morphine. *Gelsémium.
*Iodure de potassium.
*Salicylate de soude.
*' Xaxa ' (Acide acétyl-salicylique).
*' Aspirin.'

LOCALEMENT :

Bandages. Sangsues.
Sinapismes. Vésicatoires.
Liniments de : belladone, iode, térébenthine ou camphre.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine.
§Nitrate de pilocarpine.

Pneumonie

POUR L'USAGE INTERNE :

*Aconit. Alcool.
Éther ' Wellcome.'
*Ipécacuanha et antimoine.
*Digitale. *Strophanthus.
*Citrate de caféine. Serpentaire.
*Strychnine. *Noix vomique.
*Camphorate de gaïacol.
*Carbonate d'ammoniaque.
*Lactate de chaux.
*Sulfate de spartéine. Sénéga.
*Salicylate de soude.
*Salicylate de soude et bicarbonate de potasse.
*' Xaxa ' (Acide acétyl-salicylique). *' Xaxaquin.'
*Salicylate de quinine. Scille.
*¶Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse.

* ' *Tabloid* ' § ' *Tabloid* ' *Hypodermique* ° ' *Vaporole* '
† ' *Soloid* ' ¶ *Pastille* ' *Tabloid* '

Pneumonie—*suite*

LOCALEMENT :

Éponger avec de l'eau froide ; compresses, ou bains froids ; vessies de glace à la poitrine ; saignées, sangsues, vésicatoires, sinapismes. *Coton.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Digitaline. °§Strychnine.
Sérum Anti-Pneumococcique.
Vaccin Pneumococcique 'Wellcome.'

INHALATIONS :

Oxygène.

PAR VOIE RECTALE :

†Injections salines.

Poux

De la Tête

Pétrole et huile d'olive en parties égales.
Lotion d'†Acide phénique.
Lotion de †Sublimé corrosif.
Pommade de précipité blanc, faite avec de la Lanoline.
Oléate de mercure.

Du Corps

Laver de corps fréquemment et mettre les vêtements à l'étuve. 'Paroleine.'
Lotion de †Sublimé corrosif.
Oléate de mercure.
Soufre. Ether 'Wellcome.'

Prolapsus de l'Anus

Traiter la cause, telle que débilité, vers intestinaux, calculs à la vessie, phimosis, rétrécissements.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Préparations soufrées.
*Bismuth.
*Poudre composée de réglisse.
¶Fruit laxatif. *Soufre et gaïac.
*Plomb et opium. *Podophylline.

LOCALEMENT :

'Hazeline.' *Acide tannique.
†'Hemisine.' 'Epinine.' †Alun.
†Composé d'alun et de zinc.
†Chlorure ou †Sulfate de zinc.
Suppositoires Rectaux 'Enule' de—Sous-gallate de Bismuth, de Composé d' 'Hazeline' ou de Noix de galle et opium.
Opération.

Prurit de l'Anus

Toujours examiner avec soin l'anus et le rectum.
Traiters les ulcères rectaux, fissures, vers intestinaux. Interdire le tabac et le café. Réduire ou interdire l'alcool. Bien surveiller le régime, surtout si le malade est goutteux. Insister sur une propreté minutieuse, ainsi que sur un lavage après chaque évacuation.

POUR L'USAGE INTERNE :

*'Xaxa' (Acide acétyl-salicylique).
*'Aspirin.'
*Salicylate de Soude.
*Salicylate de soude et bicarbonate de potasse.
*Bicarbonate de soude.
*Lactate de chaux.
*Gaïac et soufre.
*Poudre composée de réglisse.
¶Fruit laxatif.
Préparations soufrées.
*Sulfate de magnésie, effervescent.
*Mistura alba. *Urotropine.
*Glande thyroïde. 'Hemisine.'

LOCALEMENT :

Iodure de plomb et Lanoline, Calomel et Lanoline, 'Phenofax,' †Cocaïne, †Eucaïne, †Nitrate d'argent, solutions saturées d'†Acide borique dans l' 'Hazeline,' Glycérine et belladone.
†'Hemisine.' 'Epinine.'
Ichthyol.

PAR VOIE RECTALE :

Suppositoires 'Enule' de : Morphine, Noix de galle et Opium, 'Hemisine,' Sous-gallate de Bismuth, Cocaïne, ou Composé d' 'Hazeline.'
Suppositoires d' 'Hazeline.'

Prurit de la Vulve

Voir si l'urine ne contient pas de sucre.
Traiter diabète, goutte, etc.

POUR L'USAGE INTERNE :

'Hemisine.' *Urotropine.
*Bicarbonate de soude.
*Salicylate de soude.
*Salicylate de soude et bicarbonate de potasse.
*'Xaxa.'

---

* '*Tabloid*' § '*Tabloid*' *Hypodermique* ° '*Vaporole*'
† '*Soloid*' ¶ *Pastille* '*Tabloid*'

Prurit de la Vulve—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite :*

*'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*'Aspirin.' *Lactate de chaux.
*Quinine. *Acide arsénieux.
*Bromhydrate d'ammoniaque.

LOCALEMENT :

Applications d'eau chaude avec une éponge.
†Alun (solutions chaudes).
†Acide borique et 'Hazeline' (solution saturée).
'Phenofax.' 'Borofax.'
Lotion de †Sublimé corrosif.
Calomel. †Cocaïne. †Eucaïne, ou iodure de plomb avec Lanoline.

Prurit et Prurigo

Traiter la cause.
Voir toujours si les urines ne contiennent pas de sucre.

POUR L'USAGE INTERNE :

*'Hemisine.' *Urotropine.
*Bicarbonate de soude.
*Salicylate de soude.
*Salicylate de soude et bicarbonate de potasse.
*Lactate de chaux.
Acide arsénieux. *Atropine.
*Bromhydrate d'ammoniaque.
*Morphine. *Glande thyroïde.

LOCALEMENT :

Lotions de — carbonates alcalins, †Acide borique, †Acide phénique, Acide salicylique, Acide cyanhydrique, †Alun, †Sous-acétate de plomb, †Chlorhydrate de cocaïne, Acide sulfureux, ou †Nitrate d'argent.
Liniments de : — belladone, Chloroforme 'Wellcome,' opium, camphre, menthol ou ichthyol.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Morphine. °§Atropine.

Psoriasis

POUR L'USAGE INTERNE :

*Aconit. *Composé arsénical.
*Acide arsénieux. *Acide phénique.
*Bichlorure de mercure.
*Iodure de potassium. *Salicine.
*Bichlorure de mercure avec iodure de potassium.
*Sulfure de calcium.

Psoriasis—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite :*

*Composé de soufre.
*Glande thyroïde. Iodure de soufre.
*Ipécacuanha et antimoine.
Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.'
Térébenthine.
'Soamin.' *Salicylate de soude.
*Salicylate de soude et bicarbonate de potasse.

LOCALEMENT :

Bains alcalins ou soufrés.
Pommades de :
Mercure ammoniacal, nitrate de mercure, iodure de mercure (rouge), créosote, acide phénique, thymol, acide salicylique, acide pyrogallique, chrysarobine, soufre, goudron ou ichthyol, avec Lanoline.

Purpura

Nourriture de bonne qualité. Légumes.
*Noix vomique.
*Strychnine. *Acide arsénieux.
*Composé de fer et d'arsenic.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
*'Hemisine.' *Ergotine. 'Ernutin.
Térébenthine.
*Acide tannique. *Lactate de chaux.
Extrait de Malt 'Kepler.'

PAR VOIE RECTALE OU PAR INJECTION HYPODERMIQUE :

Sérum Antistreptococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'

Rachitisme

Régime libéral :—lait, crème, œufs, jus de viande crue, viande crue, jus de fruits crus, gelées de fruits. Beaucoup d'air. Séjour au bord de la mer.
Préparations 'Kepler.'
*Aliment chimique. *Sirop d'Easton.
*Composé d'hypophosphites.
*§§Moelle d'os. *Thymus.
*Residuum rubrum.
*Sulfate de strychnine.

Rage (*voir* HYDROPHOBIE)

* '*Tabloid*' § '*Tabloid*' *Hypodermique* ° '*Vaporole*'
† '*Soloid*' §§ '*Valule*'

Rétention d'Urine

Traiter la cause, telle que paraplégie, hypertrophie de la prostate, gonorrhée, rétrécissement, vers intestinaux, hémorrhoïdes. La rétention peut être associée à de l'incontinence et indiquée par un égouttement constant.

POUR L'USAGE INTERNE :
*Opium. *Morphine.
*Poudre de Dover.
*Ipécacuanha et antimoine.
*Belladone Jusquiame.
Hydroxyde de potassium dissous, bien dilué.
*Gelsémium. *Cannabis indica.

POUR L'USAGE EXTERNE :
Bains. Fomentations.
Sangsues au périnée.

PAR VOIE RECTALE :
Suppositoires 'Enule' de Belladone et Morphine.

Rhumatisme (SUBAIGU ET CHRONIQUE)

Bains alcalins et soufrés, bains turcs. Bains électriques d'air chaud. Chaleur et lumière rayonnantes. Massage. Lieu de résidence convenablement choisi. Régime bien réglé. Alcool (pas de liqueurs maltées) dans certains cas.

POUR L'USAGE INTERNE :
*Salicylate de quinine.
*Antifébrine.
*Salicylate de soude. *Salicine.
*Iodure de potassium. Iode.
*Bicarbonate de potasse. *Salol.
*Acide arsénieux. *Acide citrique.
*Gaïac et soufre.
*Carbonate de gaïacol.
*Camphorate de gaïacol.
*Carbonate de lithine. *Ichthyol.
††Composé de formiates.
*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
*Composé de benzoate de lithine.
*Citrate de lithine, effervescent.
*'Xaxa.' *Aspirin.'
*Composé de colchique.
Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.'
*Pipérazine.
*Acide salicylique. *Teinture d'aconit.
*Composé de galbanum.

Rhumatisme (SUBAIGU ET CHRONIQUE)—*suite*

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
§Sodio-salicylate de caféine.
§Nitrate d'aconitine.
Sérum Antistreptococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'
Ce sérum s'administre aussi par le rectum.

LOCALEMENT :
Liniments de : opium, belladone, chloroforme, camphre ou térébenthine.
Pommades de : goudron, créosote, mercure, soufre ou iode.
Lotions ichthyolées.
Ionisation avec des iodures et des salicylates.

Rhumatisme Articulaire Aigu

POUR L'USAGE INTERNE :
Régime lacté. Laxatifs.
*Sulfate de magnésie, effervescent. *Composé de sulfate de magnésie, effervescent.
*Mistura alba.
*Sulfate de quinine neutre. *Salicine.
*Salicylate de quinine.
*Salicylate de soude.
††Composé de formiates.
*Salicylate de soude et bicarbonate de potasse.
*'Xaxa.' *'Xaxa' et caféine.
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Xaxa' et poudre de Dover.
*'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*'Aspirin.' *Antifébrine.
*Salol. *Bicarbonate de potasse.
*Bicarbonate de soude. *Aconit.
Citrate de potasse, effervescent.
*Iodure de potassium. *Phénacétine.
*Composé de colchique. *Opium.

LOCALEMENT (aux Articulations) :
Envelopper de *Coton.
Acide salicylique en poudre.
Vésicatoires.
Applications anodines.
Lotions ichthyolées, saturant la bande appliquée d'une façon lâche.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :
Sérum Antistreptococcique du rhumatisme articulaire, marque 'Wellcome.'

* 'Tabloid' § 'Tabloid' Hypodermique †† 'Elixoid'

Rhumatisme Articulaire Aigu—*suite*

Pendant la Convalescence

POUR L'USAGE INTERNE :

*Composé tonique.
Préparations 'Kepler.'
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.
Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.
*Composé d'hypophosphites.
††Composé de formiates.
*††Glycérosphosphates.

Rousseurs

Protéger la peau contre le soleil en portant une voilette.

LOCALEMENT :

Lanoline de toilette. Huile d'olive. Savon à la Lanoline. 'Borofax.' Crème 'Hazeline.' "Neige 'Hazeline.'"
Glycérine.
Eau de chaux. Lavages alcalins. Alcool et eau de rose.

Salivation

Traiter la cause, telle que stomatite, grossesse, ou névrose. Si mercurielle, cesser le traitement mercuriel.
*Atropine. *Belladone.

Sarcines du Ventricule

Lavages de l'estomac.
*Salol. Sulfite de soude.
*Bétanaphtol. Créosote.
*Salicylate de soude.

Sciatique

(*Voir aussi* NÉVRALGIES)

S'assurer toujours qu'il n'y a pas de pression intrapelvienne, occasionnée, par exemple, par une excroissance en formation.
Vider le gros intestin. La constipation est une cause fréquente, surtout chez les personnes âgées.
Bains électriques d'air chaud.
Bains chauds de moutarde.
Chaleur et lumière rayonnantes.
Courants à haute fréquence.

Sciatique—*suite*

Ionisation avec †Cocaïne, †Iodure de potassium ou †Salicylates.
*'Xaxa' *'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Xaxa' et poudre de Dover.
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*'Aspirin.' *Gaïac et soufre.
*Pyramidon.
*Valérianate de quinine.
*Valérianate de zinc.
*Sel de Vichy, Effervescent.
Eau de Contrexéville.

Scorbut (*voir aussi* PURPURA)

Régime approprié, lait, fruits crus et légumes.
¶Jus de citron. *Acide citrique.
Citrate de potasse, effervescent.
Citrate de soude.
†Bicarbonate de soude.
*Residuum rubrum.

Seins (*voir* MAMELONS)

Septicémie

Sérum Antistreptococcique, Polyvalent, 'Wellcome.'

Shock

Position couchée.
Chaleur aux extrémités.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°Extrait d'hypophyse (infundibulaire).
†Infusions salines, avec °'Hemisine,' °'Epinine,' °'Ernutin' ou §'Tyramine.'
°Strychnine.

Soif

*Le Désaltérant. *Acide citrique.
¶Jus de citron.
Citrate de potasse, effervescent.
*Sulfate de quinine neutre et citrate de potasse.

Sommeil, Maladie du

Isoler le malade. Désinfecter appartement, vêtements, etc.
Transporter dans un climat tempéré.
*'Soamin' (intramusculaire).

Stomatite Aphtheuse

Envelopper dans couvertures mouillées d'eau chaude, puis tiède et enfin froide, pendant

* *'Tabloid'* § *'Tabloid' Hypodermique* †† *'Elixoid'*
† *'Soloid'* ¶ *Pastille 'Tabloid'* ° *'Vaporole'*

Stomatite Aphtheuse —*suite*

deux heures, deux fois par jour. Régime entièrement lacté, ou entièrement carné :—

Lait—80 à 115 gr. de lait avalé à petites gorgées toutes les heures (augmenter l'intervalle à mesure que le malade progresse).

Viande. Si très malade, Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné, jus frais de viande râpée ; gelée de bœuf, etc. toutes les demi-heures ou toutes les heures. Après amélioration — bœuf écrasé, volaille ou poisson, 140 gr. trois fois par jour avec du pain grillé. Avant les repas, badigeonner la langue avec une solution de cocaïne ; après les repas, avec une solution d'acide chromique (0 gr. 65 dans 30 gr.).

Donner du *Bicarbonate de soude 15 minutes avant les repas ; huile de ricin (3 cmc. 50 à 10 cmc. 65) tous les trois jours.

*'Pepana.' *Santonine. Fraises.

Habiter climat tempéré.

Stomatite Gangreneuse

Régime libéral. Repos au lit.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Composé de fer et d'arsenic.
*Fer et quinine. *Strychnine.
*Quinine. Préparations 'Kepler.'

PAR VOIE RECTALE :

Suppositoires 'Enule' de Lait et de Viande.

LOCALEMENT :

Enlever les parties gangrenées.
Acide nitrique fumant. Cautère par le feu.

Sueurs

Abondantes, les traiter comme les *Sueurs Nocturnes* (ci-après).

Si fétides, laver avec lotions de : †Acide borique, †Acide phénique. Acide salicylique ou †Sublimé corrosif ; ou laver fréquemment avec du savon et de l'eau, puis tamponner le corps avec une lotion de formaldéhyde 2 %.

Sueurs—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE :

*Benzonaphtol.
*Composé de Bétanaphtol.

Sueurs Nocturnes

Traiter la cause.
Changer les vêtements de nuit s'ils sont mouillés.
Lait chaud en se couchant.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Atropine. *Belladone.
*Strychnine. *Oxyde de zinc.
*Sulfate de quinine neutre.
*Trional.
*Carbonate de gaïacol. *Codéine.
*Camphorate de gaïacol.
*Poudre de Dover. *Chinosol.
*Trinitrine.
*Tétranitrate d'érythrol.

POUR L'USAGE EXTERNE :

Applications tièdes au moyen d'éponges.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Atropine. §Picrotoxine.

INHALATIONS :

°Nitrite d'Amyle.

Sycose (*voir aussi* TEIGNE)

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérum Antistaphylococcique. Polyvalent, 'Wellcome.'
Vaccin Staphylococcique 'Wellcome.'

Syncope (*voir* COLLAPSUS)

Syphilis

POUR L'USAGE INTERNE :

*Bichlorure de mercure.
*Iodure de mercure et de potassium.
*Bichlorure de mercure et iodure de potassium.
*Poudre grise. *Blaud (Pil. fer.)
*Poudre grise et bicarbonate de soude.
*Poudre grise et poudre de Dover.
*Iodo-ricinoléate de chaux.
*Proto-Iodure vert de mercure.
*Bi-Iodure rouge de mercure.
*Iodure jaune de mercure.
*Iodure de potassium. Iodure de fer.
Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler.'

*'*Tabloid*'
† '*Soloid*'

§ '*Tabloid*' *Hypodermique*
° '*Vaporole*'

Syphilis—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite :*

*Blaud (Pil. fer.) et arsenic.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.

POUR L'USAGE EXTERNE :

Onctions mercurielles.
Bains de vapeur de calomel.
Bains turcs.

DANS LE TISSU INTRAMUSCULAIRE :

°Calomel. °Huile grise.
§Bichlorure de mercure.
§Succinimure de mercure.
*'Soamin.'
Crème mercurielle 'Wellcome.'

Tabes Dorsalis
(ATAXIE LOCOMOTRICE)

POUR L'USAGE INTERNE :

*Quinine. *Strychnine.
*Iodure de potassium.
*Teinture de noix vomique.
*Belladone. Arsenic.
*Antipyrine. *Phénacétine.
*Didymine.
*††Glycérophosphates.
††Composé de formiates.
Pour les douleurs, *'Xaxa (Acide acétyl-salicylique).
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Aspirin.'

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

°§Strychnine. °§Atropine.
°§Morphine.
§Morphine et strychnine.

Teigne

Sur le Cuir Chevelu

Si très étendue, raser les cheveux ; si en quelques endroits seulement, raser soigneusement chaque plaque.
Laver au savon phéniqué et épiler les cheveux atteints.
Quelque bénin que soit le cas, frotter une pommade *préventive* sur tout la tête (souffre et acide salicylique, ou mercure ammoniacal, avec Lanoline).
Frotter sur les parties malades un parasiticide quelconque, dissous dans de l'Éther 'Wellcome' et de l'alcool, dans de la glycérine ou de la Lanoline (le titre de ces préparations doit varier avec l'âge et l'étendue de la surface atteinte)

Teigne—*suite*

Sur le Cuir Chevelu
—suite

Les parasiticides qui peuvent être employés sont :—
Acide acétique. ‡Térébenthine.
†Acide borique, dissous dans l'Éther 'Wellcome' et l'alcool.
†Acide phénique, dilué.
Chrysarobine ou Araroba purifié.
Chrysarobine et acide salicylique.
Créosote. ‡Iodure de soufre.
*‡Bi-Iodure rouge de mercure.
Teinture et liniment d'iode.
Iode dans huile de goudron incolore.
Iode dans huile de Cade.
‡Pommade de nitrate de mercure.
‡Oléates de cuivre et de mercure.
Résorcine. Acide salicylique.
Soufre (précipité).
Soufre et acide salicylique.
Soufre et mercure ammoniacal.
Pommade d'iodure de soufre.
Acide sulfureux. *Thymol.

Traitement à l'huile de croton :
Ce traitement demande des soins spéciaux, et se trouve détaillé dans les ouvrages sur les maladies de la peau.

Ionisation avec sels de †Zinc ou de †Cuivre.
Application des rayons X.

Sur le Corps

Même traitement que ci-dessus, mais les substances marquées ‡ doivent être plus diluées.

Tétanos

POUR L'USAGE INTERNE :

Alcool. *Aconit. *Antimoine.
*Bromure de potassium.
*Cannabis Indica avec *Chloral hydraté. *Acide arsénieux.
*Chloral hydraté (fortes doses.)
*Teinture de gelsémium.
*Teinture de jusquiame.
*Trinitrine. *Composé de trinitrine.
*Butyl-chloral hydraté et gelsémine.

LOCALEMENT :

Sérum antitétanique.
Acupuncture (de chaque côté de l'épine dorsale). Bains chauds.
Chaleur à l'épine dorsale. Glace a l'épine dorsale.

'Tabloid' § *'Tabloid' Hypodermique* ° *'Vaporole'*
† *'Soloid'* †† *'Elixoid'*

Tétanos—*suite*

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

Sérum antitétanique.
°§Morphine. °§Atropine.
§Morphine et atropine.
°§Apomorphine. §Curare.
§Sulfate d'hyoscyamine.
°§Bromhydrate d'hyoscine.
§Salicylate de physostigmine.

INHALATIONS :

Chloroforme 'Wellcome.'
Éther 'Wellcome.'
°Nitrite d'amyle.

Tête, Maux de

Chercher toujours la cause des maux de tête chroniques et récurrents — astigmatisme, ou quelque défaut de réfraction des yeux (cause très fréquente), tumeur au cerveau, obstruction nasale, dent cariée, coagulabilité défectueuse du sang, etc.

Bilieux, Gastro-intestinaux

*Pilule bleue et *Salins.
*Sulfate de magnésie, effervescent. *Cascara sagrada.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent.
*Mistura alba.
*Podophylline et évonymine.

Migraine

Régler le régime.
Traiter la constipation.
Corriger les défauts de réfraction.
Interdire le surmenage.
Repos au lit pendant les accès.

AUX YEUX :

‖Sulfate d'atropine.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Pilule bleue et *Salins.
*Antipyrine. *Phénacétine.
*Composé d'antifébrine.
*Composé de phénacétine.
*Aconit. *Citrate de caféine.
*'Xaxa.' *'Xaxa' et caféine.
*'Xaxa' et phénacétine.
*'Xaxaquin.'
*'Xaxa' et 'Xaxaquin.'
*'Aspirin.' *Composé de caféine.
*Bromure de potassium. *Ergotine.

Tête, Maux de—*suite*

Migraine—*suite*

POUR L'USAGE INTERNE—*suite* :

Bromhydrate d'ammoniaque avec *Salicylate de soude.
*Trinitrine. *Composé de trinitrine.
*Valérianate de quinine.
*Tétranitrate d'érythrol.
Valérianate de zinc.
*Lactate de chaux.
*Quinine. *Acide arsénieux.
*Teinture de cannabis indica.
Sulfate de strychnine.
Butyl-chloral hydraté.
*Butyl-chloral hydraté et gelsémine.

INHALATION :

°Nitrite d'amyle.

POUR L'USAGE HYPODERMIQUE :

§Citrate d'ergotinine.
°'Ernutin.' °§Morphine.
§Ergotinine et morphine.
§Ergotinine et strychnine.
§Sodio-salicylate de caféine.

LOCALEMENT :

Massage du cuir chevelu. Eau froide.
Lotion évaporante. Glace.
Alcool. Éther 'Wellcome.'
Eau de Cologne.

Torticolis

Examiner avec soin les oreilles, les yeux, la gorge, les dents et l'épine dorsale afin de voir s'il y a de l'irritation périphérale ; observer la condition de la glande thyroïde.

POUR L'USAGE INTERNE :

*Acide arsénieux.
Strychnine. *Noix vomique.
*Bromure de potassium.
*Oxyde de zinc. *Belladone.

LOCALEMENT :

Galvanisme. Belladone.

DANS LE TISSU INTRAMUSCULAIRE :

°§Strychnine. °§Morphine.
§Sulfate d'hyoscyamine.

Toux

Traiter toute cause d'irritation à l'oreille (telle que cérumen), au pharynx, au larynx, à la trachée, aux bronches, aux poumons, à la plèvre, ou à

* 'Tabloid'
‖ 'Tabloid' Ophthalmique
§ 'Tabloid' Hypodermique
° 'Vaporole'

Toux—*suite*

l'estomac. Dans le cas de violents accès, penser à un corps étranger dans le pharynx, ou à la coqueluche.

POUR L'USAGE INTERNE :
'Bromure de potassium.
*¶Codéine.
¶Composé d'acide benzoïque.
'Chloral hydraté. *Belladone.
'Poudre de Dover. *Goudron et codéine.
'Teinture composée de camphre.
'Ipécacuanha et scille.
¶Graine de lin, réglisse et chlorodyne.
¶Morphine et ipécacuanha.
¶Pectorale.
††¶Composé de goudron végétal.
¶'Pinol.'
*Composé de cubèbe.
*Opium.
*Cubèbe et belladone.
*Goudron.
*¶Chlorhydrate d'ammoniaque et réglisse. Créosote.
'Sirop de tolu. ¶Glycérine.
¶Glycérine et cassis.

INHALATIONS :
Iode. Créosote.
Teinture composée de benjoin.
Essence d'eucalyptus ('Eucalyptia'). 'Pinol.'

Ulcères

Traiter la cause, telle que veines variqueuses, syphilis, tubercule, goutte. Insister sur le repos *absolu* au lit.

POUR L'USAGE INTERNE :
*Iodo-ricinoléate de chaux.
*Lactate de chaux.

LOCALEMENT :
Saupoudrer avec : — Amidon, oxyde de zinc, acide borique, iodoforme, chinosol ou calomel.
Pommades (*voir* PEAU).
Cataplasmes. Bandages.
Applications astringentes de †Alun, †Sulfate de cuivre, †Nitrate d'argent, †Acide phénique, ou †Sous-acétate de plomb en dosages appropriés.
Lotions de calamine s'il y a beaucoup d'irritation.
Ionisation avec sels de †Zinc ou de †Cuivre.
†Citrate de soude et Chlorure de sodium.

Ulcère Gastrique

(*Voir aussi* HÉMATÉMÈSE *et* DYSPEPSIE)

Traiter l'anémie ou la constipation.

POUR L'USAGE INTERNE :
Aliments liquides, peptonisés, en petites quantités à de courts intervalles.
Extrait de Malt 'Kepler.'
Jus Wyeth de Viande de Bœuf Perfectionné.
*Carbonate de bismuth.
*'Hemisine.' 'Hazeline.'
*Opium (Poudre ou Teinture).
Acide cyanhydrique dilué.
Bichromate de potasse.
*Glande surrénale.
*Sous-nitrate de bismuth.
*Composé de mucine.
Huile d'olive et crème en faibles doses.
Sérum Normal de Cheval 'Wellcome.'

PAR VOIE RECTALE :
Lavements nutritifs.
Suppositoires 'Enule' de Viande ou de Lait.

Urémie (*voir* BRIGHT)

Urine

(*Voir* INCONTINENCE D'URINE, RÉTENTION D'URINE)

Urticaire

Régler le régime.
Éviter de se gratter.
*°'Hemisine.'
*Glande surrénale.
°Extrait d'hypophyse.
*Composé cathartique.
*Lactate de chaux.
*Citrate de magnésie (véritable), effervescent.
*Rhubarbe et soude.
*Rhubarbe et gentiane.
*Aloïne.
*Acide arsénieux.
*Ichthyol.
*Salicylate de soude.
*Bicarbonate de soude.
*Composé de colchique.
*Teinture de belladone.
Sérum Normal de Cheval 'Wellcome.'

* '*Tabloid*' ¶ *Pastille* '*Tabloid*' ° '*Vaporole*'
† '*Soloid*' †† '*Elixoid*'

Verrues

POUR L'USAGE INTERNE :

*Glande thyroïde (0 gr. 324 trois fois par jour, traitement qui semble efficace).

LOCALEMENT :

Cautère électrique.
Acides :—acétique glacial, nitrique, phénique, chlorhydrique, salicylique ou chromique.
†Nitrate d'argent. †Chlorure de zinc.
Iodure de zinc. Nitrate de zinc. Chlorure d'éthyle.
Ionisation avec sels de †Magnésium.
Neige d'Acide carbonique.

Vers

Hématoïdes

Régler la diète et insister sur l'usage du sel avec les aliments

POUR L'USAGE INTERNE :

*Chlorhydrate d'ammoniaque, pour empêcher l'accumulation de mucus.
*Sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.
*Citrate de magnésie (véritable), effervescent.
*Rhubarbe et soude. *Aloïne.
*Composé d'asa fœtida et d'opium.
*Santonine, avec prudence au début. *Santonine et calomel.
*Blaud (Pil. fer.) et cascara sagrada.

PAR VOIE RECTALE :

Suppositoires 'Enule' de Quassine. Suppositoires 'Enule' de Santonine.
Lavements de :—Sel et eau, Quassia, †Alun, Térébenthine, Perchlorure de fer, Catéchu, *Thymol, Kino, Ratanhia, Hématoxyline, *Tanin ou eau de chaux.

Lombrics

*Santonine prudemment, suivie d'huile de ricin.
*Santonine et calomel. *Jalap.
*Bismuth, composé de sous-santonate de.
*Sulfate de magnésie, effervescent. *Béta-naphtol.
*Composé de sulfate de magnésie, effervescent. *Mistura alba.
Kamala. *Thymol. 'Paroleine.'

Vers—*suite*

Ver Solitaire

Enlever le mucus des intestins au moyen de purgatifs salins ; régime sévère pendant deux jours, puis :—
Fougère mâle, suivie d'huile de ricin. Térébenthine.
*Tannate de pellétiérine. Kousso.
*Béta-naphtol.
Kamala. Bétel.
Valériane, dans les convulsions.

Vomissements

S'assurer s'il n'y a pas une cause périphérique quelconque, telle que coliques intestinales, rénales ou biliaires ; exclure péritonite et obstruction intestinale, hernie, maladie du rein, tumeur cérébrale, etc. ; régler le régime, et traiter la dyspepsie.
*Acide citrique avec *Bicarbonate de soude.
*Citrate de soude.
Acide cyanhydrique dilué.
*Soda-Mint. Eau gazeuse. Glace. *'Gingament.'
*'Coffee-Mint.' *Oxalate de cérium.
*Composé d'antifébrine.
*Bromhydrate d'ammoniaque.
*Bromure de strontium.
*Bismuth et soude.
*Opium.
Créosote. *Chloral hydraté.
*Carbonate de gaïacol.
Contre-irritants à l'épigastre.
*Trois Bromures, effervescent.

Vomissements de la Grossesse

*Chloral hydraté.
†Chlorhydrate de cocaïne (0 cmc. 60 d'une solution à 3 ; à répéter).
Acide cyanhydrique dilué.
*Ipécacuanha. Créosote.
*Carbonate de gaïacol.
*Strychnine. *Noix vomique.
*Oxalate de cérium. *'Coffee-Mint.' *'Gingament.'
Pepsine 'Pepule.' *Soda-Mint.
*Pepsine et strychnine.
*Pepsine, bismuth et strychnine.
*Iodure de potassium.
*Glande thyroïde.
Eau gazeuse. Glace.

* 'Tabloid' † 'Soloid'



TABLE POSOLOGIQUE

Nom du Médicament	Pharmacopée Française, 1908 — Dose Maxima — Pour une dose — Grammes	Pharmacopée Française, 1908 — Dose Maxima — Pour 24 heures — Grammes	Pharmacopœa Belgica, 1906 — Dose Maxima — Pour une dose — Grammes	Pharmacopœa Belgica, 1906 — Dose Maxima — Pour 24 heures — Grammes
Acétanilide	0.30	1.50	—	—
Acétylsalicylique (acide) ('Aspirin')	1.00	6.00	—	—
Aconitine	0.0002	0.0005	—	—
Aconitine (nitrate d')	0.0002	0.0005	—	—
Adrénaline	—	—	0.002	0.004
Alcoolature d'aconit (feuilles) ...	1.00	5.00	—	—
Amyle (nitrite d')	0.20	1.40	0.20	0.50
Antipyrine	4.00	8.00	—	—
Apomorphine	0.015	0.015	—	—
Apomorphine, chlorhydrate d' ...	0.015	0.015	0.02	0.06
Arécoline (bromhydrate d') ...	0.005	0.0015	—	—
Argent (nitrate d')	0.03	0.15	0.03	0.10
Arsénieux (anhydride)	0.005	0.015	0.005	0.015
Atropine	0.0005	0.001	—	—
Atropine (sulfate d')	0.001	0.002	0.001	0.002
Belladone (feuille de)	—	—	0.10	0.20
Bromhydrate d'homatropine ...	—	—	0.001	0.003
Bromoforme	0.50	1.50	—	—
Caféine	0.50	2.00	0.50	1.50
Caféine et salicylate de soude ...	—	—	1.00	3.00
Calomel	1.00	1.00	—	—
Cantharide	—	—	0.05	0.10
Cantharidine	—	—	0.0005	0.001
Chloral (hydrate de)	4.00	12.00	3.00	6.00
Chloroforme	0.50	3.00	—	—
Cocaïne (chlorhydrate de)	0.05	0.15	0.05	0.15
Codéine	0.05	0.20	—	—
Codéine (phosphate de)	0.075	0.30	0.10	0.30
Colchicine	0.002	0.004	—	—
Coloquinte (fruit de)	—	—	0.30	1.00
Conine (bromhydrate de)	0.03	0.15	—	—
Créosote	0.50	1.50	0.50	1.50
Cuivre (sulfate de)	0.75	0.75	—	—
Cyanhydrique (acide), dissous ...	0.10	0.50	0.10	0.50
Diéthylsulfone-diméthylméthane (Sulfonal)	2.00	2.00	—	—
Diéthylsulfone-éthylméthylméthane (Trional)	2.00	2.00	—	—
Digitale (feuille)	—	—	0.20	0.60
Digitaline cristallisée	0.0003	0.001	—	—
Diméthylamino-antipyrine (Pyramidon)	1.00	3.00	—	—
Eau distillée de laurier-cerise ...	2.00	10.00	2.00	10.00
Émétique	0.20	0.60	0.20	0.60
Ergot de seigle	—	—	1.00	3.00
Ergotinine	0.001	0.002	—	—
Essence de rue	—	—	0.05	0.15

Voir les doses pour Injections Hypodermiques, *page* 114

Nom du Médicament	Pharmacopée Française, 1908 — Dose Maxima — Pour une dose — Grammes	Pharmacopée Française, 1908 — Dose Maxima — Pour 24 heures — Grammes	Pharmacopœa Belgica, 1906 — Dose Maxima — Pour une dose — Grammes	Pharmacopœa Belgica, 1906 — Dose Maxima — Pour 24 heures — Grammes
Essence de sabine	—	—	0.05	0.15
Extrait alcoolique d'aconit	0.03	0.10	—	—
,, ,, de belladone ...	0.03	0.10	0.05	0.10
,, ,, de chanvre indien	—	—	0.05	0.15
,, ,, de ciguë ...	0.05	0.20	—	—
,, ,, de colchique ...	0.05	0.20	0.03	0.10
,, ,, de coloquinte ...	—	—	0.05	0.15
,, ,, de digitale ...	0.05	0.20	0.05	0.15
,, ,, d'Évonymus atropurpureus (Évonymine brune)	0.10	0.20	—	—
,, ,, de jusquiame ...	0.10	0.30	0.10	0.30
,, ,, de noix vomique	0.04	0.10	0.03	0.10
,, ,, de scille ...	0.20	0.50	0.15	0.50
Extrait aqueux d'ergot de seigle ...	1.00	6.00	—	—
,, ,, d'opium	0.10	0.30	0.075	0.25
,, fluide d'ergot de seigle ...	1.00	6.00	1.00	3.00
,, ,, d'hydrastis	1.00	4.00	—	—
Fer (arséniate de)	0.05	0.15	—	—
Gaïacol	0.50	1.50	—	—
Gaïacol (carbonate de)	0.50	2.00	—	—
Huile de croton	0.05	0.10	0.05	0.10
,, ,, foie de morue phosphorée, au vingt-millième	20.00	40.00	—	—
,, phosphorée, au centième ...	0.10	0.20	—	—
Hydrastine	0.10	0.30	—	—
Hydrastinine	0.05	0.15	—	—
Hydrastinine (chlorhydrate d') ...	0.05	0.15	0.03	0.10
Iode	—	—	0.02	0.06
Iodoforme	0.20	1.00	0.20	0.60
Jusquiame (feuille de)	—	—	0.30	1.00
Laudanum de Sydenham	2.00	6.00	—	—
Liqueur arsenicale de Fowler ...	—	—	0.60	1.50
Mercure (benzoate de)	0.01	0.05	—	—
Mercure (bichlorure de)	0.02	0.06	0.02	0.06
Mercure (bi-iodure de)	0.02	0.08	0.02	0.06
Mercure (cyanure de)	0.01	0.04	0.02	0.06
Mercure (iodure de)	—	—	0.05	0.10
Mercure (protochlorure de) ...	1.00	1.00	—	—
Mercure (proto-iodure de)	0.05	0.20	—	—
Méthylarsinate de sodium (Arrhénal)	0.20	0.20	—	—
Morphine (chlorhydrate de) ...	0.02	0.08	0.03	0.10
Naphtol β	1.00	3.00	—	—
Oxyde de mercure jaune	—	—	0.02	0.06
Oxyde de mercure rouge	—	—	0.02	0.06
Pelletiérine (sulfate de), en solution tannique	0.40	—	—	—
Phénacétine	1.00	3.00	—	—
Phénol	0.10	0.30	0.10	0.10
Phényle (salicylate de) (Salol) ...	1.00	6.00	—	—

Voir les doses pour Injections Hypodermiques, *page* 114

Nom du Médicament	Pharmacopée Française, 1908 — Dose Maxima — Pour une dose — Grammes	Pharmacopée Française, 1908 — Dose Maxima — Pour 24 heures — Grammes	Pharmacopœa Belgica, 1906 — Dose Maxima — Pour une dose — Grammes	Pharmacopœa Belgica, 1906 — Dose Maxima — Pour 24 heures — Grammes
Phosphore	0.001	0.002	0.0005	0.002
Phosphure de zinc	0.008	0.016	—	—
Picrotoxine	0.002	0.006	—	—
Pilocarpine (azotate de)	0.02	0.05	—	—
Pilocarpine (chlorhydrate de) ...	0.025	0.05	0.02	0.06
Pipérazine	0.75	3.00	—	—
Plomb (acétate neutre de)	0.10	0.30	0.10	0.30
Podophylline	0.05	0.20	0.10	0.30
Potasse (chlorate de)	1.00	4.00	—	—
Potassium (cyanure de)	0.01	0.04	—	—
Poudre d'aconit (racine)	0.10	0.30	0.10	0.30
,, aconitine, au centième ...	0.020	0.050	—	—
,, agaric	0.50	1.50	—	—
,, belladone (feuille) ...	0.15	0.50	—	—
,, cantharide	0.05	0.15	—	—
,, ciguë	0.25	0.75	—	—
,, digitale	0.20	1.00	—	—
,, digitaline cristallisée, au centième	0.03	0.10	—	—
,, ergot de seigle	1.00	4.00	—	—
,, fève de Saint-Ignace ...	0.10	0.30	—	—
,, gomme-gutte	0.25	0.50	—	—
,, ipécacuanha	2.00	2.00	—	—
,, ipécacuanha opiacée (Poudre de Dover)	1.00	4.00	1.50	5.00
,, jaborandi	3.00	3.00	—	—
,, jusquiame	0.20	0.60	—	—
,, nitrate d'aconitine, au centième	0.020	0.050	—	—
,, noix vomique	0.10	0.30	0.20	0.60
,, opium	0.20	0.60	0.15	0.50
,, rue	0.50	1.00	—	—
,, sabine	0.50	1.00	—	—
,, scille	0.25	1.00	—	—
,, stramoine	0.25	1.00	—	—
,, strophanthine, au centième	0.03	0.10	—	—
Pyramidon	1.00	3.00	—	—
Quassine	0.004	0.012	—	—
Résorcine	1.25	5.00	—	—
Salicylate de physostigmine ...	—	—	0.001	0.003
Salicylate de soude	2.00	12.00	—	—
Salicylate de soude et de théobromine	—	—	1.00	3.00
Salicylique (acide)	1.00	4.00	—	—
Salol	1.00	6.00	—	—
Santonine	0.10	0.30	0.10	0.30
Scille (bulbe de)	—	—	0.20	0.60
Semence de colchique	—	—	0.20	0.60
Soluté d'arsénite de potasse ...	0.50	1.50	—	—
,, de bichlorure de mercure (Liqueur de Van Swieten)	20.00	60.00	—	—
,, de digitaline cristallisée, au millième	0.30	1.00	—	—
,, officinal de bromoforme ...	5.00	15.00	—	—

Voir les doses pour Injections Hypodermiques, *page* 114

Nom du Médicament	Pharmacopée Française, 1908 — Dose Maxima — Pour une dose — Grammes	Pharmacopée Française, 1908 — Dose Maxima — Pour 24 heures — Grammes	Pharmacopœa Belgica, 1906 — Dose Maxima — Pour une dose — Grammes	Pharmacopœa Belgica, 1906 — Dose Maxima — Pour 24 heures — Grammes
Soude (arséniate de)	0.01	0.02	0.01	0.03
Soude (cacodylate de)	0.20	0.20	—	—
Soude (chlorate de)	1.00	6.00	—	—
Spartéine (sulfate de)	0.05	0.25	—	—
Strophanthine	0.0003	0.001	—	—
Strychnine	0.005	0.015	—	—
Strychnine (nitrate de)	—	—	0.005	0.01
Strychnine (sulfate de)	0.006	0.018	—	—
Sulfonal	2.00	4.00	—	—
Teinture d'aconit (racine)	0.50	1.50	0.40	1.00
,, belladone	1.00	4.00	0.40	1.00
,, cantharide	0.50	1.25	0.50	1.00
,, colchique	1.50	6.00	2.00	6.00
,, coloquinte	—	—	1.00	3.00
,, digitale	1.50	5.00	2.00	6.00
,, fève de Saint-Ignace composée (Gouttes amères de Baumé)	0.25	1.75	—	—
,, iode	0.25	1.00	0.20	0.60
,, jaborandi	15.00	15.00		—
,, jusquiame	1.00	4.00	1.20	3.00
,, lobélie	1.50	5.00	1.00	3.00
,, noix vomique	1.00	5.00	2.00	6.00
,, opium	2.00	6.00	1.50	5.00
,, opium safranée	—	—	1.50	5.00
,, scille	1.50	5.00	2.00	6.00
,, strophanthus	0.15	0.60	0.50	1.50
Théobromine	1.00	4.00	—	—
Thymol	0.50	4.00	—	—
Trional...	2.00	2.00	—	—
Vératrine officinale	0.002	0.01	0.005	0.15
Zinc (cyanure de)	0.02	0.10	—	—
Zinc (sulfate de)	1.00	1.00	—	—
Zinc (valérianate de)	0.10	0.50	—	—

TABLE POSOLOGIQUE
pour l'Administration Hypodermique

	Grammes		Grammes
Aconitine, nitrate d'	0.0001	à	0.00015
Apomorphine, chlorhydrate d'	0.003	à	0.006
Atropine, sulfate d'	0.0003	à	0.001
Caféine, sodio-salicylate de	0.03	à	0.30
Cocaïne, chlorhydrate de	0.006	à	0.03
Codéine, phosphate de	0.015	à	0.13
Cotarnine, chlorhydrate de	0.015	à	0.03
Curare	0.005	à	0.03
Digitaline, amorphe	0.0006	à	0.002
Digitaline, cristallisée	0.00013	à	0.0005
Ergotinine, citrate d'	0.0003	à	0.0013
Ergotoxine	0.0006	à	0.0013
'Ernutin'	0 cmc. 30	à	0 cmc. 60
Eucaïne, chlorhydrate d'	0.006	à	0.03
Eucaïne, lactate d'	0.006	à	0.03

	Grammes		Grammes
*'Hemisine'	0.0003	à	0.0013
Héroïne, chlorhydrate d'	0.0025	à	0.005
Homatropine, chlorhydrate d'	0.00025	à	0.003
Hyoscine, bromhydrate d'	0.0003	à	0.0006
Hyoscyamine, sulfate d'	0.0003	à	0.0006
Mercure, bichlorure de (sublimé corrosif)	0.001	à	0.002
Mercure, succinimure de	0.01	à	0.015
Morphine, chlorhydrate de	0.008	à	0.015
Morphine, méconate de	0.008	à	0.015
Morphine, phosphate de	0.008	à	0.015
Morphine, sulfate de	0.008	à	0.015
Morphine, tartrate de	0.008	à	0.015
Physostigmine, salicylate de	0.0006	à	0.0025
Picrotoxine	0.0006	à	0.0025
Pilocarpine, nitrate de...	0.003	à	0.03
Potasse, permanganate de	0.06	à	0.20
*Quinine, bichlorhydrate de	0.06	à	0.30
*Quinine, bisulfate de	0.06	à	0.30
*Quinine, bromhydrate de	0.03	à	0.15
*Quinine, lactate de	0.06	à	0.30
*'Soamin'	0.06	à	0.20
Spartéine, sulfate de	0.03	à	0.06
Strophanthine	0.00013	à	0.0006
Strychnine, chlorhydrate de	0.0004	à	0.006
Strychnine, nitrate de	0.0004	à	0.006
Strychnine, sulfate de	0.0004	à	0.006
Trinitrine (Nitroglycérine)	0.00025	à	0.0013
*'Tyramine'	0.02	à	0.04

* Des doses beaucoup plus fortes ont été administrées

DOSES SUIVANT L'ÂGE

La règle généralement adoptée pour les doses à donner à un enfant est de diviser le nombre d'années de son âge par ce même nombre augmenté de 12. Par exemple, pour un enfant de deux ans, la dose devra être $2 : (2 + 12) = \frac{1}{7}$ de la dose normale pour adulte. Il y a pourtant des exceptions bien connues à cette règle ; ainsi le calomel, la belladone, la jusquiame ou l'arsenic sont tolérés en fortes doses par les enfants ; tandis que l'opium peut leur être fatal, même en doses très faibles. On prétend que les enfants de cinq ans supportent des doses d'arsenic aussi fortes que celles que l'on prescrit aux adultes, et qu'il est souvent nécessaire d'en donner plus aux filles qu'aux garçons. Comme règle générale, la dose des cathartiques doit être plus forte et celle des narcotiques plus faible que les doses indiquées par la règle. La table suivante donne des doses légèrement plus faibles que celles obtenues d'après le calcul ci-dessus.

Si la dose d'un adulte est 60 milligrammes ou 60 gouttes, pour un enfant au-dessous de 6 mois elle sera 3 milligrammes ou 3 gouttes.

1 an	à	2 ans	elle sera	de	5	milligrammes	ou	de	5	gouttes
2 ans	,,	3	,,	,,	,,	7½	,,	,,	7½	,,
3	,,	,, 4	,,	,,	,,	10	,,	,,	10	,,
4	,,	,, 6	,,	,,	,,	15	,,	,,	15	,,
6	,,	,, 10	,,	,,	,,	20	,,	,,	20	,,
10	,,	,, 13	,,	,,	,,	25	,,	,,	25	,,
13	,,	,, 16	,,	,,	,,	30	,,	,,	30	,,
16	,,	,, 18	,,	,,	,,	40	,,	,,	40	,,
18	,,	,, 20	,,	,,	,,	50	,,	,,	50	,,
21	,,			,,	,,	60	,,	,,	60	,,

La dose proportionnée à n'importe quel âge (20 ans ou au-dessous) peut aussi se calculer en prenant un vingtième de la dose thérapeutique complète, et en multipliant le résultat par le nombre d'années de l'âge.

Pour les malades d'un âge avancé, on peut avoir à diminuer les doses ; mais il n'y a pas de règles exactes à ce sujet.

La dose de la plupart des drogues est plus forte administrée par le rectum qu'administrée par la bouche. La dose hypodermique est habituellement légèrement plus faible que la dose orale.

EMPOISONNEMENTS : ANTIDOTES ET TRAITEMENT

DANS les empoisonnements, le meilleur traitement, partout où cela est possible, consiste à retirer le poison de l'estomac, soit par des lavages, soit en provoquant des vomissements au moyen d'émétiques afin d'en empêcher l'absorption. En cas d'empoisonnement par une substance corrosive cependant, la condition de l'œsophage et de l'estomac rend ce procédé dangereux et peut causer une perforation ; le mieux est dans ce cas de neutraliser le poison ou de le rendre inerte, sans essayer de le retirer. Si le poison a déjà été absorbé, le contre-poison physiologique, s'il en existe un, doit être administré immédiatement. Il est important de trouver approximativement la quantité du poison qui a été prise afin de pouvoir apprécier la dose de contre-poison nécessaire.

L'état général doit être surveillé attentivement et l'on doit avoir recours à tous les moyens possibles pour augmenter la résistance du malade contre le poison jusqu'à ce que les effets aient cessé. Des stimulants cardiaques—eau de vie ou éther, voire même des injections sous-cutanées de strychnine—peuvent être nécessaires, tandis que la respiration artificielle et la chaleur sont de la première importance. Les inhalations d'oxygène peuvent rendre des services. Il y a toujours à craindre une perte de chaleur pendant une respiration artificielle prolongée si le malade n'est pas suffisamment couvert. Il peut devenir absolument nécessaire de faire prendre de la nourriture, de préférence par le rectum, et l'on doit toujours s'assurer s'il n'y a pas lieu de passer la sonde pour vider la vessie. On peut donner du café et d'autres stimulants par le rectum. Dans quelques cas d'empoisonnement, suivis de dépression et de collapsus, une injection intraveineuse ou rectale de solution saline est très utile.

Pour vider l'Estomac.—Employer la pompe stomacale ou, ce qui vaut mieux, le tube pour les lavages de l'estomac (qui forme siphon quand on le rabaisse), et laver et relaver l'estomac plusieurs fois de suite.

Émétiques.—Les suivants sont les plus utiles :

1. L'injection sous-cutanée de Chlorhydrate d'Apomorphine 'Vaporole,' 0 gr. 005 ; ou de Chlorhydrate d'Apomorphine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 0025 ou 0 gr. 005 ; ou de Chlorhydrate d'Apomorphine, 0 gr. 0065, et Chlorhydrate de Strychnine, 0 gr. 00108, 'Tabloid' (Hypodermique). L'addition de la strychnine tend à surmonter la dépression qui est quelquefois causée par l'administration de l'apomorphine seule.
2. La moutarde : une cuillerée à bouche dans 250 gr. d'eau chaude.

3. Le sel de cuisine : deux cuillerées à bouche dans 250 gr. d'eau tiède.
4. Le sulfate de zinc : 2 gr. dans 100 gr. d'eau chaude.
5. Le carbonate d'ammoniaque : 2 gr. dans 100 gr. d'eau chaude.
6. La poudre d'ipécacuanha : 2 gr. dans 100 gr. d'eau chaude.
7. Le sulfate de cuivre : 0 gr. 30 à 0 gr. 60 dans 100 gr. d'eau chaude.

Si l'on n'a aucun de ces remèdes sous la main, faire avaler de grandes quantités d'eau chaude et irriter le gosier pour provoquer les vomissements.

Voici le traitement des empoisonnements les plus communs :

Composés d'Antimoine.—Ce poison causant généralement des vomissements, les émétiques ne sont pas nécessaires. Si cependant ces vomissements ne se produisent pas, laver l'estomac ou administrer un émétique. Donner du thé fort ou une solution étendue d'acide tannique ; répéter jusqu'à cessation des vomissements ; puis donner en assez grande quantité du blanc d'œuf dans de l'eau ou du lait. Administrer des stimulants s'il y a collapsus. Tenir le malade chaudement entre des couvertures de laine et lui mettre des bouteilles d'eau chaude aux pieds. Quand les symptômes aigus auront cédé, calmer les douleurs en injectant du Sulfate de Morphine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 02.

Arsenic et ses Préparations. — Lavages de l'estomac, ou émétique. Il est important de vider l'estomac entièrement. Donner fréquemment du Fer Dialysé (B. W. & Cie), suivi d'un peu de sel de cuisine dissous dans de l'eau ; du lait et des œufs ou de l'eau d'orge ; des stimulants contre la prostration ; de la glace contre la soif ; mettre des bouteilles d'eau chaude aux pieds. Après disparition des symptômes aigus, faire une injection sous-cutanée de Sulfate de Morphine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 02.

Acide Phénique (Phénol).—Vider l'estomac, le laver successivement avec des solutions sucrées de chaux, de sulfate de soude ou de sulfate de magnésie, jusqu'à ce que l'odeur de l'acide ait disparu. Blanc d'œuf en grandes quantités ou lait. Beaucoup de stimulants. Chaleur aux extrémités. Respiration artificielle et injection intraveineuse ou rectale de solution saline.

Cocaïne.—Lavage de l'estomac. Stimulants—eau de vie ou sal volatile. Inhalation de Nitrite d'Amyle 'Vaporole.' Respiration artificielle.

Gaz Oxyde de Carbone, etc. — Beaucoup d'air. Respiration artificielle. Frictions. Inhalation d'oxygène. Chaleur et stimulants. Toniques pectoraux et cardiaques. Douches froides sur la tête et la poitrine.

Cuivre et Sels de Cuivre.—Si des vomissements ne se sont pas produits, donner du lait et des œufs en abondance et faire le lavage de l'estomac ou administrer un émétique. 4 gr. de ferrocyanure de potassium dans un demi-verre d'eau, à

répéter si nécessaire. Boissons émollientes. Injection de Sulfate de Morphine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 02, ou 2 cmc. de laudanum dans 15 gr. d'eau, par la bouche.

Plomb et Sels de Plomb.—Lavage de l'estomac ou administration d'émétique. Donner 15 gr. de sulfate de magnésie ou sulfate de soude dans un verre d'eau ; ou 2 cmc. d'acide sulfurique dilué dans un grand verre d'eau. Un peu plus tard, lait, blanc d'œuf, ou boissons émollientes en abondance. Injection sous-cutanée de Sulfate de Morphine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 02.

Mercure et Sels de Mercure.—Avant de vider l'estomac, donner de grandes quantités de blanc d'œuf délayé dans de l'eau ou du lait. Lavage de l'estomac ou administration d'émétique. Contre douleurs ou purgation, 2 cmc. de laudanum dans 30 gr. d'eau. Pour dépression trop forte, émollients et stimulants.

Opium, etc.—Lavage de l'estomac ou administration d'émétique. Café noir chaud. Permanganate de Potasse 'Tabloid' dans de l'eau : 0 gr. 40 neutralise 30 cmc. de laudanum. Secouer le malade et le maintenir en mouvement ; jeter de l'eau froide au visage. Si la respiration est faible, injecter sous la peau du Sulfate d'Atropine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 002. Chaleur aux extrémités. Respiration artificielle. Inhalation d'oxygène. Injection de Sulfate de Strychnine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 0022, ou Sodio-Salicylate de Caféine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 03.

Acide Oxalique.—Blanc d'Espagne, craie, plâtre ou eau de chaux en abondance, ou solution sucrée de chaux par doses de 4 cmc., répétées fréquemment ; ensuite une forte dose d'huile de ricin. Lait en abondance et Suppositoires 'Enule' de Viande Assimilable ou de Lait Assimilable.

Phosphore.—Lavages de l'estomac, ou administration d'émétique de sulfate de cuivre ou sulfate de zinc. Après vomissements abondants, 2 cmc. 50 de vieille essence de térébenthine, ou d'essence française, dans 30 gr. d'eau tous les quarts d'heure pendant une heure, puis trois fois par jour. *Éviter d'employer la térébenthine américaine ou allemande.* Administrer un purgatif de 15 gr. de sulfate de magnésie. Émollients, spécialement œufs et lait. *Éviter les huiles et les graisses.* Pour calmer les douleurs, injecter du Sulfate de Morphine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 02.

Strychnine.—Lavages de l'estomac si les conditions sont favorables ; émétique ; injection de Chlorhydrate d'Apomorphine 'Tabloid' (Hypodermique), 0 gr. 005. Tanin 'Tabloid,' ou teinture d'iode dans de l'eau, suivis d'un émétique ou d'un lavage de l'estomac. Bromure de Potassium 'Tabloid,' 8 gr., dans un verre d'eau ; répéter tous les quarts d'heure si nécessaire. *Dans les cas graves, la première chose est de faire inhaler du chloroforme pour contrôler les convulsions.* Respiration artificielle.

ANALYSES D'URINES

Autant que possible, le spécimen à examiner sera pris sur un mélange des urines de 24 heures. Lorsqu'on ne peut obtenir qu'un échantillon, on choisira de préférence l'urine fournie trois heures environ après un repas. L'urine étant versée dans une grande éprouvette cylindrique recouverte, on la laisse reposer quelques heures dans un endroit frais pour permettre aux matières en suspension de se déposer, et pour faciliter ainsi l'examen. Si l'on désire une analyse immédiate, on éliminera par un filtrage les matières en suspension.

La Trousse 'Soloid' pour Analyse d'Urines, N° 510, constitue un étui de poche très commode et de volume très restreint, renfermant tous les appareils nécessaires à un prompt examen de l'urine, dans la chambre même du malade.

Une analyse complète de l'urine nécessite son examen : (1) physique, (2) chimique, (3) microscopique et spectroscopique.

EXAMEN PHYSIQUE

I. Quantité.—L'évaluation de la quantité n'est possible que lorsque la totalité des urines de la journée peut être recueillie.

Un homme sain émet normalement 1 lit. 5 environ d'urine dans les 24 heures ; les femmes un peu moins ; les enfants au-dessous de 15 ans moins encore. La sécrétion urinaire est plus active et l'émission plus abondante pendant le jour que pendant la nuit. Toute exception à ces règles constitue une anomalie.

Chez les sujets en bonne santé, l'émission quotidienne peut être accrûe : *(a)* par une absorption excessive de nourriture ou de liquide ; *(b)* sous l'influence du froid et la diminution de sécrétion sudorifique qui en résulte. Inversement, les conditions contraires peuvent provoquer une diminution de la sécrétion urinaire.

Chez les sujets malades, une augmentation de la quantité d'urine quotidiennement émise a lieu : (1) dans diverses maladies rénales ; (2) lorsque la tension artérielle est exagérée ; (3) dans le diabète sucré et le diabète insipide ; (4) à la suite de résorption d'exsudats tels que les épanchements hydropiques ; (5) dans l'hystérie. Par contre, une diminution s'observe : (1) dans les néphrites aiguës ; (2) lorsque la tension artérielle est basse ; (3) à la suite d'obstruction de la circulation veineuse ; (4) dans les fièvres ; (5) dans certaines névroses ; (6) en présence de la diarrhée.

II. Couleur.- L'urine normale a une teinte ambrée ou paille, due à la présence du pigment urochrome et d'une petite quantité d'urobiline. L'urine acide est toujours plus foncée que l'urine alcaline. La couleur pâlit lorsque l'urine est émise en grande quantité ou lorsque la proportion de pigment urinaire se trouve diminuée, deux conditions qui se présentent dans le diabète. Inversement, lorsque la quantité quotidienne d'urine émise diminue, la couleur devient en général plus foncée.

Une teinte rougeâtre ou brun-orangé peut déceler la présence de sang, de bile, ou peut résulter de l'ingestion de substances telles que la rhubarbe, le séné, la chrysarobine, etc. Une teinte verdâtre ou vert foncé peut être due à de la bile, à l'absorption d'acide phénique ou autres médicaments. Une teinte jaunâtre peut provenir de la présence de bile, de pus ou de graisse ; ces deux derniers notamment communiquant à l'urine un aspect laiteux. L'urine peut encore prendre une coloration bleuâtre dans la fièvre typhoïde et sous l'influence du bleu de méthylène. La présence de bacilles ou de matières en suspension peut la rendre opalescente.

III. Consistance.—L'urine normale est un liquide clair et mobile ; la bile et le sucre diminuent sa mobilité, le pus la rend visqueuse et la fibrine la transforme en une sorte de gelée.

IV. Odeur.—L'urine normale est aromatique. L'acide diacétique se dédouble en acétone, qui donne à l'urine un arome de fruit. L'ingestion de térébenthine lui donne une odeur de violette, et la présence de certains médicaments, tels que l'huile de santal, se trahit par une odeur caractéristique. Il est dit que l'urine diabétique dégage une odeur de foin fraichement coupé ; l'urine en décomposition est ammoniacale, tandis que l'urine contenant le *Bacillus coli* dégage une odeur de poisson.

V. Densité.—Le poids spécifique de l'urine normale dépend principalement de la proportion d'urée ; la moyenne est de 1,015 à 1,025, mais peut s'écarter beaucoup de ces chiffres sans qu'il y ait nécessairement un état morbide. On l'estime au moyen de l'urinomètre, en se servant d'un tube à essai de gros calibre ; si cependant la quantité d'urine émise a été excessive, le résultat pourra se trouver légèrement au-dessous de la réalité.

Un poids spécifique peu élevé accompagnant une abondante émission d'urine peut indiquer le diabète insipide ou une maladie rénale chronique. La baisse persistante du poids spécifique, même sans albumine, est un grave signe d'épuisement chez les vieillards.

Une densité au-dessus de la normale peut être due à un excès d'urée ou à la présence de sucre. Accompagnée de polyurie prononcée, cette densité exagérée pourra caractériser le diabète sucré (glycosurie), dans lequel elle peut atteindre 1,075, mais en général varie entre 1,030 et 1,045. Le sucre pouvant cependant être présent dans de l'urine d'une densité inférieure à 1,020, il est important que l'examen de tout échantillon d'urine porte sur le sucre aussi bien que sur l'albumine.

La quantité de matières solides peut s'évaluer en évaporant un volume déterminé d'urine au bain-marie jusqu'à dessiccation, et en pesant le résidu.

Pour les analyses ordinaires, la proportion de matières solides dans une urine *normale* peut être approximativement évaluée en doublant le nombre formé par la deuxième et la troisième décimales de la densité. Ainsi 1000 parties d'une urine accusant une densité de 1,020 contiendront environ 40 parties de matières solides, soit 4 pour cent.

Pour déterminer la quantité totale de matières solides émises chaque jour, il faut recueillir les urines émises pendant 24 heures et évaluer par cette méthode la proportion de dépôts fournis par un échantillon du mélange. Le poids quotidien moyen des constituants solides de l'urine *normale* est de 60 à 70 gr.

VI. Dépôts.—Après avoir reposé quelque temps, l'urine normale présente un voile nuageux de mucus, qui, à moins d'une densité particulièrement élevée de l'urine, se dépose bientôt au fond de l'éprouvette. La composition de ce mucus n'a pu encore être exactement déterminée.

L'urine normale peut contenir : (1) des dépôts d'acide urique libre et d'urates, qui, ordinairement, sont rougeâtres ou d'un brun sombre (couleur poivre-de-cayenne ou brique-pilée) et se dissolvent sous l'influence de la chaleur ; (2) des phosphates basiques (calcium et magnésium) incolores, floconneux, insolubles par la chaleur, mais solubles dans les acides étendus ; (3) de faibles dépôts d'oxalates insolubles dans les acides étendus.

Des éléments anormaux, tels que le pus, peuvent également se déposer. Pour l'examen microscopique des dépôts urinaires, *voir page* 126.

EXAMEN CHIMIQUE

1. Réaction

Essai au moyen du papier de tournesol.

L'urine normale est en général acide, ce qui provient des sels acides qu'elle renferme et en particulier du phosphate de soude acide. L'urine peut

être alcaline après les repas, lorsque le phosphate bisodique remplace le sel acide. Avant les repas l'urine est ordinairement plus acide.

Lorsque de fortes quantités du sel bisodique et du sel acide se trouvent en présence, l'urine peut devenir amphotérique, c'est-à-dire donner avec du papier de tournesol rouge une réaction alcaline, et avec du papier de tournesol bleu une réaction acide, mais ce fait ne présente pas d'intérêt au point de vue clinique.

Dans les affections fébriles, et particulièrement dans le rhumatisme aigu, la réaction peut devenir fortement acide. L'urine qui a reposé un certain temps fermente et devient alcaline et ammoniacale.

Dans certaines conditions pathologiques des voies génito-urinaires, l'urine peut être émise sous cette dernière forme.

2. Constituants Normaux

L'**urée** est, au point de vue clinique, l'élément le plus important de l'urine normale.

Estimation Quantitative de l'Urée

(1) Au Moyen du Poids spécifique.—La proportion d'urée peut être approximativement évaluée en divisant par 10 le nombre formé par la deuxième et la troisième décimales de la densité de l'urine. Par exemple, une densité de 1,025 indiquera que l'urine renferme 2,5 pour cent d'urée.

L'exactitude de cette méthode est fort diminuée : (*a*) dans les cas de fièvre ; (*b*) lorsqu'on se trouve en présence d'urine renfermant du sucre ou une forte proportion d'albumine.

(2) Par l'Emploi de l'Uréomètre.—Cet appareil indique la quantité d'azote dégagée lorsqu'on traite l'urine par l'hypobromite de soude. Ce sel décompose l'urée et met en liberté la totalité de l'azote qu'elle contient. Dans les conditions ordinaires de température et de pression 1 gr. d'urée produit 372 cmc. d'azote.

3. Constituants Anormaux

(A) Protéines.—Certaines protéines, telles que la mucine, ne se présentent qu'en très minimes quantités dans l'urine normale.

Au point de vue clinique, le terme "albuminurie" désigne la présence dans l'urine de sérum-albumine et de sérum-globuline, et l'on entend généralement par "albumine" ces deux protéines réunies.

Détermination Qualitative de l'Albumine

Pour la détermination de l'albumine, il faut toujours commencer par filtrer l'urine, préalablement rendue acide au moyen d'Acide Citrique 'Soloid' si elle est alcaline.

Lorsque le filtrage ne parvient pas à clarifier le liquide, c'est que l'on est probablement en présence de bactéries, qui pourront être précipitées en ajoutant du carbonate de baryte et en agitant avant de refiltrer.

Lorsque l'on aura enfin obtenu une urine clarifiée, on pourra procéder comme suit :

(1) Essai par la Chaleur.—Faire bouillir un peu d'urine dans une éprouvette. Si la réaction est acide et que l'urine reste claire, c'est qu'elle ne contient pas d'albumine. Si l'urine devient trouble ou donne un précipité, il y a des phosphates ou de l'albumine : ajouter un produit d'Acide Citrique 'Soloid.' Si l'urine se clarifie, cela indique la présence de phosphates ; si elle reste trouble, il y a de l'albumine.

(2) Essai a l'Acide Nitrique.—Verser 4 cmc. environ d'acide nitrique pur dans un tube à essai. Au moyen d'une pipette, faire couler le long de la paroi du tube quelques gouttes d'urine qui s'étendront à la surface de l'acide sans se mélanger avec lui. Si, après une demi-minute, il ne s'est pas formé à la surface de l'acide un anneau blanc opaque, on n'est pas en présence d'albumine ; si cet anneau se forme, l'acide picrique permettra de reconnaître s'il est dû à l'albumine ou à l'albumose *(voir page 122)*.

NOTA.—(*a*) L'acide nitrique peut, avec des urines concentrées, donner lieu à un léger précipité dû à l'azotate d'urée ou à des composés uréiques acides. Ce précipité disparaît par la chaleur, et l'on peut le prévenir en étendant préalablement l'urine de deux fois son volume de solution saline normale, laquelle peut s'obtenir facilement au moyen du Chlorure de Sodium 'Soloid.' (*b*) Des corps résineux, tels que le baume de copahu, peuvent également produire, avec l'acide nitrique, un léger nuage qui disparait par la chaleur ou par l'addition d'alcool.

(3) ÉSSAI A L'ACIDE PICRIQUE.—Préparer une solution saturée d'acide picrique en dissolvant un produit d'Acide Picrique 'Soloid' dans 5 gr. d'eau distillée. Ajouter cette solution goutte à goutte à l'urine dans une éprouvette. Si aucun précipité ne se produit, il n'y a pas d'albumine. Si, au contraire, il y a formation d'un précipité, celui-ci peut être dû à l'albumine, l'albumose, les peptones ou à des alcaloïdes. Si le précipité ne disparaît pas par la chaleur, la présence d'albumine se trouve démontrée.

(4) ESSAI AU FERROCYANURE DE POTASSIUM.—Préparer une solution concentrée de ferrocyanure de potassium en dissolvant un produit de Ferrocyanure de Potassium 'Soloid' dans 2 gr. d'eau distillée. Ajouter à une petite quantité d'urine clarifiée un produit d'Acide Citrique 'Soloid'; si le liquide se trouble, filtrer. Ajouter ensuite quelques gouttes de la solution de ferrocyanure de potassium. Si l'urine reste limpide, c'est qu'elle ne contient pas d'albumine; s'il y a formation de précipité, on se trouve en présence d'albumine ou d'albumose, ce que l'on pourra déterminer par l'essai à l'acide picrique *(voir ci-dessus)*.

(5) ESSAI A L'ACIDE SULFO-SALICYLIQUE.—Dissoudre un produit d'Acide Sulfo-salicylique 'Soloid' dans 1 gr. d'eau et ajouter cette solution à 8 cmc. d'urine. La formation d'un léger précipité indiquera la présence de l'albumine.

Estimation Quantitative de l'Albumine

La quantité d'albumine peut exactement s'évaluer au moyen de l'albuminimètre d'Esbach, qui consiste en un tube de verre épais gradué de 0 à 7. Voici la manière de procéder :

Noter d'abord le poids spécifique de l'urine. Si ce poids atteint ou dépasse 1,010, ramener l'urine à la densité de 1.008 en y ajoutant une quantité d'eau qui sera prise en compte dans la détermination du résultat définitif.

Faire ensuite une solution saturée d'acide picrique en dissolvant deux produits 'Soloid' dans 10 gr. d'eau distillée. Remplir d'urine l'albuminimètre jusqu'au trait U, et ajouter la solution d'acide picrique jusqu'à la marque R. Mélanger en retournant doucement le tube à plusieurs reprises; puis laisser reposer 24 heures dans la position verticale.

Après ce laps de temps, lire sur l'échelle la hauteur atteinte par le précipité. Il est important d'assurer une température constante, car la quantité de précipité en dépend. Chaque degré de précipité correspond à 0,1 pour cent d'albumine dans l'urine, les chiffres de l'échelle représentant des grammes d'albumine par litre d'urine.

Si l'urine a été étendue, par exemple de trois fois son volume d'eau, le résultat sera multiplié par le degré de dilution : c'est-à-dire, par trois.

NOTA.—Dans le cas où le niveau du précipité est au-dessus du trait 4, il faut prélever un autre échantillon d'urine, l'étendre davantage d'eau, et répéter l'essai. En général, dans l'albuminurie, le malade émet par jour environ 8 gr. d'albumine, correspondant à une proportion de 0,5 pour cent.

Albumoses et Peptones

La recherche des albumoses et peptones est en général assez compliquée et d'une application difficile (l'essai à l'acide tungstophosphorique, par exemple). Les procédés suivants sont plus simples :

Albumoses.—Toute l'albumine que peut contenir l'urine doit être préalablement coagulée par ébullition avec de l'Acide Citrique 'Soloid' et séparée par filtrage (*voir* premier essai de l'albumine). Dans un tube à essai ajouter à l'urine clarifiée une solution saturée froide d'acide

sulfo-salicylique, préparée en dissolvant deux produits d'Acide Sulfo-salicylique 'Soloid' dans quelques gouttes d'eau distillée : la formation d'un précipité indiquera la présence d'albumoses.

Peptones.—Après avoir éliminé l'albumine comme il a été indiqué ci-dessus, saturer de sulfate d'ammoniaque l'urine clarifiée. Après filtrage ou décantation, l'additionner d'une solution préparée en dissolvant un produit d'Acide Sulfo-salicylique 'Soloid' dans 1 gr. d'eau ; la formation d'un précipité disparaissant lorsqu'on le chauffe, et reparaissant lors du refroidissement, indiquera la présence de peptones.

(B) Sang et ses Dérivés.—L'urine qui renferme du sang a un aspect rouge ou brun foncé. Le terme hématurie désigne la présence dans l'urine de sang à l'état complet ; quand le colorant sanguin seul, sans globules, apparaît dans l'urine, cela constitue l'hémoglobinurie. L'examen microscopique des globules sanguins est indispensable pour établir ces différences, et les essais indiqués ci-après ne font que démontrer la présence de pigment sanguin.

(1) Essai au Gaïac.—La réussite de cet essai exige l'emploi de teinture de gaïac fraîchement préparée au moyen de résines non oxydées, et d'éther ozonique contenant en dissolution du peroxyde d'hydrogène (30 volumes). A 4 cmc. d'urine dans un tube à essai ajouter deux gouttes de teinture de gaïac, puis (sans agiter) 4 cmc. d'éther ozonique. Quand l'urine renferme du pigment sanguin, une coloration bleue se manifeste au niveau inférieur de l'éther.

Nota.—(*a*) L'iodure de potassium dans l'urine donne également une coloration bleue avec l'essai au gaïac, mais dans ce cas la couleur bleue apparaît beaucoup plus lentement qu'avec le sang et teint tout le liquide simultanément ; (*b*) le pus donne avec le gaïac seul une coloration d'un bleu verdâtre qui disparaît par la chaleur ; (*c*) la salive et le mucus nasal donnent la réaction au gaïac.

(2) Essai de Heller.—A 10 cmc. d'urine dans une éprouvette, ajouter de la soude caustique jusqu'à ce que l'on obtienne un mélange fortement alcalin. En faisant bouillir, la présence du pigment sanguin se révèle par la coloration rouge brun du dépôt de phosphates basiques, coloration due à la présence de l'hématine du sang : le liquide tourne au vert-bouteille.

(3) Examen spectroscopique.—L'examen spectroscopique est indispensable pour déterminer exactement la présence d'oxyhémoglobine et autres dérivés du sang, tels que la méthémoglobine et l'hématoporphyrine.

L'urobiline donne dans la partie verte du spectre une bande entre les lignes *b* et *F*.

On trouvera dans divers livres traitant de travaux cliniques une description complète des signes spectroscopiques donnés par l'urine contenant de l'hémoglobine, de la méthémoglobine et de l'hématoporphyrine.

(C) Bile.—Le pigment et les acides de la bile peuvent se présenter dans l'urine, le pigment étant le plus abondant. La bile donne une teinte verdâtre ou jaune à l'urine et lui fait perdre de sa mobilité. Lorsqu'on agite de l'urine contenant de la bile, l'écume formée à la surface est verdâtre et plus persistante qu'à l'ordinaire. Cette teinte verdâtre permet de différencier l'urine bilieuse de l'urine contenant du salol, car avec cette dernière l'écume ne se colore pas ainsi.

Réactions du Pigment de la Bile

(1) Essai de Gmelin.—Dans une capsule de porcelaine blanche laisser tomber, goutte à goutte et simultanément, de l'urine et de l'acide nitrique fumant. S'il y a le pigment biliaire, il se produit une gamme de couleurs : *vert*, bleu, violet, rouge, jaune.

Nota. La couleur *verte* apparaîtra toujours lorsqu'on se trouve en présence de bile. Si l'on étend l'acide nitrique de trois fois son volume d'eau, cette couleur verte apparaîtra encore plus distinctement.

(2) Essai au Violet-Méthyle.—Préparer une solution de violet-méthyle en dissolvant un produit Violet-Méthyle 'Soloid' dans 10 cmc. d'eau. Cette solution est alors diluée dans cinq cents fois son volume d'eau (une goutte

pour 25 cmc.). On verse un peu de cette solution diluée le long de la paroi d'un tube à essai contenant 10 cmc. d'urine. En cas de présence de pigment biliaire, un anneau carmin clair apparaît entre les deux couches de liquides à la surface de contact.

NOTA.—(*a*) La présence d'albumine ou de sang n'a pas d'influence sur les résultats. (*b*) La chrysarobine donne la même réaction.

(D) Sucres.—La glucose (dextrose ou sucre de raisin) et la lactose (ou sucre de lait) sont les seuls sucres présentant une importance clinique dans les analyses d'urine. La glucose est le sucre qui se rencontre le plus souvent dans l'urine, et sa présence est généralement désignée par le terme "glycosurie"; la lactose peut quelquefois se présenter en quantités appréciables dans l'urine des nourrices.

Nombre de sommités médicales sont d'avis que l'urine normale renferme de la glucose dans une proportion trop faible cependant pour que les réactifs ordinaires puissent la déceler. Un résultat positif donné par l'analyse justifie donc la conclusion d'un état morbide.

Avant l'examen du sucre, il faudra coaguler toute l'albumine présente par ébullition avec de l'Acide Citrique 'Soloid' et la retirer par un filtrage. D'ailleurs, avec toutes les urines, le filtrage est toujours à recommander.

Détermination Qualitative du Sucre

Certains essais sont basés sur le pouvoir réducteur des différentes sucres. Comme d'autre part la glucose et la lactose donnent toutes les deux des résultats positifs, ces essais ne sont pas absolument concluants relativement à la présence de la glucose; d'autres substances aussi, telles que l'acide glycuronique par exemple, agissent comme agents reducteurs, mais la lactose et l'acide glycuronique ne se présentent que rarement dans l'urine.

(1) ESSAI DE FEHLING.—Faire bouillir la solution préparée avec le Réactif de Fehling 'Soloid,' ajouter alors goutte à goutte l'urine diluée *(voir note ci-dessous)* en chauffant encore. Si aucune réaction n'a lieu, continuer à ajouter l'urine jusqu'à ce qu'un volume égal à celui de la solution de Fehling ait été obtenu.

Si l'on est en présence de sucre, il se produit rapidement un précipité de protoxyde de cuivre d'un jaune rougeâtre. En suspension dans le liquide, la couleur de ce précipité peut varier du vert clair au jaune ou au brun rougeâtre, selon la proportion de sucre.

NOTA.—L'acide urique en excès et les corps extractifs peuvent, dans l'urine concentrée, provoquer la réduction de l'oxyde de cuivre du réactif. Aussi devra-t-on, avant l'essai au réactif de Fehling, diluer l'urine. Comme le chloroforme et d'autres substances peuvent également réduire l'oxyde de cuivre, il est préférable dans les cas douteux de supplémenter l'examen par d'autres réactions.

(2) ESSAI A LA PHÉNYLHYDRAZINE.—Verser l'urine dans une éprouvette jusqu'à mi-hauteur, ajouter quelques décigrammes de chlorhydrate de phénylhydrazine et environ deux fois autant d'acétate de soude cristallisé. Placer le tube pendant une demi-heure dans l'eau bouillante et agiter fréquemment jusqu'à dissolution des réactifs. Mettre alors le tube dans l'eau froide jusqu'à refroidissement de la solution. Si l'on est en présence de sucre, il se produira un dépôt de cristaux aciculés jaunâtres; si c'est de la glucose, ce seront des cristaux de phénylglucosazone; la lactose donnera, par contre, des cristaux de phényllactosazone. Un examen microscopique permettra de les différencier.

Les cristaux de phénylglucosazone ont la forme d'aiguilles de couleur jaune clair et tendent à se grouper en forme d'étoile ou d'éventail; les cristaux de phényllactosazone sont plus courts, plus gros, effilés à leurs deux extrémités et ont moins de tendance à s'étoiler.

(3) ESSAI A L'INDIGO.—Mélanger 0 cmc. 6 d'urine et 10 gr. d'eau. Ajouter alors un produit de Réactif à l'Indigo 'Soloid' (Nitrophénylpropiolate de Soude, 0 gr. 016) et faire bouillir. En cas de présence de sucre le liquide devient bleuâtre, cette coloration étant due à la formation de

bleu-indigo. Le changement de couleur peut se produire rapidement, mais quelquefois il n'a lieu qu'au bout de quatre ou cinq minutes. Il faut donc, avant de se prononcer sur le résultat de l'essai, maintenir au besoin l'ébullition pendant ce laps de temps.

NOTA.—Cette réaction, produite aussi bien par la lactose que par la glucose, n'est pas influencée par la présence d'acide urique, de créatinine, d'acide glycuronique ou de pigment biliaire, ni par l'action des agents médicamenteux.

(4) ESSAI DE JOHNSON.—A 8 cmc. d'urine ajouter la même quantité d'une solution saturée d'Acide Picrique 'Soloid' et deux produits de Tartrate Alcalin 'Soloid' (Réactif de Fehling) préalablement dissous dans 4 cmc. d'eau. Faire bouillir pendant une minute, et si le liquide, regardé par transparence, prend un ton rouge clair, on n'est pas en présence de sucre ; celui-ci produit en effet une teinte presque noire.

Les essais précédents donnent un resultat positif quant à la glucose et la lactose. Il est probable que le sucre en présence duquel on se trouve est de la glucose. Mais pour distinguer entre la glucose et la lactose il faut recourir au procédé suivant :

(5) ESSAI DE FERMENTATION.—Cet essai est concluant pour la glucose, qui est, dans l'urine, le seul élément capable de fermenter.

Avant de procéder à l'essai, on acidulera au besoin l'urine par l'addition d'Acide Citrique 'Soloid' et on la portera à ébullition pendant quelques minutes pour en chasser tous les gaz.

Pour l'essai proprement dit on agite l'urine avec un peu de levure fraîche et active dans un tube spécial à fermentation, ou dans une éprouvette ordinaire retournée dans un bain de mercure. Toute bulle d'air doit être soigneusement exclue. On met le tube dans un endroit chaud, et si, quelques heures après, une bulle se montre nettement au sommet du tube, on se trouve en présence d'une substance fermentescible, c'est-à-dire en présence du glucose.

NOTA.—(*a*) Pour vérifier l'activité de la levure, il faut l'essayer préalablement avec une solution de glucose. (*b*) Il est également prudent d'ajouter un peu de levure à un tube de contrôle rempli d'urine saine, car la levure peut elle-même produire un peu de gaz.

Acétone et Acide Diacétique

Dans certains cas de glycosurie, l'urine peut contenir de l'acétone ou de l'acide diacétique. La présence d'acétone peut être constatée par l'essai suivant :

Ajouter à l'urine une quantité égale de potasse caustique et quelques gouttes d'une forte solution de nitroferrocyanure de sodium. La solution de nitroferrocyanure de sodium est plus aisément préparée lorsqu'on en a besoin en faisant dissoudre quelques cristaux dans une faible quantité d'eau contenue dans un tube d'essai. Une couleur brune apparaîtra, qui tournera au rouge foncé lorsqu'on y ajoutera de l'acide acétique glacial.

L'essai suivant démontrera la présence d'acide diacétique : Ajouter à l'urine quelques gouttes de solution de perchlorure de fer. Il se produira une coloration rouge.

Estimation Quantitative du Sucre

La méthode suivante pour évaluer la quantité de sucre contenue dans une urine est basée sur la réaction de réduction de Fehling. On procède comme suit :

Préparer d'abord une solution titrée en dissolvant quatre produits de Sulfate de Cuivre 'Soloid' dans 2 gr. environ d'eau distillée ; ajouter à cette solution quatre produits de Tartrate Alcalin 'Soloid' et porter la liqueur ainsi obtenue au volume exact de 4 cmc. à 15° C. Chaque centimètre cube correspond à 0 gr. 005 de glucose anhydre.

Si l'on préfère, cette solution de 4 cmc. peut être étendue d'un volume égal d'eau. Chaque centimètre cube correspondra alors à 0 gr. 0025 de glucose anhydre.

Le rapport du pouvoir réducteur de la lactose à celui de la glucose est de 7 à 10. Chaque centimètre cube de solution titrée étendue correspond donc approximativement à 0 gr. 0036 de lactose.

Faire un premier essai en ajoutant de l'urine à un volume déterminé de la solution titrée bouillante. La quantité d'urine ajoutée doit être juste suffisante pour qu'après ébullition et dépôt du précipité la couleur bleue du réactif disparaisse. Diluer alors (au besoin) l'urine de façon à ce qu'elle renferme de 0,5 à 1 pour cent de sucre et faire un nouvel essai plus précis avec l'urine ainsi étendue.

E (Pus). En général la présence du pus peut être constatée par un examen physique fait par l'un des deux essais suivants :

(1) Traiter le dépôt avec une solution de potasse. S'il y a du pus dans l'urine, il se forme une masse gélatineuse et visqueuse.

(2) Le pus et la teinture de gaïac réagissent en donnant une couleur verte qui disparaît par la chaleur.

4. Diazo-Réaction d'Ehrlich

Préparer deux solutions fraîches : (1) Une solution saturée d'acide sulfanilique dans de l'acide chlorhydrique à 5 pour cent ; (2) une solution à 0,5 pour cent de nitrite de soude.

Ajouter à 5 cmc. d'urine dans une éprouvette une quantité égale de la solution N° 1, puis quelques gouttes de la solution N° 2, et agiter jusqu'à formation d'écume : verser alors de l'ammoniaque jusqu'à ce que le mélange devienne alcalin. Une couleur vin-de-Porto, accompagnée d'une écume rouge, constitue un résultat positif. Cette réaction trouve son utilité dans diverses maladies.

(a) Elle a lieu généralement dans les cas de fièvre typhoïde pendant la seconde ou la troisième semaine ; cependant, en cas d'attaque bénigne elle peut faire défaut.

(b) Dans certains cas de tuberculose à évolution rapide la réaction est presque toujours positive.

(c) Dans la rougeole, elle donne aussi un résultat positif plus fréquemment que dans les cas de rubéole.

EXAMEN MICROSCOPIQUE

Pour l'examen microscopique, il faut commencer par la séparation du dépôt au moyen de la centrifugation. Au point de vue clinique, les seuls dépôts présentant quelque intérêt sont ceux dont les constituants sont anormaux :

(1) Globules Rouges du Sang. Ils se présentent dans l'hématurie, et l'examen microscopique permet de différencier celle-ci de l'hémoglobinurie. Comme les hématies peuvent se gonfler et disparaître dans l'urine alcaline, l'examen doit se faire le plus tôt possible après qu'elle a été recueillie ; les hématies peuvent avoir un aspect jaunâtre ou incolore, être biconcaves ou biconvexes, à contours réguliers ou non.

(2) Globules Blancs du Sang, Pus, Globules Graisseux.—Ces corps peuvent également apparaître à l'examen.

(3) Cylindres Urinaires.—Ils peuvent être cellulaires, granulaires ou amorphes. Il est très important de reconnaître leur présence, car elle a une grande importance prognostique.

(4) Parasites Divers.— Tels que l'échinocoque et les ovules du parasite du sang de Bilharzia.

(5) Bactéries Pathogènes.—Gonocoque et bacille de Koch. Elles peuvent être colorées au moyen des Colorants 'Soloid' pour la Microscopie, et dans les cas douteux leur présence suffit pour établir le diagnostic.



Une Méthode Simple pour faire l'Analyse des Eaux Potables

L'examen de l'eau potable doit comprendre la détermination des caractères et constituants suivants :

1. Propriétés physiques. 2. Résidu laissé après l'évaporation. 3. Degré de crudité. 4. Quantité de chlore présent sous forme de chlorures. 5. Présence ou absence de nitrites. 6. Quantité de nitrates présents. 7. Présence ou absence d'ammoniaque à l'état libre. 8. Quantité d'oxygène absorbé. 9. Présence ou absence d'impuretés métalliques.

Le modèle de la Boîte pour Analyses d'Eaux, marque 'Soloid,' N° 500, a été spécialement établi par le Dr. J. C. Thresh, M.D., D.Sc., Médecin officiel de comté, pour répondre à ces besoins.

Pour l'analyse d'une eau il faut prendre 100 gr. d'eau pour chaque épreuve. De cette manière chaque milligramme représente un cent-millième du poids d'eau. Puis on procède comme suit :

1. La **couleur**, la **transparence** ou **état trouble**, **l'odeur** et la **réaction** de l'eau sont notés.

2. Le **résidu qui reste après évaporation** est examiné.

3. Le **degré de crudité** se détermine par l'emploi du Savon 'Soloid' (Analyse d'Eaux Potables). Chaque produit 'Soloid' représente 5 degrés de crudité, mais on doit déduire 1 degré pour le savon non combiné dans l'écume. Si, par l'addition d'un produit, il se forme après agitation une écume permanente, l'eau possède 4 degrés de crudité ; s'il faut ajouter deux produits, elle a 9 degrés, et ainsi de suite.

4. Pour l'estimation du **chlore** sous forme de chlorures, on emploie le Nitrate d'Argent 'Soloid' (Analyse d'Eaux Potables). Chaque produit 'Soloid' correspond à 2 cent-millièmes de chlore. On emploie le Chromate de Potasse 'Soloid' (Analyse d'Eaux Potables) pour indiquer le terme de la réaction.

5. La présence de **nitrites** est démontrée par la production d'une couleur brune quand un produit 'Soloid' de Sulfate de Métaphénylènediamine (Analyse d'Eaux Potables) est ajouté à l'eau.

6. Si l'eau ne contient pas de nitrites, on peut constater la présence de **nitrates** en ajoutant un produit 'Soloid' de Sulfate de Soude Acide (Analyse d'Eaux Potables) à une nouvelle quantité d'eau, suivi d'un produit de Zinc en poudre 'Soloid' (Analyse d'Eaux Potables). Après avoir laissé reposer le mélange pendant cinq minutes, on le filtre et on y ajoute un produit 'Soloid' de Sulfate de Métaphénylènediamine (Analyse d'Eaux Potables). La rapidité avec laquelle une couleur brune se produit, et la teinte plus ou moins foncée de cette coloration, sont proportionnées à la quantité de nitrates présents. Si l'eau contient des nitrites, il faut apporter quelques modifications à la méthode précédente pour constater la présence de nitrates.

   Pour les estimations colorimétriques comparatives des nitrates, on peut employer un produit 'Soloid' de Nitrate de Potasse (Analyse d'Eaux Potables), correspondant à la fraction 0,2 de centmillième d'azote à l'état de nitrates.

7. **L'ammoniaque libre** se reconnaît par l'emploi du Réactif Nessler 'Soloid,' qui produit une coloration jaune ou jaune brunâtre. On peut évaluer approximativement la quantité d'ammoniaque présent après distillation d'une portion, en comparant la couleur produite par l'addition d'un produit de Réactif Nessler 'Soloid' au liquide distillé, avec celle qui est produite par le même réactif lorsqu'on l'ajoute à une solution titrée préparée avec le Chlorure

d'Ammoniaque 'Soloid' (Analyse d'Eaux Potables) : chaque produit de cette substance représente 0 mgr. 05 d'ammoniaque (AzH^3).

NOTA.—Le dépôt qui paraît dans les capsules de Réactif Nessler au bout d'un certain temps ne nuit en rien à la réaction. Le Réactif Nessler ne devrait pas être employé quand il est frais, attendu que sa sensibilité augmente à mesure qu'il vieillit.

8. **L'oxygène absorbé** s'évalue de la manière suivante :—On fait dissoudre un produit 'Soloid' de Permanganate de Potasse (Analyse d'Eaux Potables) dans 10 gr. d'eau distillée. Puis, prenant 100 gr. de l'eau à analyser, préalablement acidulée d'un produit 'Soloid' de Bisulfate de Soude (Analyse d'Eaux Potables), on la fait bouillir avec des parties successives de 1 cmc. de la solution de permanganate jusqu'à ce que cette dernière ne se décolore plus. Chaque cmc. de solution de permanganate nécessaire pour produire cet effet correspond à l'absorption de 0,1 de cent-millième d'oxygène. Si l'eau en bouillant avec le permanganate devient brune ou trouble, il est impossible de déterminer d'une façon exacte la quantité d'oxygène absorbé, mais cela importe peu, attendu qu'une eau de cette nature doit être considérée comme suspecte.

9. Les **impuretés métalliques** se constatent au moyen du produit 'Soloid' de Chromate de Potasse (Analyse d'Eaux Potables) pour le plomb ; et par le produit 'Soloid' de Ferrocyanure de Potassium (Analyse d'Eaux Potables) pour le zinc, le fer et le cuivre.

Un réactif plus délicat pour le plomb—impureté la plus commune et la plus importante—est l'hydrogène sulfuré.

Pour obtenir une solution de ce réactif, il faut d'abord faire dissoudre un produit 'Soloid' d'Acide Oxalique (Analyse d'Eaux Potables) dans 10 gr. d'eau ; puis on y ajoute un produit 'Soloid' pulvérisé de Sulfure de Zinc (Analyse d'Eaux Potables), on agite vigoureusement pendant une minute au moins, on dilue la solution de façon à obtenir 50 gr. et on filtre. Pour employer ce réactif, on ajoute aux 100 gr. d'eau à analyser 2 gr. de la solution d'hydrogène sulfuré. S'il ne se produit pas de précipité, ni de coloration brune ou noire, l'eau examinée ne contient pas de plomb. Quand, au contraire, le précipité ou la coloration se sont produits, il faut ajouter à l'eau un produit 'Soloid' de Bisulfate de Soude (Analyse d'Eaux Potables) ; alors si, en remuant, le précipité ou la coloration persistent, l'eau contient du plomb (ou du cuivre).

La quantité de plomb peut être approximativement évaluée en comparant la couleur avec celle produite par l'addition de l'hydrogène sulfuré à de l'eau distillée contenant une quantité déterminée de plomb. A cet effet, un produit 'Soloid' d'Acétate de Plomb (Analyse d'Eaux Potables) peut être employé, lequel est dosé de telle façon qu'une solution d'un produit dans 100 cmc. représente 10 cent-millièmes de plomb métallique.

On devra supplémenter l'analyse chimique par l'inspection de la source de l'approvisionnement, etc., avant d'arriver à une opinion définitive.

Les détails relatifs aux réactions énumérées ci-dessus se trouvent dans l'ouvrage du Dr. THRESH—*Une Méthode Simple pour l'Analyse de l'Eau*, qui donne aussi la signification des résultats.

Les équipements 'Soloid' sont facilement transportables, de sorte que l'analyse peut se pratiquer à la source même de l'approvisionnement, ce qui économise le temps et la peine. Chaque boîte contient des formes imprimées pour l'inscription des résultats.

La Boîte pour Analyse d'Eaux, N° 500, marque 'Soloid,' en acajou verni, mesure 32 × 26,5 × 11,5 cm. Cette boîte commode et faite pour être portée à la main contient tous les appareils et substances nécessaires pour les réactions indiquées ci-dessus.

La Boîte pour Analyses d'Eaux Potables et d'Eaux d'Égouts, marque 'Soloid,' N° 502, mesure 47 × 31 × 13 cm. Elle contient tous les appareils et réactifs voulus pour faire sur les lieux une analyse complète d'eau potable ou d'eaux d'égout.

Pour le contenu et le prix de ces équipements, voir pages 197, 198, 213

INDICATEURS POUR LES RÉACTIONS CHIMIQUES

Pour les réactions chimiques, et principalement quand il s'agit de détermination volumétriques, il est souvent nécessaire d'employer une substance capable d'indiquer la fin de la réaction—par exemple, le point exact de la neutralisation d'un acide ou d'un alcali, etc. Un grand nombre de ces indicateurs (comme on les a nommés) étant plus ou moins instables en solution, surtout quand ils sont exposés à la lumière, leur préparation sous la forme de produits 'Soloid' à un état permanent de stabilité a été grandement appréciée. Ces produits 'Soloid' permettent, en effet, de préparer facilement, au fur et à mesure des besoins, de petites quantités de solution de n'importe quel indicateur et de n'importe quelle concentration.

Les indicateurs suivants sont souvent employés :

Indigo-Carmin 'Soloid.'—En dissoudre un dans 10 gr. d'eau.

Lacmoïde 'Soloid.'—En dissoudre un dans 10 cmc. d'alcool à 50°. Ce réactif, beaucoup plus délicat que le papier tournesol, peut s'employer dans tous les cas où celui-ci sert d'indicateur. Les acides le rougissent, les alcalis lui restituant sa couleur bleue.

Méthyl-Orange 'Soloid.'—En dissoudre un, pulvérisé, dans 10 gr. d'eau. La solution prend une couleur jaune en contact avec les hydroxides, carbonates et bicarbonates alcalins, et devient rose avec les acides minéraux. L'acide carbonique ne l'affecte pas, mais la présence d'acides organiques rend son emploie impossible.

Phénolphtaléine 'Soloid.'—En dissoudre un dans 10 cmc. d'alcool à 50°. Cette solution est colorée en rouge par les alcalis et rendue incolore par les acides. Ce réactif n'est pas sûr en présence de l'ammoniaque, et s'il est employé pour les carbonates et les bicarbonates, l'acide carbonique doit être préalablement expulsé par l'ébullition.

Acide Rosolique 'Soloid.'—En dissoudre un dans 10 cmc. d'alcool à 50°.

Amidon 'Soloid.'—En mettre un dans environ 100 gr. d'eau, et faire bouillir la solution pendant quelques minutes. Après refroidissement, on décante le liquide clair. Cet indicateur sert à révéler la présence de l'iode à l'état libre.

EXAMEN DES EAUX ET EFFLUENCES D'ÉGOUT

Un examen général et complet des eaux d'égout peut se pratiquer de la même manière et avec les mêmes réactifs que ceux décrits dans les pages suivantes pour l'analyse des eaux potables, quoique les résultats doivent naturellement être jugés à un point de vue totalement différent.

Quand une eau d'égout contient comparativement peu de détritus de manufactures, et est principalement de nature ménagère, on attache une importance particulière à la détermination de la quantité d'oxygène que la matière organique en solution est capable de consumer. Pour cela on emploie les réactifs suivants :

Les produits 'Soloid' de Permanganate de Potasse (Analyse des Eaux d'Égout), représentant chacun 1 mgr. d'oxygène disponible.

Les produits 'Soloid' d'Acide Oxalique (Analyse des Eaux d'Égout), dont chacun est capable de décolorer exactement un produit 'Soloid' de Permanganate de Potasse (Analyse des Eaux d'Égout).

Les produits 'Soloid' de Sulfate de Soude Acide, employés comme pour l'analyse d'eaux potables.

L'examen des effluences d'égouts est maintenant fréquemment nécessaire afin de se rendre compte si les procédés employés pour la désinfection des égouts produisent les résultats désirés.

Sous ce rapport, le degré d'oxygénation de l'effluence est une considération importante et ce point peut être estimé d'une façon satisfaisante et prompte au moyen du produit 'Soloid' d'Hydroxyde de Soude (Analyse des Eaux d'Égout) et du produit 'Soloid' d'Acide Pyrogallique (Analyse des Eaux d'Égout).

Pour le mode d'emploi de ces réactifs et l'interprétation des résultats, consulter l'ouvrage du Dr. THRESH, *Une Méthode Simple pour l'Analyse de l'Eau*, au chapitre qui traite des eaux et effluences d'égouts.

COLORANTS 'SOLOID' MARQUE DE FABRIQUE
POUR LA MICROSCOPIE

"Ils donnent d'excellents résultats, et les colorants à l'aniline employés sont évidemment de la meilleure qualité."—PUBLIC HEALTH.

[Les procédés indiqués dans les pages qui suivent sont ceux qu'emploient avec d'excellents résultats les membres des Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques. Sans doute, d'autres expérimentateurs, travaillant dans des conditions différentes (température, etc.), et opérant selon leur propre initiative, pourront obtenir des résultats différents. Mais leur expérience leur suggèrera naturellement la meilleure manière d'employer ces colorants.]

La plupart des opérations qui sont décrites ici peuvent être effectuées à l'aide de la Trousse Bactériologique 'Soloid,' N° 505, ou la Trousse 'Soloid' pour l'Essai du Sang, N° 506, contenant des Colorants 'Soloid' pour la Microscopie. Muni d'une de ces trousses, le praticien pourra lui-même exécuter commodément des travaux qu'il lui fallait autrefois confier à des laboratoires spéciaux. Les Équipements 'Soloid' présentent sous une forme compacte et sous un petit volume tout ce qui est essentiellement nécessaire pour ces travaux. La Trousse Bactériologique, N° 505, mesure 13 × 8.5 × 4 cm., tandis que la Trousse 'Soloid' pour l'Essai du Sang, N° 506, mesure 11 × 9 × 4 cm.

(Voir aussi le Prix-Courant à la fin du volume)

PRÉPARATION DE SOLUTIONS

Les solutions des couleurs d'aniline, par leur tendance à se décomposer, étaient une source perpétuelle d'ennuis.

Cet inconvénient se trouve supprimé par les Colorants 'Soloid' pour la Microscopie, qui comprennent des teintures d'aniline de première qualité et permettent de préparer les solutions en petites quantités au fur et à mesure des besoins. De cette façon on évite le gaspillage et l'on est certain d'obtenir de bons résultats.

Quelques colorants s'emploient en solutions alcooliques et il est peut-être utile d'indiquer les différents alcools ordinairement employés.

L'alcool absolu ne contient pas moins de 99 pour cent en poids d'alcool éthylique pur: $C^2H^5.OH$.

L'alcool à degré spécifié, par exemple, à 50 degrés centésimaux, représente un mélange avec l'eau qui renferme la proportion indiquée, c'est-à-dire, pour 100 volumes, 50 volumes d'alcool éthylique pur.

Les proportions d'eau distillée ou d'alcool pur qu'il faut employer pour obtenir des solutions saturées de certaines teintures d'usage courant sont indiquées dans le tableau suivant. Il faut toujours bien pulvériser le produit 'Soloid' avant de le faire dissoudre.

Colorants	Produit 'Soloid' de 0 gr. 10 de matière colorante	Eau en gr.	Alcool en cmc.
Bleu de Méthylène, pur	1	7	7
Bleu Thionine ,,	1	5	10
Brun Bismarck ,,	1	7	7
Fuchsine basique ,,	1	10	2.5
Hématoxyline ,,	1	2	1
Violet Gentiane ,,	1	7	7
Violet Méthyle ,,	1	5	1







REPRODUCTIONS EN COULEURS EXACTES DE PRÉPARATIONS COLORÉES AVEC LES COLORANTS 'SOLOID' POUR LA MICROSCOPIE







REPRODUCTIONS EN COULEURS EXACTES DE PRÉPARATIONS COLORÉES AVEC LES COLORANTS "SOLOID" POUR LA MICROSCOPIE

L'alcool méthylique est une substance pure, $CH^3.OH$, obtenue en purifiant l'esprit de bois du commerce. L'alcool méthylique du commerce, non purifié, ne peut pas servir à la préparation d'Éosine-Azur et des solutions colorantes de Louis Jenner, de Leishman ou de Romanowsky.

Des dilutions aqueuses des teintures décrites dans le tableau à page 130 contenant de 5 à 10 pour cent des solutions saturées, conviennent très bien pour coloration ordinaire. Toutefois, on peut, au moyen des Colorants 'Soloid,' préparer diverses autres solutions pour usage immédiat d'après les indications suivantes :

Éosine

Pour faire une solution d'éosine pour emploi général, faire dissoudre un produit 'Soloid' dans 20 cmc. d'alcool à 50°, ce qui équivaut à une solution à 0,5 pour cent.

Bleu de Méthylène Alcalin de Lœffler

Faire dissoudre un produit de Bleu de Méthylène 'Soloid' dans 7 cmc. d'alcool absolu et ajouter 25 gr. d'eau distillée additionnée d'une goutte de solution de potasse caustique à 5 pour cent.

Bleu de Méthylène (Coloration Neisser)

Pulvériser un produit 'Soloid' de Bleu de Méthylène, y ajouter 2 cmc. d'alcool à 96°, puis 100 cmc. d'une solution aqueuse d'acide acétique à 5 pour cent (acide acétique glacial 5 cmc., eau 95 cmc.).

Brun Bismarck (Coloration Neisser)

Faire dissoudre un produit 'Soloid' dans 50 gr. d'eau distillée, ce qui donnera une solution à 0,2 pour cent.

Violet Gentiane d'Aniline

Faire dissoudre un produit de Violet Gentiane 'Soloid' dans 7 cmc. d'alcool absolu et ajouter 63 cmc. d'une solution fraîchement filtrée et saturée d'huile d'aniline dans l'eau distillée.

Violet Gentiane au Phénol

Faire dissoudre un produit Violet Gentiane 'Soloid' dans 7 cmc. d'alcool absolu, ajouter 63 cmc. d'une solution aqueuse d'acide phénique au 100°.

Fuchsine Phéniquée de Ziehl

Mettre dans 3 cmc. d'alcool absolu un produit de Fuchsine 'Soloid' bien pulvérisé, ajouter 22 cmc. d'une solution aqueuse d'acide phénique à 5 pour cent ; bien agiter le mélange et filtrer avant de s'en servir.

Liqueur de Gram

Faire dissoudre un produit 'Soloid' du réactif A dans 10 gr. d'eau distillée, ajouter un produit 'Soloid' du réactif B, et lorsque la dissolution est complète, additionner d'eau distillée pour porter le volume à 15 cmc.

Bleu Thionine Phéniqué

Faire dissoudre un produit de Bleu Thionine 'Soloid' dans 100 cmc. d'une solution aqueuse d'acide phénique à 5 pour cent.

Bleu Borax-Méthylène

Faire dissoudre un produit de Bleu Borax-Méthylène 'Soloid' dans 10 gr. d'eau distillée.

Éosine-Azur (pour la méthode Giemsa)

Faire dissoudre un produit d'Éosine-Azur 'Soloid' dans 5 cmc. d'un mélange à parties égales (en volume) d'alcool méthylique *pur* et de glycérine.

Bleu d'Éosine-Méthylène (Teinture de Louis Jenner)

Faire dissoudre un produit 'Soloid' dans 10 cmc. d'alcool méthylique *pur*.

Teinture Romanowsky (Modification de Leishman)

Faire dissoudre un produit de Teinture Romanowsky 'Soloid' dans 10 cmc. d'alcool méthylique *pur*.

Teinture Triple Biondi-Ehrlich-Heidenhain

Faire dissoudre un produit de Teinture Triple d'Ehrlich 'Soloid' dans 25 gr. d'eau distillée ; ajouter un produit de Fuchsine Acide 'Soloid' dissous dans 2 gr. d'eau distillée et mélanger. La solution est alors prête à servir et se conserve bien.

Hæmalum

Chaque produit 'Soloid' renferme hématéine 0 gr. 005 et alun d'ammoniaque 0 gr. 25. Pour préparer le colorant, triturer un produit 'Soloid' d'Hæmalum avec 5 gr. d'eau distillée et faire bouillir quelques minutes, ce qui donne une solution claire.

Teinture Toison pour le Sang

Pour la conservation des hématies et pour faciliter leur numération.

Dissoudre un produit 'Soloid' dans 3 cmc. de glycérine et 16 gr. d'eau distillée et filtrer immédiatement avant l'emploi.

Cette solution agit simplement comme diluant ; elle empêche la formation de caillots et conserve aux hématies leur aspect naturel. En même temps, les noyaux des leucocytes se colorent légèrement de façon que leur identification et leur numération deviennent plus facile ; toutefois cette méthode ne permet pas de distinguer les différentes espèces.

En ce qui concerne le bleu de méthylène alcalin de Lœffler, le violet gentiane d'aniline et la fuchsine phéniquée de Ziehl, les solutions préparées comme ci-dessus ne représentent qu'approximativement les formules originales, mais la complication de fractions étant évitée, la préparation des solutions se fait avec plus de facilité, sans aucunement diminuer l'utilité du procédé.

PRÉPARATION DE SPÉCIMENS

Préparation du Sang.—On retire le sang le plus souvent du lobe de l'oreille. Après avoir bien nettoyé et séché la peau avec du coton stérilisé, faire une piqûre avec une aiguille de chirurgie stérilisée, de manière à faire perler une goutte de sang. L'asepsie est essentielle si l'examen doit porter sur les micro-organismes, mais tant de précautions ne sont pas indispensables si l'on ne vise que les hématies. Puis, se servant d'une lame porte-objet, toucher cette goutte de sang avec le milieu de l'un des bords. Placer ensuite ce bord enduit de sang en contact avec une lamelle qui aura été préalablement nettoyée et dégraissée avec du savon noir, chauffée à la flamme d'une lampe à alcool et conservée dans l'alcool jusqu'au moment de l'emploi. Quand le sang s'est étendu dans l'angle formé par les deux lames *(voir l'illustration)*, faire glisser rapidement la première sur la seconde en *poussant*. Le sang s'étalera et formera ainsi un enduit uniforme. Faire sécher l'enduit rapidement en agitant doucement la lamelle dans l'air. Quand le colorant est dissous dans l'alcool méthylique *pur* (comme dans les procédés de Jenner ou de Leishman), il est inutile de fixer la préparation, le colorant agissant en même temps comme fixateur.



Manière d'obtenir un enduit de sang

Enduits Épais. Pour la recherche de filaires on peut employer avec avantage des enduits épais de sang, qu'on obtient en plaçant au milieu d'une lamelle plusieurs gouttes de sang et en les réunissant au moyen d'une aiguille en une seule goutte d'une surface d'environ 1 cm. carrés. Quand l'enduit est sec, placer la lame verticalement dans l'eau, de façon que l'hémoglobine, en se dissolvant, tombe au fond. Puis sécher la préparation et la colorer comme à l'ordinaire, ou verser sur la lame encore humide le colorant mélangé avec de l'eau. Dans ce dernier cas, il faudra faire le lavage ultérieur dans une coupe d'eau et non pas sous un robinet.

Spécimen de Sang.—Un spécimen de sang pour la numération des hématies et la teneur en hémoglobine peut être retiré du lobe de l'oreille et recueilli dans une des pipettes capillaires qui se trouvent dans la Trousse Bactériologique 'Soloid.' L'extrémité de la pipette, qui pour cela doit être brisée, est ensuite scellée de nouveau à la lampe.

Pus.—On procède pour le pus comme pour le sang. S'il est très épais, il est bon de le diluer avec de l'eau pour obtenir une couche plus mince et plus uniforme.

Crachats.—Placer une petite quantité de crachat sur une lame porte-objet : (lorsqu'on recherche le bacille de Koch, il faut choisir deux ou trois des petites masses jaunâtres, s'il y en a) ; placer une autre lame par-dessus, frotter les deux surfaces en contact jusqu'à ce que le spécimen soit bien écrasé et mélangé ; puis séparer les deux lames. Faire passer alors une lamelle propre sur une des lames de manière à y laisser adhérer une couche mince ; laisser sécher à l'air et fixer en passant trois fois la lamelle, l'enduit tourné vers le haut, à travers la flamme d'une lampe à alcool ou d'un bec de Bunsen. L'enduit est alors prêt à être coloré.

On peut également préparer les crachats sur des lames microscopiques ordinaires à condition d'obtenir une couche mince et uniforme. Les différentes manipulations se trouvent ainsi facilitées.

Préparation d'Enduits d'Exsudats de la Gorge.—On se sert d'un tampon de coton stérilisé dont une provision se trouve dans la Trousse Bactériologique 'Soloid' ; ou bien on prépare un tampon analogue en tenant un peu de coton ou un morceau d'éponge (au moyen de pinces stérilisées) dans l'eau bouillante pendant quelques minutes. On obtient un enduit d'exsudat en passant le tampon sur la surface d'une lame porte-objet et l'on opère ensuite comme avec les crachats.

Frottis d'un Organe ou d'un autre Tissu.—Racler avec l'un des bords d'une lamelle la surface d'un tissu fraîchement coupé pour recueillir un peu de matière ; puis continuer comme pour un enduit de sang, mais en ayant soin de *tirer* et non de pousser pour faire glisser sur la lame horizontale la lame inclinée *(voir l'illustration)*. On étiquettera la préparation en écrivant, au crayon gras, sur une partie propre de la lamelle, les initiales, le nom ou le numéro du patient. On pourra étiqueter les enduits de sang d'une façon plus permanente qu'au crayon gras, en faisant un enduit d'une surface plus étendue que celle absolument nécessaire et en écrivant sur l'enduit à l'une des extrémités avec un crayon ordinaire avant le fixage. Après examen, on pourra, si on le désire, écrire à l'autre extrémité de la lamelle le nom du parasite observé. Il sera bon de tracer au crayon gras sur le verre une ligne à chaque extrémité de l'enduit, ou même à travers l'enduit s'il est très étendu en surface ; ceci dans le but d'empêcher le colorant de s'étendre où il ne serait pas utile, et aussi de diminuer la quantité de colorant à employer et le risque de dessiccation par évaporation.

Manière d'obtenir un frottis de tissu

MODES DE COLORATION

Méthode de Gram (pour préparations lamellaires).—Après avoir séché l'enduit sur la lamelle, verser dessus quelques gouttes d'alcool absolu et agiter doucement pendant deux minutes.

Enlever le surplus d'alcool au moyen d'un morceau de buvard, et sans sécher la préparation y verser quelques gouttes de violet gentiane d'aniline ou de violet gentiane au phénol. Agiter de nouveau légèrement pendant trente secondes, sécher au papier buvard et immerger dans la solution iodée pendant une minute.

Retirer la préparation de la solution iodée, sécher au papier buvard et laver à l'alcool jusqu'à ce que la préparation ne se décolore plus. Enlever immédiatement l'alcool en agitant la lamelle doucement dans de l'eau ; sécher entre des feuilles de buvard. Recolorer pendant trente secondes dans une solution d'éosine à 0,5 pour cent dans l'alcool à 50ᶜ ou en appliquant la solution alcoolique de brun Bismarck à 0,5 pour cent pendant dix secondes.

Méthode de Gram modifiée par Nicolle.—Préparer le spécimen par le procédé de Gram et colorer par le violet gentiane au phénol pendant cinq minutes, sécher et immerger dans la solution iodée pendant trente secondes. Décolorer dans l'acétone (1 partie) et l'alcool (2 parties) jusqu'à ce que le liquide n'enlève plus de couleur, puis laver à l'eau pendant quelques secondes. La recoloration se fait à l'éosine ou au brun Bismarck, comme il est indiqué ci-dessus.

On dit qu'un organisme est "Gram-positif" s'il retient le violet gentiane quand on le traite par la méthode de Gram. Il en est ainsi des organismes tels que : *Streptococcus* (y compris *Pneumococcus*), *Staphylococcus*, *B. diphtheriæ*, *B. anthracis*, *B. tetani* et *Actinomyces*. Un organisme est "Gram-négatif" quand, décoloré par l'alcool, il montre seulement la teinte du second colorant employé. Tels sont les : *Gonococcus*, *Méningococcus*, *B. typhosus*, *B. coli*, *B. choleræ*, *B. pestis*, *Micrococcus melitensis*.

Coloration Préliminaire et Examen des Enduits préparés.—Un procédé fort commode et utile consiste à monter la préparation après fixation dans une goutte de bleu de méthylène Lœffler, et à enlever avec soin le surplus de colorant avec du papier buvard. Les microbes, les noyaux de cellules, etc., se colorent très facilement et se distinguent nettement bien que montés dans la teinte elle-même, qui, dans une préparation si mince, apparaît presque blanche par contraste.

Bacille de Koch.—Préparer et fixer un enduit de crachat par le procédé décrit plus haut. Placer la lamelle, l'enduit tourné vers le haut, et en laisser dépasser un bord, sur le bout d'une lame de métal d'environ 1 cm. de largeur et 20 cm. à 25 cm. de longueur ; verser avec soin la solution de fuchsine phéniquée sur l'enduit, de manière à le couvrir entièrement sans déborder sur le métal. Tenir la lame de métal sur la flamme à une distance telle que la solution fume légèrement ; continuer à chauffer pendant au moins cinq minutes, en prenant grand soin de ne pas porter à l'ébullition. Retirer alors la lamelle avec les pinces, enlever le surplus de colorant avec du papier buvard, bien laver sous le robinet ou dans une grande cuvette d'eau et immerger pendant dix secondes dans une solution d'acide chlorhydrique à 25 pour cent. Bien laver dans l'alcool méthylique jusqu'à ce que celui-ci ne se colore plus, rincer à l'eau et, tenant toujours la lamelle avec les pinces, faire tomber goutte à goutte une solution aqueuse de bleu de méthylène sur l'enduit, le laissant se colorer pendant trente secondes. Laisser égoutter le bain colorant et laver vivement à l'eau. Presser avec précaution entre deux feuilles de papier buvard et faire sécher à l'air chaud au-dessus de la flamme, à une distance telle que la main puisse supporter aisément la chaleur. Monter au baume de xylol. Les bacilles de Koch prennent une coloration rouge avec la fuchsine, et les autres microbes qui peuvent se trouver dans les crachats sont teints en bleu. (*Voir aussi* Crachats, *page* 133.)

Bacille de la Diphthérie.—Cet organisme se colore facilement avec plusieurs des teintures d'aniline, le bleu de méthylène alcalin de Lœffler s'employant très couramment. La coloration de Neisser pour le diagnostic se pratique de la manière suivante : Préparer un enduit avec une jeune culture faite sur du sérum de sang ou sur le milieu Lœffler, et fixer par la chaleur. Colorer avec la solution Neisser de bleu de méthylène (*page* 131) deux ou trois secondes. Rincer dans l'eau, et recolorer pendant trente secondes avec une solution aqueuse à 0,2 pour cent de brun Bismarck (*voir page* 131). Les granules du bacille de la diphthérie se colorent en bleu vif et le protoplasma en brun très faible. L'apparence présentée est d'une grande valeur, car elle permet de distinguer cet organisme des autres bacilles diphthéroïdes.

Gonocoque.—Préparer un enduit de pus sur une lame propre, sécher et fixer de la manière déjà décrite pour les préparations de sang. Colorer alors la couche par le procédé de Gram décrit à la *page* 133. Laver à l'alcool, puis colorer pendant cinq minutes dans une solution aqueuse de brun de Bismarck. Les gonocoques ne conservent pas la coloration par la méthode de Gram, mais retiennent le brun de Bismarck. Faire sécher la couche et examiner au moyen d'un objectif à immersion dans l'huile ; les gonocoques, s'ils existent, se trouvent colorés en brun à l'intérieur des cellules du pus,

tandis que les streptocoques et staphylocoques sont teints en violet, étant "Gram-positif."

Pneumonie (DIPLOCOCCUS PNEUMONIÆ). — Pour reconnaître la présence du pneumocoque préparer un mince enduit de crachat, de salive ou de sang. Faire sécher cet enduit et le fixer par la chaleur. On peut aussi traiter ensuite par la capsule colorante de Welch de la manière suivante : Laisser refroidir la préparation et y verser quelques gouttes d'acide acétique glacial que l'on égoutte aussitôt ; puis, sans laver, traiter à plusieurs reprises par le violet gentiane d'aniline. En dernier lieu, laver la préparation dans une solution de chlorure de sodium au 100e et l'examiner à l'état humide, ou bien séchée et montée au baume. Le coccus aura pris une coloration foncée et sera entouré d'une capsule teinte en violet très pâle.

Influenza (Grippe) (BACILLUS INFLUENZÆ).—Préparer un enduit de crachat ou bien appliquer sur une lamelle une couche d'une culture faite sur le milieu au sérum de Lœffler. Colorer pendant trente secondes avec de la fuchsine phéniquée étendue de dix fois son volume d'eau. Les bacilles se présenteront sous forme de petits corps colorés aux extrémités, pour la plupart dans le cytoplasme des leucocytes.

Tétanos (BACILLUS TETANI).—Préparer un enduit de pus et colorer au moyen d'un quelconque des colorants d'aniline à l'eau, car ces bacilles se colorent facilement avec tous. La méthode de Gram peut également s'employer.

Charbon (BACILLUS ANTHRACIS).—Si l'on soupçonne la pustule d'être maligne, préparer des enduits d'exsudat ou des raclures de tissu et les colorer par le bleu de méthylène de Lœffler ou par le procédé de Gram. La présence de gros bacilles granulaires ayant des extrémités carrées ou légèrement concaves, souvent disposés en chaînes, et retenant le colorant de Gram, sera concluante.

Méningite Cérébro-spinale (DIPLOCOCCUS MENINGITIDIS INTRACELLULARIS).—On prépare des enduits, par le même procédé que pour le sang, avec le liquide retiré par ponction lombaire. On peut les colorer avec le bleu thionine phéniqué, et aussi par la méthode de Gram, en procédant comme pour le gonocoque. Le *Diplococcus meningitidis* ne retient pas le colorant de Gram ; le *Micrococcus catarrhalis* non plus. Pour ce dernier organisme *voir : British Medical Journal*, 26 août 1905.

Choléra (SPIRILLUM CHOLERÆ OU COMMA BACILLUS).—Étaler en couche mince et uniforme sur une lame une des mucosités blanchâtres qui se trouvent dans les matières fécales, dessécher, et fixer par la chaleur (comme pour le sang et les crachats) ; colorer pendant cinq minutes environ au moyen d'une solution aqueuse diluée de fuchsine ou de violet de méthyle ; bien laver à l'eau, faire sécher et monter au baume.

Peste.—Faire un enduit avec la matière fournie par ponction de la glande, ou avec un crachat ; fixer comme à l'ordinaire, puis colorer avec n'importe quelle teinture ordinaire d'aniline. La coloration des extrémités (coloration polaire) pourra très bien s'effectuer si l'on colore avec un excès de fuchsine phéniquée, lavant ensuite une partie du colorant avec de l'alcool méthylique.

Fièvre Récurrente (SPIRILLUM OBERMEIERI).—Le spirille peut être coloré dans un enduit de sang par le procédé de Louis Jenner, de Leishman, de Giemsa ou bien encore, après fixation à l'alcool, par n'importe quel colorant aqueux. Ces organismes ne prennent pas le colorant de Gram.

Malaria (PLASMODIUM MALARIÆ).—Les enduits de sang ou de pus se colorent par le procédé de Leishman *(voir page 136)*.

Treponema pallidum.—Cet organisme, qui apparaît dans les diverses lésions syphilitiques, réagit au colorant de Leishman. On prépare un enduit d'exsudat ou de sécrétion provenant de la lésion ; on peut aussi opérer sur un enduit de sang. Le colorant peut s'employer soit suivant le procédé même de Leishman, soit en modifiant ce procédé *(voir The Lancet*, Londres, 19 août 1905, *page* 522*)*.

Le parasite de la malaria et le *Treponema pallidum* peut également être coloré par la méthode de Giemsa, laquelle est facilement applicable avec le concours de l'Eosine-Azur 'Soloid.' Après avoir préparé la solution d'après les instructions données à la *page* 131, la diluer avec de l'eau distillée dans la proportion de 1 à 4. Fixer dans l'alcool absolu, et colorer pendant un quart d'heure, en faisant poser la lamelle, l'enduit tourné vers le bas, sur deux fines baguettes de verre. Laver ensuite dans l'eau distillée, égoutter avec du papier à filtrer, sécher et monter au baume du Canada.

Les corps nucléaires et malariques se colorent en rouge vif ou violet, tandis que le *Treponema pallidum* se colore en violet-pourpre plus pâle.

Teigne.—Tremper les tronçons de cheveux dans l'éther ou dans le chloroforme pour trois à cinq minutes afin de les dégraisser. Faire adhérer leur extrémité à la lame au moyen d'un peu de paraffine fondue. La peau, après immersion dans l'éther, peut se fixer au moyen d'un peu d'albumine d'œuf comme pour les coupes. Verser alors sur la lame quelques gouttes d'une solution de potasse caustique à 10 pour cent et l'y laisser de cinq à dix minutes. Puis bien laver à l'éther, monter dans une solution de glycérine a 50 pour cent et rechercher sous un fort grossissement les fils mycéliens et les spores. Si la préparation doit être colorée, ne pas employer la potasse. Après avoir degraissé, colorer par le procédé de Gram, ne laissant cependant la préparation que de cinq à dix minutes dans le violet gentiane phéniqué et trente secondes dans la solution iodée. Laver d'abord dans un mélange d'huile d'aniline et de xylol, puis dans le xylol pur, et finalement monter au baume.

Enduits de Sang et de Pus.—Les enduits préparés d'après le procédé indiqué plus haut peuvent se colorer de plusieurs manières :

1. ÉOSINE ET BLEU DE MÉTHYLÈNE

Mettre les enduits en contact avec une solution à 0,5 pour cent d'éosine pendant une minute, laver à l'eau, sécher entre deux feuilles de papier buvard et finalement colorer quelques secondes au moyen du bleu de méthylène de Lœffler. Ces opérations se feront plus facilement si, saisissant la lamelle avec les pinces, on l'agite doucement dans un bain colorant contenu dans un verre de montre ou, mieux encore, dans un flacon peu profond à large embouchure.

2. PROCÉDÉ ÉOSINE-BLEU DE MÉTHYLÈNE COMBINÉ (Romanowsky)

Méthode de Louis Jenner.—Laisser sécher la préparation à l'air et, sans la fixer, faire tomber le colorant dessus, puis recouvrir d'un verre de montre. Laisser agir le colorant pendant cinq minutes, laver à l'eau distillée (ou bien dans de l'eau de pluie filtrée, si l'on n'a pas d'eau distillée), jusqu'à ce que la coloration vert de l'enduit soit remplacée par une teinte rouge-éosine ; sécher d'abord entre deux feuilles de papier buvard, puis à l'air et enfin monter au baume du Canada.

Procédé de Leishman.—Se servir de la solution d'éosinate de bleu de méthylène dans l'alcool méthylique comme colorant et fixateur combinés. En verser sur l'enduit quelques gouttes, qu'on laisse agir une minute. Un volume double d'eau distillée ou d'eau de pluie est alors ajouté au fluide colorant ; on mélange, et on laisse agir pendant environ cinq minutes, après quoi on lave avec de l'eau distillée ou de l'eau de pluie, et on sèche à l'air. On peut alors examiner la préparation avec un objectif à immersion dans l'huile, en laissant tomber l'huile de cèdre directement sur l'enduit. Si le spécimen est monté au baume, il se décolore assez rapidement à moins qu'on n'emploie un baume neutre spécial. Pour la coloration du *Treponema pallidum* ou *Treponema pertenue*, on doit laisser la préparation au moins pendant une demi-heure en contact avec le mélange de colorant et d'eau.

Par les temps chauds, il est préférable d'effectuer la coloration en mettant la lamelle dans une cuvette Pietri dont une feuille humide de papier buvard garnira le fond. Après avoir fait le mélange de colorant et d'eau sur l'enduit, on recouvre la cuvette et on laisse l'action s'effectuer pendant le temps voulu.

3. COLORATION TRIPLE BIONDI-EHRLICH-HEIDENHAIN

Préparer les enduits par le procédé habituel et les fixer en chauffant pendant trente minutes jusqu'à une température de 110°–120° C. On peut se passer de l'étuve en se servant d'une lame de cuivre dont on chauffe l'une des extrémités. Pour trouver le point exact de la lame de cuivre où il faut placer la préparation pour la fixer, on verse sur cette lame quelques gouttes de xylol ; le point voisin de l'endroit où le xylol commence à bouillir est celui où l'on mettra la préparation, en prenant soin de tourner l'enduit vers le bas.

On colore pendant deux à dix minutes les préparations ainsi fixées, on les lave et on les fait sécher. Il ne faut employer que du baume du Canada neutre ou de l'huile de cèdre pour le montage.

Les préparations, quand elles sont bien fixées et bien colorées, ont à l'œil nu une coloration orange ou rouge orangé ; celles de ces préparations qui n'ont pas été suffisamment chauffées sont de couleur rouge sombre ou brun rougeâtre, tandis que celles qui ont été surchauffées ont une teinte pâle jaune citron.

Dans les préparations réussies, les érythrocytes doivent avoir une couleur orange ; les granules des cellules neutrophiles polymorphonucléaires et des myélocytes neutrophiles doivent être d'un ton violet, et les granules acidophiles des cellules polymorphonucléaires d'un ton rouge brique.

Les noyaux de ces cellules sont d'un bleu-verdâtre à nuances variées, tandis que les granules basophiles des cellules dites "mastzellen" ne sont pas colorés et renferment un noyau vert pâle. Les noyaux des lymphocytes se colorent légèrement en bleu verdâtre, mais le cytoplasme prend une teinte pâle rose ou grise.

Dans le sang morbide, les noyaux des érythroblastes se colorent en noir verdâtre.

Démonstration des Micro-organismes sans le concours de la coloration. (Méthode de Burri, à l'Indian-ink).—Un enduit est préparé de la manière courante sur une lamelle, où on le laisse sécher. Une petite goutte d'Indian-ink est déposée à l'une des extrémités de l'enduit et régulièrement répandue par-dessus en une pellicule mince, et ce, en tirant le bord d'une autre lamelle légèrement le long. Alternativement, on peut mêler une goutte du fluide à examiner à une goutte d'Indian-ink sur la lamelle et de ces gouttes mêlées un enduit peut être préparé de la manière courante. Dans chacun des cas la préparation est séchée à l'air. Les organismes apparaissent en blanc sur fond noir.

Montage des Préparations colorées.—Dans les cas où il est important de préserver la couleur des préparations colorées, les substances acides ne sont pas utilisables, mais la paraffine pure, liquide, ou 'Paroleine' a été trouvée très utile à cet usage.

Après le montage, le verre protecteur doit être scellé avec un ciment neutre.

La 'Paroleine' a été également recommandée comme huile d'immersion, de préférence à l'huile de cèdre. Elle ne se trouble pas, se garde sous tous les climats, n'est pas volatile, et les objectifs, que d'ailleurs elle ne détériore pas, peuvent en être aisément débarrassés.*

PRÉPARATION DE MILIEUX DE CULTURE

La préparation de milieux de culture bactériologique en faibles quantités a toujours été difficile et peu satisfaisante. On passe autant de temps à préparer quelques tubes d'un milieu donné que pour en préparer une grande quantité, et la perte résultant du filtrage de faibles quantités est relativement très grande.

---

* *Journal of Pathology and Bacteriology*, XIII., 1908

Des expériences effectuées dans les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques ont montré qu'un grand nombre des milieux ordinaires de culture, après avoir été desséchés et conservés longtemps dans cet état, peuvent regagner leur consistance et apparence premières lorsqu'on les fait dissoudre dans la quantité d'eau voulue. C'est principalement dans l'intérêt du médecin et du bactériologiste qui ont besoin d'employer seulement quelques tubes de culture, et à intervalles éloignés, que les Milieux de Culture 'Soloid' ont été mis sur le marché.

Ces produits sont secs et portatifs, ils se conservent indéfiniment dans des conditions convenables, et permettent de préparer en une heure, sans laboratoire ni appareil, un tube ou une plaque du milieu nourricier désiré. Pour cette raison, ils sont très utiles aux médecins qui n'ont pas de laboratoire à leur disposition. Pour ce qui regarde les médecins de la Santé publique dans les districts ruraux, les expéditions médicales, les camps sous les tropiques, les produits 'Soloid' satisfont à un besoin longtemps éprouvé.

Pour préparer un tube de culture, tout ce qui est nécessaire est un tube à essai scrupuleusement propre, un tampon de ouate, de l'eau et les produits 'Soloid.' On doit procéder de la manière suivante :

Mettre dans une tube à essai un produit 'Soloid' du milieu nourricier nécessaire, puis ajouter la quantité d'eau voulue (de l'eau distillée est préférable, sans être absolument nécessaire); boucher ensuite le tube avec de la ouate stérilisée à la flamme ; le plonger dans un bain-marie d'eau bouillante jusqu'à un niveau supérieur à celui de l'eau contenue dans le tube ; continuer l'ébullition pendant trente minutes au moins.

Faire tourner le tube de temps en temps pour aider à la dissolution du produit. La dissolution est aussi plus rapide si l'on pulvérise le produit avant de l'introduire dans le tube.

Une ébullition d'une durée de trente minutes tuera tous les organismes, excepté les spores résistantes, et sera suffisante pour les besoins d'un diagnostic ordinaire, etc.

Quand il est essentiel d'obtenir un milieu absolument stérile, il faut chauffer le tube dans l'eau bouillante pendant vingt minutes trois jours de suite.

La coagulation peut s'effectuer avec les tubes en position verticale ou oblique ; on peut aussi, comme à l'ordinaire, en verser le contenu sur des plaques.

Les produits suivants sont émis pour la préparation de milieux de culture :

Bouillon de Culture 'Soloid.'—Fournit un milieu fluide dont l'incubation a lieu à n'importe quelle température nécessaire pour la culture des micro-organismes qu'on étudie. Très utile pour la culture de bactéries que l'on désire examiner vivantes au moyen de la méthode dite de "la goutte pendante." Tous les organismes ordinaires, soit pathogéniques, soit non pathogéniques, croissent bien dans ce milieu.

Dans un tube à essai de grandeur moyenne dissoudre un produit 'Soloid' dans 5 gr. d'eau (préférablement distillée); puis continuer suivant la méthode indiquée plus haut.

Agar-Agar Nourricier 'Soloid.'—Très important milieu sur lequel croissent tous les organismes ordinaires pathogéniques et non pathogéniques.

On le prépare en ajoutant de l'agar-agar (hydrate de carbone fourni par une algue japonaise) au bouillon de bœuf peptonisé. Ce milieu, quoique parfaitement clair et transparent lorsqu'il est fluide, devient légèrement opalescent après solidification.

Dans un tube à essai dissoudre un produit 'Soloid' dans 5 gr. d'eau environ, comme il est indiqué plus haut. Puis laisser refroidir le tube dans la position voulue. Pour obtenir des cultures sur plaques, on refroidit l'agar jusqu'à une température de 45° C., on y dépose ensuite l'organisme et on verse le fluide sur les plaques. On opère ainsi parce qu'une température supérieure à 45° C. pourrait tuer les organismes.

Agar-Agar aux Sels de Bile (MacConkey), marque 'Soloid.'—Milieu solide très utile pour isoler de l'eau, du lait, de l'urine, des matières fécales, etc. les bactéries intestinales telles que les bacilles coli, ceux de la typhoïde et de la dysenterie. Ce milieu contient des sels de bile, de la peptone, de la lactose et du rouge neutre. Les sels de bile empêchent la croissance de presque toutes les bactéries sauf celles d'origine intestinale. Les colonies de *Bacillus coli* sont rouges, les autres sont incolores. La température d'incubation recommandée est de 42° C.

Liste des Colorants 'Soloid' pour la Microscopie *(voir Prix-Courant à la fin du volume).*

NUMÉRATION DES HÉMATIES

Pour la numération des hématies, il faut employer une dilution du sang faite avec une grande précision ; actuellement, il n'existe pas de méthode plus commode ou plus exacte pour obtenir une quantité connue de sang et pour la diluer dans la proportion voulue, que par l'emploi de l'appareil Thoma-Zeiss.

La profondeur de la chambre compteuse, au-dessous de la lamelle en position, est de 0 mm. 1 et les 16 grandes carrés dessinés sur la lame comprennent une étendue d'un millimètre carré.

Chaque carré est divisé en 25 carrés plus petits ; il s'ensuit que, lorsqu'on a posé la lamelle, chacun des petits carrés a une capacité de $\frac{1}{10} \times \frac{1}{16} \times \frac{1}{25} = \frac{1}{4000}$ millimètre cube. Donc le nombre d'hématies par millimètre cube est de :

$$\frac{A \times C \times 4000}{B} \text{ quand}$$

A = nombre d'hématies comptées.
B = nombre de petits carrés comptés.
C = coefficient de dilution du sang.

DÉTERMINATION DE L'INDICE OPSONIQUE

Le procédé est quelque peu compliqué et nécessite une expérience considérable si l'on veut obtenir des résultats satisfaisants. En voici les différentes phases :

1. **Récolte du sang à examiner.**—Plusieurs indices opsoniques sont pris en même temps chaque fois que c'est possible, pour économiser le temps. On obtient le sang en pratiquant une piqûre à l'extrémité du doigt ou au lobe de l'oreille, et il est alors aspiré dans un petit tube de Widal ou de Wright, et les extrémités en sont scellées. Du sang normal est mis dans un autre tube. Les divers tubes sont numérotés avec un crayon gras afin de pouvoir être identifiés, et le sang est ainsi laissé jusqu'à ce que le sérum s'en soit séparé ; pour éviter toute perte de temps, on peut placer les tubes dans le centrifugeur.

2. **Préparation des leucocytes lavés.**—On fait couler quelques gouttes de sang du doigt dans un tube contenant une solution de citrate de soude à 1½ pour cent, dans la proportion de 2/3 de solution et 1/3 de sang. On mélange le contenu sans secouer et on le passe au centrifugeur pendant deux ou trois minutes, jusqu'à ce que tous les globules soient au fond du tube ; on enlève au moyen d'une pipette le liquide qui surnage, on ajoute de la solution saline normale aux corpuscules et l'on mélange de nouveau. Puis on repasse au centrifugeur et l'on enlève le liquide qui surnage, de sorte que seulement les globules rouges et blancs restent dans le tube. A l'aide d'une pipette de verre, on les mélange et ils sont alors prêts à être employés.

3. **Préparation de l'émulsion bactérienne.**—Elle est généralement préparée d'avance. La culture des organismes sur l'agar est enlevée et émulsionée avec une solution saline. Dans quelques cas il faut broyer la culture pour l'émulsionner et pour enlever les agglomérations de bactéries. Cela est particulièrement nécessaire avec le bacille de la

tuberculose. Elle est alors passée au centrifugeur pour enlever toute agglomération de bactéries et l'émulsion qui surnage mise dans un tube à part et parfaitement diluée ; on doit l'examiner comme une préparation ordinaire d'enduit pour s'assurer qu'elle est exempte d'agglomération de bactéries. La solution employée pour l'émulsion est la solution saline normale à 0,85 pour cent ; excepté dans le cas du bacille de Koch et des organismes ne prenant pas la coloration de Gram, où la solution saline employée est à 1½ pour cent.

4. **"Procédant aux essais."**—Les trois constituants étant maintenant obtenus, on procède à la réaction. On choisit une pipette à longue tige, et l'on y aspire en quantités égales et dans l'ordre suivant : des leucocytes lavés, de l'émulsion bactérienne et du sérum à éprouver. On rejette le contenu de la pipette sur une lamelle, on le mélange bien et, après l'avoir de nouveau aspiré dans la pipette, on scelle à la flamme l'extrémité de celle-ci, en ayant soin de ne pas soumettre le contenu à l'action de la flamme, et l'on place la pipette dans un appareil à incubation à 37° C. Pour la majeure partie des bactéries, la période d'incubation doit être de quinze à vingt minutes, mais dans les cas de certains organismes, tels que ceux de la typhoïde et du choléra, qui sont sujets à une prompte reproduction, une incubation de huit à dix minutes est préférable.

5. **Préparation de l'enduit.**—Enlever les pipettes opsoniques de l'appareil à incubation, en briser l'extrémité scellée ; faire tomber un peu du contenu sur une lame, bien mélanger et placer une goutte de mélange sur une autre lame. En employant le bord légèrement concave d'une lamelle brisée, on peut obtenir un enduit dans lequel tous les globules blancs seront repoussés à l'un des bouts. On fixe cet enduit et on le colore avec le colorant convenable.

6. **Comptage.**—On compte le nombre de micro-organismes contenus dans 100 leucocytes polymorphonucléaires. Le nombre moyen d'organismes par leucocytes donne l'indice phagocytique. On doit s'arranger pour que l'épaisseur de l'émulsion de bactéries donne un comptage facile des organismes dans chaque leucocyte ; ainsi dans le cas d'une émulsion de tubercules, on vise à obtenir une moyenne de 1,5 à 2 bacilles par leucocyte ; dans le cas de staphylocoques, de 3 à 8.

Le nombre d'organismes dans 100 leucocytes du sérum normal, divisé par le nombre dans 100 leucocytes du sérum du patient, donne l'indice opsonique.

LE SÉRODIAGNOSTIC DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE PAR LE PROCÉDÉ DE WIDAL

Voici une description de la manière de procéder :

On se sert d'une pipette de sûreté à longue tige sur laquelle, à un centimètre de l'extrémité, se trouve une marque. On aspire, jusqu'à cette marque, de la solution saline normale qu'on transporte sur une lamelle de verre ; répète la même opération sur six autres lamelles ; puis on aspire dans la pipette un volume du sérum à éprouver, qu'on décharge sur une huitième lamelle. On aspire alors dans la pipette un autre volume de sérum, qu'on mélange à la solution saline sur une des sept lamelles précédentes ; le sérum sur cette lamelle est donc à un degré de dilution de 1 : 2 ; on transporte avec la pipette un volume de cette dilution sur une autre des lamelles portant la solution saline, de sorte qu'après mélange le degré de dilution est devenu 1 : 4. On continue de la même manière jusqu'à la sixième lamelle, dont on rejette un volume. On se trouve avoir alors une série de sept lamelles portant chacune un volume de sérum, dont les degrés de dilution vont en décroissant ainsi : 1 : 1, 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16, 1 : 32 et 1 : 64, plus un volume de solution saline normale pour le contrôle.

On aspire alternativement dans la pipette huit volumes d'une émulsion épaisse de bacilles de typhoïde provenant d'une culture sur agar et on les transporte sur chacune des huit lamelles, en commençant par celle portant la solution saline, et on mélange bien chacun de ces volumes avec le liquide de chaque lamelle, de sorte que maintenant la concentration a été réduite de moitié sur chaque plaque, le sérum non dilué étant devenu de ce fait une

solution à 1 : 2 et ainsi de suite. On aspire enfin dans la pipette ces huit volumes, l'un après l'autre dans leur ordre croissant, en commençant par la plaque de contrôle et en séparant chaque volume par une bulle d'air ; puis on scelle à la flamme l'extrémité.

La réaction est positive si l'agglutination se produit immédiatement dans la dilution de degré 1 : 2 et en une demi-heure dans celle de 1 : 64.

Le réaction est douteuse si dans la demi-heure l'agglutination se produit seulement dans la dilution de 1 : 32. L'agglutination s'observe à l'œil nu par l'aggrégation des organismes en masses. Il faut bien distinguer l'agglutination de la simple sédimentation. Dans le cas de sédimentation, quand on renverse la pipette, les organismes, se diffusant dans le liquide, le rendent trouble et opalescent ; tandis que, dans le cas d'agglutination, la masse d'organismes tombe d'une seule pièce à travers le liquide sans le troubler.

RÉACTION DE BORDET-GENGOU

Cette réaction bio-chimique est basée sur les récents travaux d'Ehrlich relatifs à la pathologie et la cytolyse humorales. Voici la description de la manière de procéder pour la fièvre typhoïde, les mêmes principes s'appliquant aussi à beacuoup d'autres conditions pathologiques.

Cinq substances sont nécessaires pour effectuer l'épreuve :

1. **Antigène Typhoïde.**—Consistant en une émulsion d'organismes de typhoïde morts.

2. **Sérum d'un patient atteint de typhoïde.**—Ce sérum doit être chauffé pendant une demi-heure à une température de 55-56° C., pour que tout complément se trouve détruit. Ce sérum contient l'ambocepteur.

3. **Sérum du sang d'un cobaye.**—Employé pour fournir le complément. Le cobaye est choisi parce que son sang est particulièrement riche en complément.

4. **Sérum hémolytique.**—Obtenu par immunisation d'un lapin avec les globules rouges d'un autre animal, par exemple le mouton. Le sérum de lapin pourra alors dans l'expérience causer l'hémolyse des globules de mouton. On chauffe ce sérum pour en détruire le complément.

5. **Une suspension de globules de mouton dans une solution saline normale.**

On met les trois premiers éléments dans un tube à essai sec et stérilisé que la Fig. A (*page* 142) représente.

On secoue bien le mélange, qu'on place dans un incubateur à 37° C. pendant une heure ; au bout de ce temps, le complément se sera fermement uni à l'ambocepteur typhoïde et à l'antigène typhoïde représenté ici par l'émulsion d'organismes de typhoïde (C, *page* 142).

On ajoute alors au mélange le sérum hémolytique convenablement dilué et les globules de mouton. La Fig. B (*page* 142) en représente le diagramme.

On secoue bien maintenant le mélange des cinq éléments ; il en résulte un liquide opaque rouge. On soumet alors le tube pendant deux heures à une température de 37° C.

On constatera que les globules rouges sont tombés au fond du tube et n'ont pas subi d'hémolyse, le liquide qui surnage restant incolore (C, *page* 142).

Pour le contrôle, on peut préparer un autre tube, en remplaçant le sérum du patient atteint de typhoïde par celui d'un individu sain, et l'on effectue la même incubation ; après quoi on remarquera que les globules rouges sont désintégrés, leur matière colorante rendant toute la solution d'un rouge transparent. Dans ce cas, l'hémolyse a été complète, parce que le complément, non uni à l'ambocepteur et l'antigène typhoïdes, peut se fixer au sérum hémolytique et aux globules rouges, constituant ainsi un système hémolytique (D, *page* 142).

Diagrammes représentatifs des Réactions Bordet-Gengou et Wassermann

Fig. A

Fig. B



Fig. C

Fixation de Complément — Pas d'Hémolyse

Réaction avec un Sérum Infecté (Typhoïde ou Syphilitique)

Fig. D



Antigène non attaché — Système Hémolytique

Réaction avec le Serum Normal, pour Contrôle

Clé expliquant les divers Diagrammes

1. Antigène—*typhoïde* (consistant en une émulsion d'organismes typhoïdes), ou *syphilitique* (consistant en substance lipoïde)
2. Ambocepteur typhoïde ou syphilitique
3. Complément (provenant de Cobaye)
4. Ambocepteur hémolytique (dans le sérum hémolytique)
5. Globules de Mouton

Réaction de Wassermann

Wassermann a appliqué la réaction de Bordet-Gengou au diagnostic de la syphilis.

On obtient l'antigène en broyant le foie ou la rate d'un fœtus syphilitique riche en tréponèmes. L'ambocepteur syphilitique se trouve dans le sérum obtenu en tirant un peu de sang ou de fluide cérébro-spinal à un patient souffrant de la syphilis, non seulement dans les périodes primaire, secondaire et tertiaire, mais aussi dans les parasyphilides tels que : tabes, tabo-parésie et paralysie générale.

Les autres éléments de l'épreuve sont du même ordre que ceux décrits par Bordet et Gengou, à savoir : complément, sérum hémolytique et globules rouges—en fait, le système hémolytique complet.

Voici une description de la méthode Wassermann et Meier* :

Le matériel pour l'anticorps est le sérum ou le fluide cérébro-spinal du patient qu'il s'agit d'éprouver. On le prive de son complément, c'est-à-dire on le rend inactif en le chauffant à 56° C.

On prépare l'antigène avec le foie d'un fœtus syphilitique ; l'organe doit être aussi frais que possible.

Comme source de complément, du sérum frais de cobaye est employé.

Pour le sérum hémolytique, on emploie le sérum d'un lapin immunisé par des injections successives de globules rouges du sang de mouton. On rend inactif ce sérum en le chauffant à 56° C.

Les globules de sang proviennent du mouton, et sont mis en suspension dans une solution saline normale après avoir été préalablement débarrassés du sérum par des lavages répétés et des passages au centrifugeur. On doit prendre du sang frais pour que l'hémoglobine ne sorte pas d'elle-même des globules rouges.

Voici comment on procède pour l'épreuve :

On mélange ensemble en proportions convenables l'antigène (c'est-à-dire l'extrait de foie syphilitique), l'anticorps (sérum à éprouver) et le complément (sérum de cobaye), et l'on soumet le mélange à l'incubation. On mélange aussi les globules de sang de mouton et le sérum de lapin immunisé. On réunit les deux mélanges, on les garde deux heures dans l'appareil à incubation et on les observe de temps en temps.

On effectue en même temps une expérience de contrôle avec du sérum normal en place de sérum syphilitique.

Si le cas soumis au diagnostic est réellement un cas de syphilis, il ne se produit pas d'hémolyse, parce que l'extrait de virus syphilitique, c'est-à-dire l'antigène, s'est combiné avec le corps immunisé qui se trouve dans le sérum du patient, fixant en même temps le complément du sérum de cobaye, de façon qu'il ne reste pas de complément capable de produire l'hémolyse (C, *page* 142).

Dans l'expérience de contrôle il y aura hémolyse complète, car il se trouve beaucoup de complément à l'état libre prêt à se combiner avec les globules rouges et l'ambocepteur du sérum immunisé (D, *page* 142).

Diverses modifications de la Réaction de Wassermann ont été introduites mais aucune a donné la même satisfaction que celle décrite ci-dessus.

DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE

Ancienne Méthode de Koch

Cette méthode est basée sur la réaction fébrile prodnite par l'injection hypodermique de Vieille Tuberculine.

La première dose pour les adultes qu'on soupçonne d'être tuberculeux doit consister en 0 cmc. 0002 de Vieille Tuberculine. Pour des enfants

---

* *Berliner Klin. Woch.* 1907, N° 51

au-dessus de cinq ans la moitié suffit, et le quart, ou moins encore, pour les enfants au-dessous de cet âge.

Si le patient est tuberculeux, une réaction s'ensuivra dans les 48 heures, comme l'indiquera une élévation de température de 0°,7 C., accompagnée d'un malaise général et de troubles constitutionnels. Si aucune réaction ne se produit, on administre, le troisième jour, une seconde dose de 0 cmc. 001 ; et, si aucune réaction ne se montre après cela, on administre une troisième injection de 0 cmc. 005. L'absence répétée de réaction conduit à la conclusion que le malade n'est pas tuberculeux.

Voici des méthodes plus récentes :

1. **Cuti-réaction (von Pirquet).**—Quand on scarifie légèrement la peau d'un tuberculeux, comme pour la vaccination ordinaire, et qu'on applique de la tuberculine à la surface scarifiée, une réaction s'opère dans les vingt-quatre heures et se manifeste par l'apparition d'une papule d'un rouge éclatant. Parfois l'infiltration se fait sur une surface plus étendue, ou une éruption vésiculaire se produit autour de la région primitive. Ces marques disparaissent au bout de quelques jours, laissant une petite région pigmentée qui peut persister pendant des semaines.

Von Pirquet recommande l'emploi de la tuberculine originale de Koch pour cet essai.

2. **Cuti-réaction (Moro).**—Pour cette réaction on emploie une pommade composée en parties égales de "Vieille Tuberculine" et de lanoline. On frotte environ 0 gr. 10 de cette pommade sur la poitrine ou l'abdomen, et dans les 24 à 48 heures une éruption de petites papules rouges ou de gros nodules apparaît chez les tuberculeux. Dans quelques cas il y a aussi une dermatite diffuse. L'éruption disparaît en quelques jours.

3. **La Réaction Ophthalmique (Wolff-Eisner et Calmette).**—C'est une modification de la cuti-réaction. Si l'on place entre les paupières, à l'aide d'un compte-gouttes, une quantité minime de tuberculine diluée, il se produit dans les six heures une réaction marquée sur la conjonctive des sujets tuberculeux. L'œil devient rouge et les paupières se gonflent plus ou moins. Dans quelques cas il se produit de l'enflure plus œdémateuse, et il peut même y avoir un exsudat fibrineux.

Calmette recommande une solution préparée par la précipitation de tuberculine dans l'alcool ; on sèche le précipité et on en dissout 10 mgr. dans 1 cmc. d'eau stérilisée ou de solution saline normale. D'autres recommandent une solution d'une concentration de moitié ou même moindre. La Tuberculine Ophthalmique 'Tabloid' consiste en 0 gr. 0002 de Vieille Tuberculine purifiée et sèchée.

Une très bonne méthode d'opérer consiste à employer un produit de Tuberculine Ophthalmique 'Tabloid' et un produit de Contrôle 'Tabloid.' Sous la paupière inférieure de l'œil droit on place le produit Ophthalmique 'Tabloid' et semblablement sous la paupière de l'œil gauche le produit de Contrôle (composé de la même base inerte mais sans tuberculine). Dans l'examen et la comparaison des yeux 8, 12, 24 et 48 heures après, si l'on constate une hyperhémie de l'œil droit, le patient est tuberculeux. L'emploi du produit de contrôle est pour rendre l'épreuve plus sûre. Par la comparaison des réactions qui s'opèrent dans les deux yeux, le diagnostic se fait avec plus d'exactitude que par la méthode ordinaire d'instillation de la tuberculine dans l'un des yeux seulement.

On a rapporté des cas où l'instillation de tuberculine dans l'œil aurait amené des symptômes fâcheux : conjonctivites graves, ulcérations de la cornée et opacités permanentes. La méthode n'est donc pas sans danger.

L'épreuve ne devrait jamais être appliquée à des patients ayant une affection quelconque de l'œil et l'on devra éviter dans tous les cas une seconde application, les résultats étant illusoires et quelquefois dangereux.

Liste des Tuberculines pour le Diagnostic
(Voir la section du Prix-Courant à la fin du volume)

Liste des Tuberculines pour Essais de Laboratoire
(Voir la section du Prix-Courant à la fin du volume)

TABLE OBSTÉTRIQUE

On doit compter à partir du premier jour de la dernière période menstruelle

Janvier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Janvier
Octobre	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7				*Novembre*
Février	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							Février
Novembre	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5							*Décembre*
Mars	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Mars
Décembre	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5				*Janvier*
Avril	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					Avril
Janvier	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4					*Février*
Mai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Mai
Février	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7				*Mars*
Juin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					Juin
Mars	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6					*Avril*
Juillet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Juillet
Avril	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7				*Mai*
Août	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Août
Mai	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7				*Juin*
Septembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					Septembre
Juin	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7					*Juillet*
Octobre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Octobre
Juillet	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7				*Août*
Novembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					Novembre
Août	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6					*Septembre*
Décembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Décembre
Septembre	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7				*Octobre*

LES VOYAGES EN BALLON, FAMEUX

Équipés avec les Premiers-Secours 'Tabloid'

(1) Le ballon d'Andree, "l'Aigle," avec lequel cet explorateur fit sa dernière tentative malheureuse, pour atteindre le Pôle Nord.

(2) L'aérostat de Wellman, construit dans le but d'atteindre le Pôle Nord.

(3) Le ballon du *Daily Graphic* (d'Angleterre en Russie), avec lequel Turner, Maitland et Gaudron accomplirent le record Britannique de distance en ballon, en 31½ heures couvrant 1797 km.

(4) L'aérostat transatlantique "America" de Wellman. Wellman et ses compagnons couvrirent la distance de 1610 km. dans cet aérostat, mais furent entrainés hors de leur route, et sauvés en mer.

ÉQUIPEMENTS MEDICAUX HISTORIQUES

LE vingtième siècle entrevoit le genre humain sur la lisière de la subdivision entre hommes de l'air et habitants terrestres. L'"émotion" d'une envolée — la sensation de la "tranquillité extra-terrestre" — ceci nous est décrit noblement par le Lieutenant Conneau, qui nous dit que seuls l'océan et les montagnes conservent leur immensité dans les vastes solitudes de l'air.



L'homme est un pygmée, et ses œuvres les plus considérables, ses machines, ses fabriques et ses villes, ne sont que des jouets dans un pays de rêves. L'aviateur aperçoit le train couvrant lentement l'espace, la ruche active de l'industrie humaine, la régularité presque pathétique des petits espaces qui sont formés par les plaines, les jardins et les bordures de haies. Il traverse les Apennins, et voit sous lui les nuages se colorer de teintes. rouges feu au soleil matutinal.

En s'approchant de Rome, il aperçoit dans le lointain "quelque chose de significatif," baigné dans le soleil radieux — c'est le dôme de St.-Pierre, qui s'élève grandiose et majestueux de la brume vaporeuse de la campagne romaine.

Rostand dépeint joliment le Souverain Pontife, à peine réveillé, ouvrant une fenêtre de l'oratoire et accordant sa bénédiction à cet homme oiseau. . . .

"*Pulvis es*" . . . dit l'Église au fragile mortel . . .

Poussière périssable, autrement dit, mais matière compacte de chair, d'os et de nerfs, bravant les risques et périls de l'air, et ayant besoin d'être équipée contre les

PHARMACIES PORTATIVES 'TABLOID' EMPLOYÉES EN AFRIQUE

(1) Ceinture pour médicaments portée par le Capitaine Stairs pendant tout le cours de son expédition au Katanga.

(2) La boite pharmaceutique fameuse, "l'Arrière-Garde," utilisée pendant les voyages de feu Sir H.-M. Stanley.

(3) Ce qui fut dégagé des ruines du bâtiment de la Mission Bandawe, après sa démolition par la foudre; le contenu non endommagé fut utilisé après plus de dix années qui s'ensuivirent.

(4) Appartint à E.-G. Glave. Fournie pour un voyage concernant la question si importante de l'esclavage dans l'Afrique Centrale. Cette boite fut détériorée plus tard dans l'incendie de l'Exposition de Bruxelles en 1910.

(5) Transportée par le Capitaine Thomas Stevens lors de son expédition dans l'Afrique Orientale à la recherche de Stanley.

(6) Boite emportée par feu Sir H.-M. Stanley lors de la délivrance d'Émin-Pacha et dans le cours d'autres expéditions.

(7) Anciennement la propriété du Docteur Percy Rendall, Principal Officier Médical de l'Administration Britannique de l'Afrique Centrale.

(8) Pharmacie transportée par Frank Muxworthy, le conducteur fameux de caravanes en Afrique, pendant trois voyages à travers l'Uganda. Cette boite fut endommagée par la suite, lors de l'incendie de l'Exposition de Bruxelles, 1910.

(9) La dernière boite pharmaceutique fournie à Émin-Pacha.

dangers. La trousse que l'on trouvera décrite à la *page* 147 pourrait être portée par un oiseau. L'homme de l'air n'a besoin d'équipements que d'un volume relativement bien peu plus considérable.

Le contraste existant entre celle-ci et les anciennes trousses et armoires médicinales est flagrant, mais la comparaison, par contre, est difficile, voire même impossible à établir. Nous nous trouvons à l'ère d'évènements importants, dont il est malaisé de prévoir la portée. Il est indubitable, cependant, que les desiderata des aviateurs se trouvent exaucés en ce qui est des premiers secours, ainsi d'ailleurs que l'ont été ceux de tous les autres pionniers en matière d'exploration ou d'aventure ; et l'histoire de leurs équipements est brièvement relatée ici. Ce qui a été fait pour l'aviation est décrit aux *pages* 163 à 176.

En Afrique

Comme par le passé, l'Afrique conserve encore ses secrets avec un bilan d'une centaine de morts—non plus désormais avec la Magie, avec le concours de laquelle la science d'alors était appliquée par d'ingénieux moyens, mais par les affligeantes frontières de ses maladies. Ce sont des barrières que la science nouvelle nous enseigne à franchir, tout en restant indemnes.

Mais l'Afrique est vieille. Le savoir aussi fut sien. Cela nous est révélé par la longue histoire des anciennes dynasties de l'Égypte toute puissante, notamment par les bibliothèques d'Alexandrie et les splendeurs de Carthage, à jamais perdues. Quelques bribes oubliées de l'histoire ont cependant revues le jour, par exemple, les papyrus d'Ebers, qui furent découverts placés entre les jambes d'une momie et qui renferment cent-dix pages couvertes de prescriptions pour toutes sortes de maladies, certaines recettes remontent à une antiquité incalculable.

Les secrets de l'Afrique

A Kahun, près des pyramides d'Illahun, fut trouvé, en 1889, le plus ancien document connu se rattachant à la médecine et à la pharmacie. Il date de la XIIème Dynastie, mille ans avant l'ère d'Exodus. A Thèbes, la boîte pharmaceutique de la Reine Mentu-Hotep revit le

jour—c'est un coffret en bois massif, orné d'hiéroglyphes, parmi lesquels on reconnait le cartouche royal et la figure d'un chacal accroupi.

A l'intérieur se trouve un support de papyrus tressé, sur lequel sont placés d'élégants vases en albâtre contenant diverses racines médicinales, et une cuillère de bois, dont le manche sculpté représente la tête d'Hathor. Malgré sa grande dimension, les produits médicinaux qu'elle renfermait étaient des plus ordinaires.

Il y a loin de Mentu-Hotep à Stanley. Cependant, avec Stanley commence la démonstration pratique de l'utilité des trousses médicinales modernes. Des siècles s'étaient écoulés et le cœur de l'Afrique restait encore à découvrir. L'homme blanc vint—Park, Burton, Livingstone, Stanley. Toujours homme pratique en affaires, Stanley remarque la difficulté et son remède.

L'arrivée de l'homme blanc

"Quand je pense [disait-il au cours d'une de ses conférences] à la mortalité effroyable qu'éprouvèrent l'expédition du Capitaine Tuckey (1816), celle du Niger (1841), lorsque je tente de me représenter les souffrances de Burton et de Speke et celles que moi-même j'éprouvai dans mes deux premières expéditions, je songe avec effroi que ces souffrances et cette mortalité n'étaient dues en grande partie qu'à la défectuosité de l'approvisionnement en médicaments. Ce souvenir à lui seul me fait frémir encore."

Tuckey, Burton et Speke

Et à une date ultérieure, faisant part de son désir de diminuer les souffrances des explorateurs africains, il prolonge sa pensée :

"Comment et par qui ce désir pourrait être satisfait, je ne le savais pas ; lorsque je fis la connaissance de MM. Burroughs Wellcome & Cie. A peine eus-je vu leurs produits et leurs installations, que je compris que mon désir était enfin exaucé.

"Dans mes dernières expéditions j'étais heureusement muni de tous les médicaments nécessaires pour mes compagnons européens et mes porteurs nègres ; ces médicaments, merveilleusement bien préparés et se présentant d'une manière élégante, étaient renfermés dans la plus petite pharmacie portative que j'emportai jamais en Afrique."

Émin-Pacha

Le rapport de Stanley rappelle Émin-Pacha, qui fut nommé gouverneur de l'Afrique Équatoriale par Gordon. La dernière trousse médicale qui lui fut fournie émanait de Burroughs Wellcome & Cie Dans une rapport pathétique, il écrit :

"La pharmacie portative que vous m'avez expédiée est complète sous tous les rapports. Inutile de vous dire qu'une telle découverte fit bondir mon cœur de joie. Un objet de ce genre ne peut être fabriqué que par des artistes achevés. Si quelque malheureux, soulagé de douleurs intenses, prononce des bénédictions, c'est à vous qu'elles seront adressées.

"J'aurais voulu m'étendre un peu sur la valeur intrinsèque de cette pharmacie, mais en étant empêché par la maladie, je vous prie de me croire, etc."

Dr Emin Pasha

Cette boîte fut enlevée par les Arabes lors de l'assassinat d'Émin-Pacha en 1892, et elle ne fut reconquise qu'après la bataille de Kasongo, par la Baron Dhanis, commandant les troupes de l'État-Libre du Congo.

Elle fut volée peu après par les indigènes et ensuite retrouvée près de Kenia, dans la région des nains de l'Arouwhimi, et renvoyée à Burroughs Wellcome & Cie.

Une autre pharmacie fameuse, dénommée "l'Arrière-Garde," resta pendant près de quatre années dans les forêts marécageuses de la région de l'Arouwhimi et fut plus d'une fois submergée par les eaux du fleuve. Le restant du contenu de cette pharmacie fut examiné par l'analyste officiel du journal *The Lancet*, lorsqu'elle fut rapportée à Londres, et il fut constaté, d'après le rapport établi, que les Médicaments 'Tabloid' avaient conservé toute leur activité.

Les principaux médecins des grandes Compagnies Anglaises, engagées dans des entreprises commerciales en Afrique, ont pu soumettre les Équipements et Médicaments 'Tabloid' à des essais complets et bien définis.

Leurs rapports sont, par conséquent, d'un intérêt particulier.

Extrait d'un rapport de R.-F. Rand, M.D., F.R.C.S., Principal Officier Médical de la British South Africa Company :

" Nous avons employé journellement pendant l'occupation de ce pays deux pharmacies portatives munies de Médicaments 'Tabloid.' Je crois qu'il est de mon devoir de vous dire que les services que nous rendirent ces équipements furent inestimables. Étant portatifs, compacts et toujours sous la main dans une expédition en marche, ils nous ont épargné, aux malades et à moi, beaucoup de temps et de tourments. Je ne connais pas de pharmacies portatives aussi admirablement adaptées aux besoins des voyageurs.

Extrait du rapport de feu W.-H. Crosse, M.D., M.R.C.S., Principal Officier Médical de la British Royal Niger Company :

" Tous ces Médicaments 'Tabloid' étant excellents, il m'est impossible de donner la préférence à l'un plutôt qu'à l'autre. Ils sont tous de la plus haute qualité, d'un dosage précis et dignes de confiance. Pour le voyageur, ces préparations sont tout simplement inestimables, et je conseillerais vivement à tous ceux qui partent pour les pays tropicaux de se munir d'un approvisionnement complet de produits 'Tabloid.' "

Ce récit pourrait être continué ainsi indéfiniment ; c'est en somme l'histoire des équipements médicaux de chaque expédition de châtiment et de chaque explorateur depuis bientôt trente ans. Un simple extrait peut nous suffire, tel le rapport du correspondant spécial de guerre attaché à *The Lancet*, un vétéran ayant nombre campagnes à son actif :

" C'est avec la plus grande satisfaction que je certifie avoir moi-même, pendant plusieurs années, donné et vu ordonner, par les médecins de la Marine et de l'Armée, les préparations 'Tabloid' de MM. Burroughs Wellcome & Cie, pendant les campagnes du Soudan, de l'Ashanti, du Bénin et celles plus récentes de l'Afrique du Sud. Je ne puis m'empêcher de mentionner leur supériorité distincte et bien marquée sur les préparations incommodes d'autrefois. Elles sont beaucoup plus portatives, agréables au goût, et moins sujettes à absorber l'humidité pendant leur emploi dans les changements brusques de climat ;

Nombre de campagnes

elles sont toujours d'un dosage rigoureux et, ce qui est plus important, conservent leur supériorité beaucoup plus longtemps que tout autre produit connu de moi.

"Les balances et les poids ne sont pas nécessaires. On se passe même d'un pharmacien, et un temps precieux est économisé par le malade et le docteur, attendu que le dispensaire—*multum in parvo*, en effet—peut être porté par le médecin à la main, ou placé devant lui à bicyclette ou à cheval. Pendant ma récente excursion dans les régions aurifères de l'Ashanti, Afrique Occidentale, dans les conditions les plus dures et les plus pénibles, on put toujours compter sur ces Médicaments 'Tabloid.' Burroughs Wellcome & Cie méritent d'être félicités pour les progrès scientifiques qu'ils ont accomplis dans la réforme de la pharmacie."

Le véritable problème de l'Afrique

Si, de nos jours, disparaît progressivement, devant la marche de la Science, le barbarisme de cette multitude d'êtres humains qui existe encore dans les profondeurs les plus ténébreuses de l'Afrique, il est évident qu'une part est due aux armes de précision 'Tabloid' avec lesquelles sont combattues et la maladie et la mort.

En Voyage et en Exploration

Le voyageur est né

Le véritable voyageur est né. L'appel de l'au-delà vibre dans ses veines. Cela peut être simplement l'émotion d'une âme inquiète de cieux inconnus, d'horizons nouveaux et plus vastes, ou alors la secrète envie d'un esprit réfléchi pour quelque chose d'inconnu de là-bas derrière la montagne. . . . . Certains sont devenus explorateurs par esprit de mécontentement, d'autres pour acquérir la renommée. En tous cas le résultat a toujours été décisif.

De l'un d'entre eux—un homme de conceptions et de principes—Lord Morley a très bien dit, qu'il était "un homme plein de pitié, possédant le sens de la justice, et d'un caractère bien trempé, . . . n'ayant suscité de malveillance nulle part."

PHARMACIES PORTATIVES 'TABLOID' EMPLOYÉES EN VOYAGE ET EN EXPLORATION

(1) Équipement médical de Harry de Windt, employé lors de ses voyages en Sibérie Orientale.

(2) Trousse emportée par l'ex-Président Roosevelt dans sa récente expédition de chasse et de tir dans l'Afrique Orientale.

(3) Trousse portée par Lionel Decle dans son voyage de trois ans du Cap à l'Uganda (9650 km.).

(4) Mrs. Bishop (Miss Isabella Bird) fait l'eloge de cette trousse pharmaceutique dans son livre qui décrit ses longs voyages.

(5) L'équipement médical porté par Mrs. French Sheldon, F.R.G.S., lors de son expédition aventureuse à travers tout l'État-Libre du Congo.

(6) Double de la boite médicale que prit Sir Sven Hedin dans son voyage unique de l'autre côté de l'Himalaya jusqu'au cœur du Thibet.

(7) Trousse portée par R.-L. Jefferson, F.R.G.S., lors de sa fameuse randonnée à bicyclette jusqu'à Khiva.

(8) Trousse de poche portée par J.-E. Budgett Meakin.

(9) Trousse médicale portée par Julius Price, attaché à l'*Illustrated London News*, pendant plus de 48 000 km. sous divers climats.

C'est au Sir Sven Hedin que ces paroles s'adressent, à celui qui a parcouru, pendant la période de deux longues années, les solitudes du Thibet, découvrant la "Grande Montagne-Palissade" Transhimalayenne, et explorant le "Toit du Monde." Son fidèle compagnon était une Pharmacie Portative 'Tabloid,' qui fut pour lui d'un bon secours pendant les maladies et les souffrances, et même dans le cours des sentiers fleuris de la diplomatie. A Shigatse, il en fit son cadeau d'amitié au Tashi-Lama. On doit être redevable à MM. Macmillan, les éditeurs du Sir Sven Hedin, de la permission de citer son récit de l'incident :

Le "Toit du Monde"

> "Après une conversation de deux heures, je fis un mouvement pour le quitter ; mais, me priant de me rasseoir, il me dit : 'Non, restez encore.' C'était le moment de présenter mon cadeau. Quand l'élégante pharmacie anglaise, retirée de son enveloppe de soie, fut ouverte et exposée à ses yeux, il manifesta son admiration et un très vif intérêt. Il fallut tout lui expliquer ; la seringue hypodermique, dans son coquet étui d'aluminium avec tous ses accessoires, attira particulièrement son attention. Deux des moines chargés du service médical vinrent plusieurs jours de suite à notre camp pour traduire en thibétain le contenu des diverses boîtes 'Tabloid' et le mode d'emploi des médicaments."

Un incident pittoresque de ce genre n'est pas un fait unique dans les annales de Burroughs Wellcome & Cie.

La Mission Américaine d'Abyssinie en 1903, la première mission Américaine envoyée dans cet empire, trouva la boîte pharmaceutique 'Tabloid' "une ressource de haute valeur dans les cas de difficultés. Elle était portée à dos d'homme par un domestique dévoué, dont le nom une fois traduit voulait dire 'Esclave de la Sainte-Trinité'" — rapporte un membre de la mission.

En Abyssinie

Le Professeur Garnier aussi, qui étudia de très près les mœurs des gorilles dans les forêts du Gabon, parle affectueusement de sa "petite pharmacie 'Tabloid'" comme "un trésor plus sacré que ma carabine."

PHARMACIES PORTATIVES 'TABLOID' EMPLOYÉES EN TEMPS DE GUERRE

(1) L'une des ceintures médicinales employées pendant la guerre Hispano-Américaine ; (2) L'une des boîtes pharmaceutiques employées pendant la campagne de l'Ashanti, 1895-96 ; (3) G.-W. Steevens a emporté cet équipement pendant nombre de voyages et de campagnes ; (4) Les restes de nombre de batailles et de sièges précédemment la propriété du correspondant de guerre W. Maxwell ; (5) Des trousses de ce type furent employées par les Contingents Coloniaux Britanniques pendant la guerre Sud-Africaine ; (6) Une partie de l'équipement médical de la Grèce lors de la guerre avec la Turquie, 1897 ; (7) Double de l'équipement médical de Bennet Burleigh, correspondant de guerre ; (8) Une des pharmacies portatives employées pendant l'expédition au Dongola ; (9) Un double de l'équipement employé pendant la campagne Anglo-Égyptienne dans le Soudan ; (10) Une trousse pharmaceutique spécialement désignée portée par les Volontaires Impériaux de la Cité de Londres, dans la guerre Sud-Africaine ; (11) Une boîte particulièrement designée, faisant partie d'une portion de l'équipement médical fourni entièrement par Burroughs Wellcome & Cie pour le navire-hôpital *Maine* ; (12) Trousse pharmaceutique de poche portée par le Général B. Viljoen pendant toute la durée de la guerre Sud-Africaine ; (13) Ceinture médicinale employée pendant la campagne du Bénin.

L'ex-Président Roosevelt, dans son expédition en Afrique, emporta avec lui des Équipements Médicaux et Photographiques 'Tabloid,' et, selon le rapport du Lieutenant-Colonel Mearns, ils furent trouvés "très satisfaisants et utiles." Beaucoup d'autres voyageurs de distinction, y compris Glave, Muxworthy, Rendall, le Capitaine Stairs, W.-S. Caine, Mrs. Bishop (Miss Isabella Bird) et Mrs. French Sheldon, ont été équipés avec des Boîtes Pharmaceutiques 'Tabloid,' et ont tous émis des rapports favorables parce qu'elles sont aisément transportables et dignes de confiance.

Quelques voyageurs fameux

En Temps de Guerre

Les Équipements Médicaux 'Tabloid' sont aussi indispensables aux expéditions militaires que les rations de secours. Leur compacité et leur concentration, le minimum de place qu'ils occupent et leur commodité réunissent heureusement les principales exigences pour le transport. De plus, ils possèdent des avantages marqués, tels que ceux de pureté, d'utilité et de précision dans leur dosage.

Ce dont l'homme a le plus besoin en temps de guerre est d'abord la nourriture, et ensuite les soins apportés à ses blessures et à ses maladies. Un axiome bien connu dans les opérations militaires dit que les maladies tuent plus d'hommes que les balles de l'ennemi. Bien des horreurs de la guerre de Crimée auraient pu être évitées si les remèdes 'Tabloid' avaient été employés.

L'homme et les Premiers-Secours 'Tabloid'

Depuis plus d'une génération, dans toutes les campagnes importantes, on s'est servi des Équipements Médicaux 'Tabloid.' Il est toutefois impossible d'en parler ici en détail. Pendant la guerre entre les États-Unis et l'Espagne, l'utilité des Trousses 'Tabloid' fut mise à l'épreuve, et confirmée à la fois à Cuba et aux Philippines. Dans les campagnes de Kitchener, de l'Omdurman à l'Afrique du Sud, elles ont joué une part proéminente.

L'équipement médical du navire-hôpital *Maine* était particulièrement intéressant ; il fut organisé par les

PHARMACIES PORTATIVES 'TABLOID'
EMPLOYÉES DANS LES EXPÉDITIONS POLAIRES

(1) Trousse médicale de l'Expédition Nationale Antarctique Écossaise.

(2) Boite employée pendant les trois années d'exploration de l'Expédition Arctique Jackson-Harmsworth.

(3) Double de la pharmacie portative transportée par l'Expédition Polaire du Duc des Abruzzes.

(4) Fraction de l'équipement médical complet fourni par la maison Burroughs Wellcome & Cie pour l'Expédition Nationale Antarctique, 1901.

(5) Andree, lors de sa tentative historique pour atteindre le Pôle Nord en ballon, portait une trousse de ce genre.

(6) Pharmacie portative utilisée par Wellman lors de sa tentative pour atteindre le Pôle Nord en dirigeable.

(7) Portée pendant le voyage effectué jusqu'au sommet du Mont-Érébus et pendant le voyage "Farthest South" de l'Expédition Antarctique Britannique, 1907-9.

(8) Trousse portée par le groupe qui atteint le Pôle Sud Magnétique. Expédition Antarctique Britannique, 1907-9.

(9) Double de la boite qui formait une partie de l'équipement de Peary lors de sa découverte historique du Pôle Nord.

(10) Ceinture fournie à Nansen pendant son voyage "Farthest North."

dames Américaines pour la campagne Sud-Africaine, et entièrement fourni par Burroughs Wellcome & Cie.

"La totalité de l'équipement médical fut fourni par MM. Burroughs Wellcome & Cie.

"L'une des pharmacies portatives fournie par cette maison est en cuir travaillé à la main, dessiné par Monsieur Henry S. Wellcome. Sur le panneau supérieur se trouvent les drapeaux entrelacés de la Grande-Bretagne et des États-Unis, les portraits de la Reine Victoria, de George Washington et du Président McKinley, et l'Aigle des États-Unis ainsi que le Lion Britannique sont aussi représentés. Sur le devant et autres panneaux se trouvent figurés des emblêmes symbolisant l'union fraternelle liant les peuples Anglais et Américains. Sur la boîte il y a le vers de Keble : 'Aucune distance ne brise les liens du sang,' et la phrase de Bayard : 'Nos cousins d'Outre-Mer.'"

De nos jours, aucune guerre ne semble être complète sans qu'elle ait ses correspondants de guerre—dès lors il n'existe pas de meilleurs juges sur les équipements que ces derniers. La liste de journalistes éminents qui ont été munis de Trousses 'Tabloid' comprend, parmi d'autres noms fameux, ceux de Bennet Burleigh, Frederick Villiers, René Bull, Julius Price et William Maxwell, feu G.-W. Steevens et nombre d'autres. En ce qui concerne l'Équipement 'Tabloid' de son mari, Mrs. Steevens rapporte :

"Il le prit partout avec lui—à la guerre Greco-Turque, deux fois au Soudan, aux Indes et pour la dernière fois (bien réapprovisionnée par vos soins) dans l'Afrique du Sud."

Dans les Explorations Arctiques et Antarctiques

Les Trousses Médicales et les Pharmacies 'Tabloid' ont toujours été d'une valeur inestimable auprès des explorateurs de l'Arctique et de l'Antarctique et elles se trouvent associées aux noms d'Amundsen, Peary, Scott, Nansen, Shackleton, Jackson-Harmsworth, Duc des Abruzzes et de beaucoup d'autres. Les ceintures et autres Équipements Médicaux 'Tabloid' fournis à Nansen pour son voyage "Farthest North," et ceux qui ont servi à l'Expédition Arctique Jackson-Harmsworth, ceux du

Les Trousses 'Tabloid' couvrent le monde entier d'un Pôle à l'autre



NAVIRES AYANT PRIS PART AUX EXPÉDITIONS ARCTIQUES DE NANSEN, DU DUC DES ABRUZZES, DE JACKSON-HARMSWORTH ET DE PEARY, ÉQUIPÉS AVEC LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 'TABLOID'

Le "Fram," figuré dans le coin en haut à droite, est également le navire de l'heureuse Expédition Antarctique d'Amundsen *(voir ci-contre)*, pendant laquelle il créa le record "du plus au Sud" pour un navire.

Contre-Amiral Peary au Pôle Nord, font aujourd'hui partie de la collection d'équipements historiques de Burroughs Wellcome & Cie. "Hearty thanks, splendid indeed," rapporta l'enthousiaste Norvégien, Nansen.

L'un des huit tubes de produits 'Tabloid' transportés au Pôle Nord par Peary fut présenté par ce célèbre explorateur à Burroughs Wellcome & Cie lors de son retour. Dans un rapport expédié d'Étah, Groenland, Peary écrivit : "Les fournitures et Trousses Médicales 'Tabloid' de Burroughs Wellcome & Cie ont fait preuve d'une valeur incontestable." Dans un rapport précédent il émet "son appréciation sur la compacité remarquable et l'utilité de vos produits."

Une relique actuelle du Pôle Nord



Tube de produits 'Tabloid' transporté au Pôle Nord par le Contre-Amiral Peary

Dans l'Antarctique, les Produits et Pharmacies 'Tabloid' formèrent l'unique équipement médical de Shackleton lorsqu'il établit alors son record "Farthest South"—à moins de 156 km. du Pôle. Son navire de secours *Morning* était équipé pareillement. Les Trousses 'Tabloid' accompagnèrent également Scott et Shackleton sur le *Discovery*, et Bruce sur le *Scotia;* et l'équipement médical complet de l'Expédition Antarctique Australienne de 1911 fut fourni par la maison Burroughs Wellcome & Cie.

Le Capitaine Amundsen fut muni de ces équipements lors de son voyage dans les régions du Pôle Sud, dont le retour triomphant eut lieu en Mars 1912. Le Capitaine Amundsen a envoyé depuis à Burroughs Wellcome & Cie la trousse identique que lui et ses braves compagnons portèrent avec eux pendant leur mémorable voyage du "plus au Sud."

Au Pôle Sud

Cette Trousse Médicale 'Tabloid' était dans une housse en peau de chevreuil, et porte sur sa surface l'inscription significative ci-après, écrite de la main de l'explorateur : "Sydpolen 14.12.1911," les chiffres représentant la date de la découverte du Pôle.



NAVIRES DE L'EXPÉDITION NATIONALE ANTARCTIQUE, 1901, DE L'EXPÉDITION ANTARCTIQUE NATIONALE ÉCOSSAISE ET DES EXPÉDITIONS ANTARCTIQUES BRITANNIQUES, 1907 ET 1911, TOUS ÉQUIPÉS AVEC LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 'TABLOID'

Le Capitaine Amundsen, en renvoyant cet équipement intéressant, rapporte ce qui suit :

"Je me fais un plaisir de rendre hommage au bon état de l'Équipement Médical 'Tabloid' que vous m'avez fourni en 1910. Tous les médicaments étaient admirablement empaquetés et chaque chose s'est bien conservée.

"La trousse en cuir jaune que je vous ai retournée fut vraiment la seule que j'emportai avec moi au Pôle Sud, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous la renvoie à titre de souvenir de mon voyage.

"Je considère vos équipements comme étant indispensables pour les expéditions dans les régions Arctiques ou Antarctiques."



En Aviation

Lorsqu'il se trouve dans les airs, l'aviateur est toujours en présence du danger. Un des plus éminents aéronautes du jour rapporte : "Le vol par lui-même se décompose en une série d'incidents les plus imprévus. C'est alors que, si nous voulons éviter un drame, nous devons commander nos nerfs. Le plus léger remous de l'air s'empare de la machine et la fait ballotter sensiblement d'un côté ou d'un autre, pendant que l'arrêt du moteur vous donne une angoisse de terreur, bien qu'elle ne soit que passagère." Perdu dans les nuages, pris par le brouillard, ballotté par les vents impétueux, l'aviateur se voit forcé de s'élancer quand même en avant, dans son immense cerf-volant, au milieu des ténèbres, afin de conserver son équilibre, et aussi doit-il demeurer à une altitude élevée, car, lorsqu'il sortira de là, il ignore au-dessus de quoi il se trouvera. Cela peut être aussi bien la rase campagne que la mer immense ou les rues d'une ville, circonstances critiques immédiates qui constamment le confrontent, loin peut-être de tout espoir de secours humain.

Les dangers de l'air

Les limites de sûreté concernant la vie de l'aviateur ainsi que de ses membres doivent être étendues, non

"BEAUMONT"

Le Lieutenant de vaisseau Jean Conneau gagna plus de 500 000 fr. de prix en 1911.

Pendant ses vols il emporte une trousse Premier-Secours 'Tabloid' N° 706, qu'il est en train d'examiner.

VÉDRINES

Jules Védrines gagna la Course Paris-Madrid en 1911. En septembre 1912, il gagna la Coupe Gordon-Bennett à Chicago.

La photographie montre l'aviateur tenant à la main sa trousse Premier-Secours 'Tabloid.'

seulement en perfectionnant la solidité de l'appareil, mais aussi en faisant en sorte qu'il soit muni des choses essentielles pour son traitement et sous une forme compacte, digne de confiance, le tout pouvant être obtenu promptement, pratiquement et d'un poids extrêmement léger. L'aviateur qui s'aventure dans l'air sans Premier-Secours 'Tabloid' est véritablement d'une folle témérité.

Étendue de limites de sûreté

Le Lieutenant Conneau ("Beaumont"), dans un ouvrage où il traite sur son Circuit d'Angleterre fameux, fait un récit pittoresque des dangers qu'il encourut et qu'il surmonta heureusement :

> En s'approchant des collines de Langdale, il fait ses préparatifs pour s'attaquer au terrible défilé. Avant toute chose, il doit prendre de la hauteur. Il essaye de monter, mais hélas ! il ne peut pas dépasser la hauteur de 730 m. Tout à coup, le moteur s'arrête pendant six à dix secondes, et il descend rapidement. Au-dessous de lui, il n'y a que crevasses et cîmes pointues. La perte de la machine est évidente ; il doit essayer de retarder le plus longtemps possible le moment où elle se brisera sur le sol. Pour cela, il cherche à diriger son vol plané dans la direction des endroits les plus profonds de la gorge, pour prolonger un peu plus sa descente. A ce moment, un remous l'abat vers la terre. Il se sent perdu. Mais la mort, évidemment, ne veut pas de lui, puisque, par une chance des plus incroyables, le moteur recommence à tourner. Il est sauvé.

Un drame et des nerfs d'acier

"Beaumont" reçut pour cette course le prix du *Daily Mail* de 250 000 fr. (*voir aussi page* 164). Il gagna également le Circuit Européen, couvrant la distance entière en 58 heures 38 minutes. Dans un rapport sur son équipement de Premier-Secours, il déclare :

> "Grâce à sa légéreté et à son format, la petite boîte 'Tabloid' Premier-Secours se recommande spécialement aux aviateurs."



LOUIS BLÉRIOT A BORD DE L'AÉROPLANE AVEC LEQUEL IL FIT LA TRAVERSÉE DE LA MANCHE

(Dans le médaillon : la photographie d'un des Équipements Premier-Secours 'Tabloid' qu'emploie cet aviateur fameux.)

HENRI FARMAN

Henri Farman détint pendant trois années consécutives (1909-11) le record de durée, et il est également célèbre comme dessinateur et constructeur d'aéroplanes et d'hydroplanes.

(Dans les médaillons on voit la photographie d'Henri Farman et celle de l'Équipement Premier-Secours 'Tabloid' qu'il emporte avec lui.)

Védrines, qui le suivit de près dans le Circuit d'Angleterre, rapporte :

"Je considère le Premier-Secours 'Tabloid' comme très utile. Son peu de volume en fait un modèle d'une extrême commodité."



Le premier aviateur distribuant des lettres

Védrines fut le premier aviateur distribuant des lettres au moyen d'un aéroplane (Paris-Madrid). En traversant les Pyrénées, Védrines dut s'élever à une hauteur de plus de 2000 mètres afin de triompher du défilé de la Somosierra. C'est pendant ce vol qu'il fut attaqué par un aigle. L'honneur de gagner la Coupe Gordon-Bennett à Chicago, en septembre 1912, appartient aussi à Védrines.

Les nombreuses contributions de Louis Blériot à la cause de l'aviation remontent aux expériences des premiers jours. Il a non seulement été un des pionniers dans la construction des aéroplanes, mais dans l'art de voler. Il a consacré aussi de bon cœur et son temps et sa fortune au développement du monoplan.

Après nombre d'essais persévérants, ses efforts furent couronnés de succès, notamment par l'accomplissement d'un vol en 1907, et deux années plus tard, par son envol à travers la Manche, qui fit non seulement époque, mais étonna et fit frémir le monde.

Il emploie les Premiers-Secours 'Tabloid' N° 706 et N° 723 dans ses voyages aériens et fait le rapport suivant :

"Je trouve les Équipements de Premier-Secours 'Tabloid' excessivement pratiques et je les ai vus entre les mains d'un grand nombre de mes amis, qui, comme moi, pensent qu'aucun sportsman ne peut courir le risque de ne pas en être muni."

Les contributions d'Henri Farman à la cause de l'aviation sont trop nombreuses et trop connues pour qu'une description détaillée soit nécessaire. Pendant trois années successives (1909–1911) il détint le record du monde pour la durée du vol ; il est également célèbre comme dessinateur et constructeur d'aéroplanes et d'hydroplanes. Dans l'intéressant rapport écrit en Espéranto, dont traduction est donnée ci-dessous, il fait allusion à deux aides de l'aviateur, tous les deux d'un caractère international, c'est-à-dire aux Premiers-Secours 'Tabloid' et à l'Espéranto :

"Je trouve qu'il est très nécessaire pour tout aviateur d'avoir avec lui une des trousses de Premier-Secours 'Tabloid' et de savoir l'Espéranto. Avec les deux, il peut aller n'importe où.

"Je peux dire, heureusement, que je n'ai pas encore eu d'accident sérieux, mais, travaillant sur des appareils différents, je me suis blessé plusieurs fois et fus alors content de me servir de la Trousse 'Tabloid,' qui m'a économisé beaucoup de temps précieux."

L'aviation dans l Inde

Dans l'Inde, Pécquet (18 février 1911) transporta tout un courrier de 6000 lettres et cartes postales de Allahabad à Naini, à travers le Jumna. On se rappellera que Pécquet et Keith-Davies furent les premiers aviateurs ayant volé dans l'Inde. Sur le Premier-Secours 'Tabloid,' Pécquet rapporte :

"J'ai toujours emporté avec moi l'équipement Premier-Secours 'Tabloid,' et puis vous confirmer qu'il m'a toujours été de très grande utilité aux petits accidents que j'ai eus."



Postes aériennes anglaises et américaines

Des courriers ont été aussi transportés en Angleterre par Hamel et Hubert (entre Hendon et Windsor), et en Amérique par Earle Ovington. Dans tous ces voyages, les Équipements Premier-Secours 'Tabloid' ont été employés. Earle Ovington, sous la surveillance personnelle du Directeur-Général des Postes, transporta

le premier courrier aérien du Gouvernement des États-Unis (*voir page* 172), et à l'occasion d'un de ces vols, le Directeur des Postes l'accompagna.

L'aviateur rapporte :

" J'ai examiné soigneusement les trousses (' Tabloid ') et je désire vous complimenter sur la merveilleuse compacité et le bon état de vos produits. Je me sens positivement plus à mon aise parce que j'ai avec moi vos petits équipements pour venir à mon aide quand la nécessité s'en présente."



[illegible] par G. Kamel en connexion avec les [illegible] aériennes du Royaume-Uni. L'emplacement de l'Équipement de Premier Secours 'Tabloid' emporté par l'aviateur est indiqué par la flèche.

Le Capitaine Sido aussi prit avec lui un équipement de Premier-Secours ' Tabloid ' quand il commença à établir un service postal rapide dans le Sénégal Français. Ces expériences aériennes sont intéressantes, quoiqu'il y ait encore beaucoup d'études et de recherches à parfaire avant que soit réalisée la prévision hardie de Kipling concernant un service de poste aérienne transatlantique.

Le courrier de l'avenir

Parmi les autres aviateurs éminents qui ont transporté les Équipements Premier-Secours ' Tabloid ' durant leurs envolées, citons : Ely, qui vola au-dessus du port de San-Francisco, se posant comme un oiseau sur le pont de croiseur *Pennsylvania*, et retourna à terre en volant ; Weymann, qui gagna la Coupe Gordon-Bennett pour l'Amérique en 1911 ; Fowler, qui tomba à Alta et fut sauvé par l'Équipement ' Tabloid,' qu'il portait dans sa poche ; McCurdy, Sopwith,

Aviateurs éminents

Grahame-White

Claude Grahame-White gagna la Coupe Gordon-Bennett pour l'Angleterre à Belmont Park, New-York, en 1910, sur monoplan Blériot.

L'aviateur emporte toujours avec lui dans ses vols un Premier-Secours 'Tabloid,' ainsi qu'indiqué sur la photographie.

Cody

S.-F. Cody, né à New-York, est le vainqueur des Trophés Anglais Michelin de 1910, 1911 et 1912, et a fait d'importants travaux pour le War Office.

En 1912, S.-F. Cody gagna le prix de 100 000 fr. dans le Concours Militaire d'Aéroplanes organisé par le Conseil Supérieur de l'Armée Britannique.

La flèche sur la photographie ci-contre indique la position du Premier-Secours 'Tabloid' qui est fixé sur la machine.

Tabuteau, Garros, G. Voisin, feu Hubert Latham, et beaucoup d'autres, dont les rapports ont été reçus.

Paulhan fit le rapport suivant après sa course dans les ténèbres pour gagner du temps contre son rival

Premier-Secours 'Tabloid' porté par Paulhan lors de son vol de Londres à Manchester pour le prix de 250 000 fr. du *Daily Mail.*

Grahame-White, dans le vol de Londres à Manchester, qui fut un tour de force (prix de 250 000 fr. du *Daily Mail*) :

> "Je profite de cette occasion pour vous exprimer le plaisir que j'ai eu de porter avec moi durant le vol que j'ai fait de Londres à Manchester une trousse Premier-Secours 'Tabloid.'"



Grahame-White à obtenu beaucoup d'honneurs depuis, y compris celui d'être le premier ayant traversé la Manche sur un hydro-aéroplane. Dans le rapport suivant à Burroughs Wellcome & Cie, il rappelle le premier exploit qui fit frissonner l'Angleterre lorsqu'elle reconnut le fait que l'homme avait atteint la maitrise de l'air :

> "Il sera intéressant pour vous d'apprendre que j'ai fait, pour la première fois, connaissance des trousses Premiers-Secours 'Tabloid,' en emportant l'un des petits équipements de poche en aluminium (N° 706) durant mon vol de Londres à Manchester. Je l'ai reconnu si bien adapté aux besoins des aviateurs que je ne me suis jamais trouvé sans cette trousse, ou l'une de vos autres modèles, pendant les vols suivants, et je considère qu'aucun aviateur ne devrait être sans l'une d'elles."



LE "CANARD" HYDROPLANE EN VOL

(Dans les médaillons les photographies de Gabriel Voisin et de l'Équipement Premier-Secours 'Tabloid' qu'il emporte.)

EARLE L. OVINGTON

Monsieur Ovington fut le premier homme aux États-Unis qui transporta le courrier officiellement en aéroplane.

On voit sur la photographie ci-contre le Directeur-Général des Postes et Télégraphes des États-Unis lui remettant un sac de lettres.

On voit dans le médaillon l'Équipement Premier-Secours 'Tabloid' dont il est muni.

Cody, l'inventeur et l'aviateur (*voir page* 170), porte un Premier-Secours 'Tabloid' dans tous ses vols et rapporte ainsi :

"La trousse Premier-Secours 'Tabloid' a eu toujours sa place sur ma machine, et j'en ai trouvé le contenu d'une valeur inestimable dans de nombreuses occasions. Je la considère tout à fait comme étant une des meilleures idées, permettant à chacun, comme elle le fait, de porter sous un volume restreint des remèdes pouvant faire face à toutes les circonstances critiques."

Maurice Tabuteau remporta la Coupe Michelin en 1910, volant 587 km. en 7 heures 48 minutes. Il établit pendant 1911 plusieurs records de durée, de hauteur et de distance ; y compris un vol sans arrêt de 8 heures 35 minutes. Il est muni d'une trousse Premier-Secours 'Tabloid,' concernant laquelle il rapporte :

"J'espère que je n'aurai pas à m'en servir pour quelque temps à venir, mais j'éprouverai un sentiment de securité en l'ayant toujours avec moi."

Gabriel Voisin est un aviateur accompli ainsi qu'un des pionniers dans la construction des aéroplanes. Il était associé à feu le Capitaine Ferber dans les premiers essais de vol plané à Berck-sur-Mer. Depuis lors il a introduit en France l'hydro-aéroplane appelé par le public "Canard." Voici ce qu'il rapporte au sujet de l'Équipement Premier-Secours 'Tabloid' :

"Nous avons bien reçu la trousse Premier-Secours 'Tabloid,' que nous avons eu l'occasion d'utiliser le premier jour.

"Je dois dire que votre pharmacie est parfaite et qu'elle a sa place dans toutes les automobiles et les aéroplanes."



Le Lieutenant Watkins, qui, s'étant cassé une jambe, ne put accompagner comme aviateur officiel l'Expédition Antarctique d'Australie en 1911, fit le rapport suivant :

"Heureusement pour moi, je n'ai pas eu l'occasion d'employer le petit Premier-Secours 'Tabloid,' mais un de mes amis, qui a fait de l'aviation pendant plusieurs années, fit une mauvaise chute de monoplan et reçut de sérieuses coupures en plusieurs endroits. Votre petite trousse vint le plus à propos. Je considère que l'Équipement 'Tabloid' est tout à fait la chose la plus utile que l'on puisse désirer."

Rôle du dirigeable

La qualité et la supériorité relatives, montrées respectivement par les appareils plus lourds que l'air et ceux plus légers, ainsi que les fonctions qu'ils doivent remplir, continuent à exciter les controverses, et même à influencer la politique des gouvernements.

L'évolution d'un type dominant reste comme "*stare sulla corda.*" Lorsque l'audacieux Andree partit en ballon lors de son dernier exploit à la recherche du Pôle Nord, il était muni d'un Équipement Médical 'Tabloid' à l'exclusion de tout autre, et à l'heure actuelle les produits de Burroughs Wellcome & Cie continuent à être associés à l'histoire de l'Aéronautique scientifique.

L'effort de Wellman pour traverser l'Atlantique fut également d'une conception grandiose ; l'explorateur fit preuve d'habileté et de grande prévoyance et il mit à l'épreuve l'expérience acquise lors de ses voyages arctiques. Le résultat révéla un travail voué d'avance à un achèvement prédestiné. Wellman rapporte :

"Nous sommes heureux de vous informer que l'Équipement Médical 'Tabloid' fut le seul emporté dans le dirigeable 'America' durant un vol de 1600 km. au-dessus de l'Océan Atlantique. Nous eûmes plusieurs fois l'occasion d'employer son contenu pour des malaises de peu d'importance, et nous l'avons trouvé complet et ne laissant rien à désirer, ce qui ne faisait que répéter l'expérience que j'avais eue avec vos équipements dans mes expéditions dans les régions arctiques."

Walter Wellman

Wellman fait allusion ici à son Équipement 'Tabloid' pour le dirigeable avec lequel il avait l'intention de voyager du Spitzberg au Pôle Nord.

Le record britannique pour un voyage de longue distance en ballon est détenu par MM. Gaudron, Maitland et C.-C. Turner (pilote breveté) qui, le 18 novembre 1908, partirent du Crystal Palace, à Londres, dans le ballon du *Daily Graphic*, "Mammoth," et le



Premier Secours 'Tabloid' porté sur le 'Mammoth'

jour suivant atterirent à Mateki Derevni, Novo-Alexandrovsk, Russie, ayant parcouru 1797 km. en 31 heures 30 minutes. Leur seul équipement médical était une Trousse Pharmaceutique 'Tabloid,' dont M. Turner rapporte :

> "L'équipement de Premier-Secours 'Tabloid' pour aéronautes fut des plus utiles pendant notre voyage en ballon en Russie. Nous avons employé l'Ammoniaque 'Vaporole,' avec d'excellents résultats, lorsque nous étions incommodés par la présence de gaz dans l'air. Sans les autres remèdes, nous aurions probablement souffert beaucoup. Dans mes voyages futurs, je prendrai certainement une Trousse Premier-Secours 'Tabloid.'"

Charles C. Turner

Des Pharmacies Portatives et Équipements Premiers-Secours 'Tabloid' ont aussi été fournis au Comte Zeppelin, à Willows, et à beaucoup d'autres aéronautes.

Hamel

Le 9 septembre 1911, Gustav Hamel vola de Hendon à Windsor en 12 minutes, à la vitesse de 170 km. à l'heure, transportant le premier courrier postal aérien anglais. Il a traversé plusieurs fois la Manche, et fut le premier aviateur qui alla d'Angleterre en France avec une passagère. Accompagné de Miss Trehawke Davies, il se plaça second dans le premier Derby Aérien le 8 juin 1912. Il emporte toujours un Premier-Secours 'Tabloid,' qu'il tient à la main sur la photographie ci-contre.

Le Biplan de M. Sopwith

M. Sopwith fut le vainqueur du Prix du Baron de Forest en 1910. Il vola de Brooklands à Windsor, où il fut reçu par le Roi George, 1911.

Le 8 juin 1912, il gagna le premier Derby Aérien, complétant le circuit de "Greater London" (130 km.) en 83 minutes et 8 secondes sur un 70 H.P. Gnôme-Blériot.

La flèche indique la trousse Premier-Secours 'Tabloid,' que l'on peut voir attachée sous le siège d'un biplan.



BOÎTES ET TROUSSES 'TABLOID'

Classe I. { Trousses Hypodermiques et Ophthalmiques, marque 'Tabloid'

(Ces modèles spéciaux sont la propriété exclusive de la maison Burroughs Wellcome & Cie)

(A) Trousses de Poche Hypodermiques

Marque **'Tabloid'** de Fabrique

La série de Trousses de Poche Hypodermiques, marque 'Tabloid,' fournit des équipements complets pour la médication hypodermique. Ces trousses étant surtout destinées à être utilisées dans les cas d'urgence, on s'est efforcé de rendre leur arrangement aussi compact et aussi commode que possible. On peut ainsi emporter dans le gousset une seringue, des aiguilles et toute une série de médicaments hypodermiques sûrs et de la plus grande précision de dosage.

Pour la poche du gilet

N° 3. Trousse de Poche Hypodermique, marque 'Tabloid'



N° 3. Trousse de Poche Hypodermique 'Tabloid'

Dimensions en cm.: 8 × 7 × 2.

Contient: *Douze* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid,' une Seringue Hypodermique Brevetée de B. W. & Cie, Nickelée, et deux aiguilles ordinaires d'acier.

En peau de Vache, Maroquin, peau de Sanglier. Veau Marin (Brun ou Vert), peau de Crocodile (Brune ou Verte).

N° 5. Trousse de Poche Hypodermique, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm.: 9.5 × 8 × 3. Contient: *Douze* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid,' une Seringue Hypodermique Brevetée de B. W. & Cie, Nickelée, et deux aiguilles d'acier, etc.

En Maroquin, Veau Marin (Brun ou Vert), peau de Lézard, Maroquin écrasé et peau de Crocodile (Brune ou Verte).

La seringue nickelée qui se trouve dans les trousses peut être remplacée par la Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, moyennant un léger supplément *(voir page 225)*

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

N° 7. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid'



N° 7. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique marque 'Tabloid'
Dimensions en cm : 9 × 8 × 2

Contient: *Douze* tubes de Produits Hypodermiques, marque 'Tabloid,' Seringue Hypodermique Brevetée de B. W. & Cie, Nickelée, et deux aiguilles d'acier, une aiguille exploratrice, etc. Renferme aussi un châssis mobile spécial aseptique en métal nickelé, d'une forme nouvelle, avec un râtelier tournant pour les tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid' et des attaches pour la seringue et les aiguilles.

En Aluminium, en Métal Oxydé ou en Argent massif.

N° 10. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid'



N° 10. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid'
Dimensions en cm. 6.5 × 3.5 × 2.5

Munie de la Seringue Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie (1 cmc.), avec barrette détachable et deux aiguilles ordinaires d'acier. Chaque partie de la seringue est maintenue séparément par une pince à ressort.

Un châssis mobile supporte *cinq* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid.'

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim.

La seringue nickelée qui se trouve dans les trousses peut être remplacée par la Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, moyennant un léger supplément *(voir page 225)*

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205–215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

N° 15. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 10 × 7.5 × 2. Contient : *Huit* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid,' une Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, avec deux aiguilles de platine iridié et une aiguille exploratrice d'acier, deux Produits 'Vaporole' (Hypodermique), un flacon bouché à l'émeri, une coupe pour stérilisation, pince en métal, etc. La seringue se trouve placée dans un plateau séparable, dans lequel elle peut être stérilisée. La trousse contient un tube de produits inflammables au lieu d'une lampe à alcool. On peut se servir d'un ou plusieurs de ces produits pour stériliser ou la seringue ou une solution.

En Métal Poli, complète dans une gaine en peau de Daim.

N° 20. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid'

Contient : *Dix* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid,' une petite fiole en verre, bouchée à l'émeri et recouverte d'un capuchon, pour contenir de l'éther ou de l'eau distillée, une Seringue Hypodermique, Tout en Verre,



N° 20. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid'
Dimensions en cm : 11.5 × 4.5 × 2

B. W. & Cie (1 cmc.) (chaque partie retenue séparément par des pinces), avec deux aiguilles d'acier, barrette détachable, etc.

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim *(voir planche colorée après la page 202).*

N° 21. Trousse de Poche Hypodermique, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 10 × 8 × 3. Contient : *Neuf* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid,' Seringue Hypodermique Brevetée de B. W. & Cie. Nickelée, et deux aiguilles d'acier. un petit flacon, bouché à l'émeri et recouvert d'un capuchon, pour contenir de l'eau distillée, une capsule d'éther, &c.

En Maroquin, Veau Marin (Brun ou Vert), Maroquin écrasé, peau de Crocodile (Brune ou Verte) ou peau de Lézard.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205–215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 22. Trousse de Poche Hypodermique, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 9 × 8 × 2. Son contenu est identique à celui de la Trousse N° 21.

En Aluminium, cannelé ou martelé et recouvert de cuir.

N° 23. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid'



N° 23. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 9 × 8 × 2

Même contenu que la Trousse N° 21, plus une aiguille exploratrice d'acier. Renferme en outre un châssis mobile spécial aseptique en métal nickelé avec un râtelier tournant pour les tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid' et des attaches pour la seringue et les aiguilles.

En Aluminium ou en Métal Oxydé ; aussi en Argent Massif.

N° 28. Trousse de Poche Hypodermique, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 5.5 × 4.5 × 2. Contient *douze* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid.'

En Maroquin. Veau Marin (Brun ou Vert), ou peau de Crocodile (Brune ou Verte).

N° 33. Trousse de Poche Hypodermique en Argent, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 10.5 × 8 × 2. En Argent Massif, doré à l'intérieur. Contient : Une Seringue Hypodermique, B. W. & Cie, en Argent Massif (1 cmc.), avec barrette détachable, deux aiguilles de platine iridié montées sur argent, deux flacons bouchés à l'émeri avec capuchons, *quatorze* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid,' *un* tube d'Iodure de Mercure et de Potassium 'Soloid.' Les aiguilles sont renfermées dans un compartiment spécial les mettant à l'abri des chocs.

N° 35. Trousse de Poche Hypodermique en Or, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 10 × 6 × 2. En Or Massif finement travaillé. Renferme : Une Seringue Hypodermique, B. W. & Cie, en Or Massif (1 cmc.), avec barrette détachable, deux aiguilles de platine iridié montées sur or, deux flacons bouchés à l'émeri et munis de capuchons, un mortier et un

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205–215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

pilon, *quinze* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid' sur un support à charnière, et *un* tube d'Iodure de Mercure et de Potassium 'Soloid.' Les aiguilles sont dans un compartiment séparé, à l'abri de toute atteinte.

N° 40. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid' *(La Coquille de Moule)*



N° 40. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid' (La Coquille de Moule)

Dimensions en cm. : 9 × 3.5 × 2.5. Cette trousse de poche est tout ce qu'il y a de mieux comme utilité et commodité. Les parties qui la composent sont maintenues en place par des ressorts et un râtelier. La fermeture à ressort est d'un modèle perfectionné des plus effectifs. De cette façon la plus grande sécurité possible est assurée. Cette trousse contient une Seringue Hypodermique, Tout en Verre, B. W. & Cie, avec barrette détachable, deux aiguilles ordinaires d'acier, une aiguille exploratrice, *cinq* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid,' etc.

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim.

N° 45. Trousse de Poche 'Tabloid' pour Injections de Quinine

Contient : Une Seringue Tout en Métal (1 cmc. 2), avec deux aiguilles d'acier, deux flacons de 15 cmc. bouchés à l'émeri avec



N° 45. Trousse de Poche 'Tabloid' pour Injections de Quinine
Dimensions en cm. : 13 × 7.5 × 3

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

capuchons, une lampe à alcool, une coupe et un plateau pour stérilisation, boîte pour contenir des tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid' ou pour allumettes, écran-paravent, pince en métal, *un* tube de Sublimé Corrosif 'Soloid,' et *trois* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid' de Chlorhydrate de Quinine Neutre.

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim.

N° 50. Trousse de Poche Hypodermique Vétérinaire, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 12 × 5 × 3. Munie de la Seringue Nickelée Hypodermique Vétérinaire de 5 cmc. 3, avec trois aiguilles d'acier et *quatre* tubes de Produits Hypodermiques Vétérinaires 'Tabloid,' à savoir : Chlorhydrate de Cocaïne, 0 gr. 13 ; Sulfate de Morphine, 0 gr. 065 ; Nitrate de Pilocarpine, 0 gr. 065 ; et Sulfate de Strychnine, 0 gr. 065.

En Métal Nickelé.

(B) Trousses de Poche Hypodermiques et Ophthalmiques, marque 'Tabloid'

Ces trousses comportent toute une série de Médicaments Hypodermiques et Ophthalmiques 'Tabloid' et 'Soloid.' Comme on peut les emporter dans la poche du gilet, elles conviennent tout spécialement pour les cas d'urgence.

N° 80. Trousse de Poche Hypodermique et Ophthalmique, marque 'Tabloid'

(Modèle réglementaire dans l'Armée Britannique)



N° 80. Trousse de Poche Hypodermique et Ophthalmique, marque 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 8.5 × 5.5 × 2

Cette trousse contient : *Treize* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid,' *dix* tubes de Produits Ophthalmiques 'Tabloid,' deux pinceaux, une petite pince, plus une carte indiquant l'emploi des médicaments.

Pouvant se mettre dans la poche du gilet, elle s'adapte admirablement aux cas d'urgence.

En Aluminium.

(C) Trousses de Poche Ophthalmiques, marque 'Tabloid'

Les Trousses de Poche Ophthalmiques, marque 'Tabloid,' sont éminemment commodes et renferment un approvisionnement de produits 'Tabloid' et 'Soloid' pour les yeux—

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205–215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

mydriatiques, myotiques, astringents et anesthésiques—exceptionnellement purs, dosés avec précision et propres à l'administration immédiate au moment du besoin.

Dans un espace de quelques centimètres cubes elles contiennent une série de tubes garnis, un compte-gouttes, des pinceaux, un pilon, etc. Elles sont facilement stérilisables.

N° 91. Trousse de Poche Ophthalmique Aseptique, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 5.8 × 3.2 × 2. Contient : *Neuf* tubes de Produits Ophthalmiques 'Tabloid' et 'Soloid,' tige en vulcanite, compte-gouttes, mortier, pilon et deux pinceaux. Un râtelier en métal nickelé supporte les tubes de Produits Ophthalmiques 'Tabloid.' La trousse, une fois son contenu enlevé, peut être stérilisée rapidement.

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim.

(Voir planche colorée après la page 202)

N° 92. Trousse de Poche Ophthalmique Aseptique, marque 'Tabloid' *(Forme Coquille de Moule)*



N° 92. Trousse de Poche Ophthalmique Aseptique, marque 'Tabloid' Dimensions en cm. : 6.4 × 2.8 × 1.6

Contient : *Sept* tubes de Produits Ophthalmiques 'Tabloid,' mortier, pilon, tige en vulcanite, compte-gouttes et deux pinceaux.

La forme et l'exiguïté de cette trousse la rendent facile à mettre dans la poche du gilet.

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim.

Classe II. { Trousses de Poche à Médicaments et Trousses de Selle, marque 'Tabloid'

(Ces modèles spéciaux sont la propriété exclusive de la maison Burroughs Wellcome & Cie)

Ces trousses offrent, sous un volume réduit, aux médecins, explorateurs, missionnaires, colons, etc. des équipements bien compris de produits fins en doses exactes et prêts pour un usage immédiat. Elles sont approvisionnées, suivant le but pour lequel elles doivent servir, de produits 'Tabloid' et 'Soloid' et autres

produits fins de B. W. & Cie, seringues hypodermiques, Produits Hypodermiques 'Tabloid,' pansements pour cas d'urgence, etc.

Pour l'usage courant, ces trousses sont généralement en maroquin ou autre cuir fin, mais pour un travail dur ou pour les tropiques, il est préférable de les avoir en peaux de vache, de sanglier, ou bien en métal ou en bois.

N° 112. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 10 × 7.5 × 2.5. En Métal Nickelé. Contient *cinq* flacons, bouchés à l'émeri, de produits 'Tabloid.'

N° 114. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid' *(L'Alpestre)*

Dimensions en cm. : 17 × 10.5 × 3. Contient : *Quatre* flacons de 15 cmc. de produits 'Tabloid,' aussi de la "Chlorodyne," de la Solution d'Acide Borique et de Cocaïne, de la Crème 'Hazeline,' etc. Recommandé par le comité du Club Alpin. Poids : 270 grammes.

En Maroquin.

N° 115. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

N° 115. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 23.5 × 10.5 × 3.5

Contient *dix* flacons de 15 cmc. de produits 'Tabloid,' etc.

En Maroquin, peau de Vache, peau de Sanglier, Veau Marin ou peau de Crocodile.

N° 116. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 22.5 × 12 × 3. Contient *huit* flacons de 15 cmc. et *six* flacons de 5 cmc. remplis de produits 'Tabloid,' etc.

En Maroquin, peau de Vache ou Veau Marin.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 117. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

N° 117. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Trousse d'un plus grand volume que la Trousse N° 115, et offrant une plus grande diversité de produits.

Dimensions en cm. : 19 × 11 × 6,5.

Contient *seize* flacons de 15 cmc. remplis de produits 'Tabloid,' etc.

En Maroquin, peau de Vache, Veau Marin (Brun ou Vert), peau de Sanglier ou peau de Crocodile.

N° 122. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 10 × 6 × 3,5. Contient de *huit* à *dix* tubes de produits 'Tabloid,' selon le volume de ceux-ci.

En Maroquin.

N° 123. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 10 × 9 × 3,3. Contient de *dix* à *seize* tubes de produits 'Tabloid,' selon le volume de ceux-ci.

Même modèle que le N° 124, mais plus petite.

En Maroquin, peau de Sanglier, Veau Marin ou peau de Crocodile (Brune ou Verte).

N° 124. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'



N° 124. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 14 × 10 × 4

Contient de *seize* à *vingt-quatre* tubes de produits 'Tabloid,' selon le volume de ceux-ci.

Arrangement intérieur similaire à celui d'un porte-cigarettes, ce qui permet de porter constamment cette trousse sur soi dans toutes les circonstances.

En peau de Vache, Maroquin, peau de Sanglier, Veau Marin ou peau de Crocodile.

N° 125. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 14 × 10 × 4. Contient : *Quatorze* tubes de produits 'Tabloid' et un plateau détachable garni de *douze* tubes de Produits

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205–215)*

Hypodermiques 'Tabloid'; Seringue Hypodermique Brevetée de B. W. & Cie, Nickelée, et deux aiguilles ordinaires d'acier.

En peau de Vache, Maroquin, peau de Sanglier, Veau Marin (Brun ou Vert), ou peau de Crocodile (Brune ou Verte). *(Voir planche colorée après la page 202)*

N° 126. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 14 × 10 × 4. Même conditionnement que la Trousse N° 125, sauf que le nécessaire hypodermique est contenu dans une petite trousse reconverte de cuir (*voir* N° 3, Trousse de Poche Hypodermique 'Tabloid'), qui se retire de la grande trousse, pour servir séparément.

En peau de Vache, Maroquin, peau de Sanglier, Veau Marin (Brun ou Vert), ou peau de Crocodile (Brune ou Verte).

N° 127. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 14 × 10 × 4.5. Même conditionnement que la Trousse N° 126, si ce n'est que les produits 'Tabloid' sont contenus dans des tubes extra légers.

En peau de Vache ou de Sanglier.

N° 133. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

N° 133. Trousse de Poche à Médicaments marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 17 × 11 × 3.

Contient : *Huit* flacons de 15 cmc. de produits 'Tabloid,' etc., pochette pour papiers, etc.

Trousse idéale sans courroie ni fermoir saillant, à parois métalliques recouvertes de cuir.

En Maroquin ou peau de Vache.

N° 134. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 16.5 × 11.5 × 3.5. Contient *huit* flacons de 15 cmc. remplis de produits 'Tabloid,' etc.

En peau de Vache, Maroquin, peau de Sanglier, Veau Marin brun ou peau de Crocodile.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 135. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm : 21.5 × 16.5 × 4. Contient *seize* flacons de 10 cmc. 5 et *huit* flacons de 5 cmc., remplis de produits 'Tabloid,' etc.
En peau de Vache ou en Maroquin.

N° 136. Trousse de Selle à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm : 16.5 × 12 × 4. Garnie comme le N° 134.
En peau de Vache ou peau de Sanglier.

N° 137. Trousse de Selle à Médicaments, marque 'Tabloid'



N° 137. Trousse de Selle à Médicaments 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 19 × 11 × 6.5.

Contient, comme la Trousse N° 117 *(voir page 185)*, *seize* flacons de 15 cmc. remplis de produits 'Tabloid,' etc.

En peau de Vache ou peau de Sanglier.

N° 138. Trousse de Selle à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 18.5 × 11.5 × 4.5. Même contenu que le N° 136, sauf que les produits 'Tabloid' sont en tubes extra légers.
En peau de Vache ou peau de Sanglier.

N° 139. Trousse de Selle à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 18.5 × 11.5 × 6.5. Même contenu que le N° 137 sauf que les produits 'Tabloid' sont en tubes extra légers.
En peau de Vache ou peau de Sanglier.

N° 140. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 17.5 × 11.5 × 4. Contient *sept* flacons de 15 cmc. remplis de produits 'Tabloid,' et comporte un compartiment avec petites boites pour la distribution.
En Maroquin.

N° 141. Trousse de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 19.5 × 11 × 6. Cette trousse contient *quinze* flacons de 15 cmc. de produits 'Tabloid,' et comporte un compartiment avec petites boites pour la distribution. Même modèle que la Trousse N° 117.
En Maroquin.

N° 143. Trousse de Selle à Médicaments, marque 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 20 × 8 × 11. Contient seize flacons de produits 'Tabloid' et 'Soloid,' etc. et un plateau mobile pour instruments.
En peau de Vache.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

Classe III. { Pharmacies Portatives pour Cycle, Voiture et Automobile, Équipements Médicaux, marque 'Tabloid'

(Ces modèles spéciaux sont la propriété exclusive de la maison Burroughs Wellcome & Cie)

Les Trousses à Médicaments pour Voiture, Bicyclette, Automobile, et les Équipements Médicaux, marque 'Tabloid,' contiennent des produits 'Tabloid' et 'Soloid,' ainsi que d'autres produits fins de B. W. & Cie, quelques instruments de chirurgie et divers pansements pour les cas d'urgence. Grande est la variété de trousses pour les besoins des divers praticiens. Pour ceux qui vont à bicyclette, par exemple, un genre se fixe au guidon, un autre à la barre transversale, tandis que d'autres sont pour la poche. Certains modèles constituent des dispensaires complets.

A l'usage des praticiens

N° 200. Pharmacie Portative 'Tabloid' pour Médecins (Modèle s'adaptant au guidon d'une bicyclette)



N° 200. Pharmacie Portative 'Tabloid' pour Médecins (Modèle s'adaptant au guidon d'une bicyclette)

Dimensions en cm. : 21 × 7 × 11. Contient : *Neuf* flacons de 15 cmc. de produits 'Tabloid,' instruments de petite chirurgie et divers pansements d'urgence. Poids : environ 900 grammes. En peau de Vache Vernie Noire.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 202. Pharmacie Portative 'Tabloid' pour Médecins (S'adapte à la barre transversale d'une bicyclette)

Dimensions en cm. : 25.5 × 7 × 12.5. Contient : *Douze* flacons de 15 cmc. de produits 'Tabloid,' instruments de petite chirurgie et pansements.
En peau de Vache Vernie Noire.

N° 204. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Modèle Bouée de Sauvetage pour Yacht)*

Avec miroir devant ; disposée de façon à être suspendue aux parois de la cabine au cours de voyages sur mer.

Diamètre : 29.5 cm. ; profondeur, 8 cm. Contient : *Six* flacons de 30 cmc. à bouchons de liège avec monture en bois, et *neuf* flacons de 15 cmc. avec couvercles métalliques à vis, instruments de petite chirurgie et pansements. Garnie de produits 'Tabloid' et 'Soloid,' etc.

N° 206. Pharmacie Portative 'Tabloid'

(Employée par M. Thos. Stevens)

Fac-similé réduit de la Pharmacie Portative N° 208. Dimensions en cm. : 34 × 11 × 17.5. Contient : *Douze* flacons de 75 cmc. bouchant à l'émeri, remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid,' etc., instruments de petite chirurgie, pansements, etc. En Cuir apprêté et verni.

N° 208. Pharmacie Portative 'Tabloid'

N° 208. Pharmacie Portative 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 40 × 13 × 23

Contient : *Douze* flacons de 120 cmc. bouchés à l'émeri, remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid,' instruments de petite chirurgie, pansements, etc.
Cette boite est disposée spécialement pour répondre aux besoins des voyageurs et des petites expéditions. Elle est légère, portative et durable.
En Cuir apprêté et verni.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 209. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 25.5 × 13.5 × 16.5. Contient : *Neuf* flacons de 30 cmc. ; *vingt-quatre* de 15 cmc. et *treize* de 7 cmc., remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid' ; *douze* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid' ; une Seringue Hypodermique Brevetée de B.W. & Cie, Nickelée ; deux aiguilles ordinaires d'acier, éprouvette graduée, poches supplémentaires et glissières pour instruments, etc.

En Maroquin, peau de Vache ou peau de Sanglier.

N° 211. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 29 × 14.5 × 11. Même contenu que le N° 209, mais autrement disposé.

En Maroquin ou peau de Vache.

N° 216. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 26 × 14.5 × 10. Même contenu que le N° 218, mais disposé autrement.

En Maroquin ou peau de Vache.

N° 218. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 25.5 × 11.5 × 15.5. Contient : *Neuf* flacons de 30 cmc. et *vingt-quatre* flacons de 15 cmc., remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid' ; glissières pour petits instruments d'utilité générale ; deux pochettes pour livres, papiers, etc.

En peau de Vache, Maroquin du Levant ou peau de Sanglier.

N° 219. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 34 × 15.5 × 16. Cadre en métal. Contient : *Huit* flacons de 70 cmc., bouchés à l'émeri, *dix* de 30 cmc., *douze* de 22 cmc. 5, *huit* de 15 cmc. et *dix* de 7 cmc. 5 (à bouchons de liège), remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid' (les rangées de flacons sont disposées de manière à laisser voir les étiquettes). Contient aussi : *Douze* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid' ; une Seringue Hypodermique Brevetée de B. W. & Cie, Nickelée ; deux aiguilles ordinaires d'acier, etc.

En Maroquin.

N° 220. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 35 × 14.5 × 23.5. Contient : *Huit* flacons de 70 cmc., bouchés à l'émeri, *douze* de 35 cmc., *quatorze* de 22 cmc. 5 et *seize* de 15 cmc., remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid' ; *douze* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid' ; une Seringue Hypodermique Brevetée de B. W. & Cie, Nickelée ; deux aiguilles ordinaires d'acier ; emplacement et glissières pour instruments, etc.

Semblable au modèle N° 221.

En Maroquin ou peau de Vache.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

N° 221. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Même contenu que la Trousse N° 220, plus *neuf* flacons de 6 cmc. de produits 'Tabloid' et 'Soloid' et un flacon d'éther, bouché à l'émeri muni d'une capsule.

N° 221. Pharmacie Portative 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 35 × 14.5 × 23.5

En peau de Vache ou Maroquin *(fini supérieur)*, peau de Sanglier ou peau de Crocodile *(fini supérieur)*.

Excellente pharmacie pour la voiture ou l'automobile du médecin.

N° 222. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 35 × 20.5 × 15.5. Contient : *Cinquante-neuf* flacons de produits 'Tabloid' et 'Soloid,' une Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, deux aiguilles d'acier, *douze* tubes de Produits Hypodermiques 'Tabloid,' etc.

En peau de Vache.

N° 223. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 39 × 13.5 × 28.5. Même contenu que le N° 221, mais disposé autrement, et contenant aussi une Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, au lieu d'une Seringue Nickelée, B. W. & Cie.

En peau de Vache.

N° 227. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 16.5 × 9.5 × 8. Se compose de deux cuvettes métalliques qui se juxtaposent et qui sont recouvertes de cuir. Elle est disposée de façon à contenir *vingt* tubes de 5 cmc., *douze* tubes de 4 cmc. et *quatorze* tubes de 1 cmc. 75 remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid.' Poids : environ 1 kilo.

En peau de Vache ou peau de Sanglier.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 229. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 21.5 × 13 × 9.5. Se compose de deux cuvettes métalliques qui se juxtaposent et qui sont recouvertes de peau de Vache. Elle est disposée de façon à contenir *quarante* flacons de 14 cmc. de produits 'Tabloid' et 'Soloid.' Poids : environ 2 kg. 200.

N° 230. Pharmacie Portative 'Tabloid'



N° 230 Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 21 × 15 × 7.

Cette boite constitue une pharmacie compacte et portative de médicaments d'urgence et de pansements pour excursions et voyages, et convient spécialement pour être placée dans une malle ou une valise.

Contient : *Dix* flacons de produits 'Tabloid' et 'Soloid,' instruments de petite chirurgie et pansements.

La trousse ouverte laisse voir tous les flacons et articles. Celui que l'on désire peut être enlevé avec la plus grande commodité.

En Maroquin ou peau de Vache.

N° 231. Pharmacie Portative 'Tabloid'

N° 231. Pharmacie Portative 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 28 × 19 × 8

Contient : *Quinze* flacons de 30 cmc., *quatre* flacons de 15 cmc. et *un* flacon de 120 cmc., bouchés au liège, instruments de petite chirurgie pour l'usage courant et pansements. Garnie de produits 'Tabloid,' etc. (modèle recommandé dans le *Manual of Family Medicine for India*, par Sir W. Moore).

Poids : environ 3 kilos.

Destinée spécialement pour usage dans l'Inde.

En Métal Laqué Noir.

Constitue une splendide trousse d'automobile quand elle est recouverte de feutre épais.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 232. Pharmacie Portative 'Tabloid'

(L'Urgente pour Médecins)

Dimensions en cm. : 22 × 15 × 9. Contient : Produits 'Vaporole' et 'Soloid,' 'Ernutin,' Chloroforme 'Wellcome,' Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, Produits Hypodermiques 'Tabloid,' tube-siphon pour l'estomac, etc. Poids : environ 2 kg. 350.

En peau de Vache. *(Voir planche colorée après la page 202)*

N° 233. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 19 × 9 × 4.5. Contient : *Un* flacon de 52 cmc. bouchant à l'émeri, *six* flacons de 15 cmc., *sept* tubes de grandeur moyenne et *cinq* petits tubes de produits 'Tabloid' et 'Soloid.'

En Métal Aluminisé.

N° 250. Pharmacie Portative 'Tabloid'

(Modèle ayant servi à Sir H. M. Stanley, Émin-Pacha, diverses Expéditions Militaires, les Missionnaires, etc.)



N° 250. Pharmacie Portative 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 40 × 26 × 21

Contient : *Six* flacons de 150 cmc. et *trente* de 100 cmc., bouchant à l'émeri, remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid' et autres produits de choix de B. W. & Cie, sur plateau mobile en bois de teck. Le couvercle (fait de deux pièces) est disposé de manière à recevoir des pansements, bandages, instruments de petite chirurgie pour l'usage courant, ainsi que d'autres accessoires.

Poids complète : environ 17.5 kilos.

En Acier Laqué.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 251. Pharmacie Portative 'Tabloid'

(Modèle fourni à l'Expédition Polaire Jackson-Harmsworth, à l'Expédition Antarctique Nationale [Britannique], etc.)



N° 251. Pharmacie Portative 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 38 × 26 × 21.5

Contient : *Quarante* flacons extra légers de 100 cmc., remplis de produits 'Tabloid,' 'Soloid' et autres produits de choix de B. W. & Cie.

Poids complète : environ 12 kilos. En Aluminium.

N° 252. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(L'Indienne)*

Dimensions en cm. : 26.5 × 16 × 16.5. Solidement vissée. Contient : *Vingt* flacons de 52 cmc. bouchés à l'émeri et *trois* flacons de 15 cmc., remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid'; instruments, plateau en métal pour porter divers pansements, *Guide Médical 'Tabloid,'* etc. Spéciale pour l'Inde et les Tropiques.

Poids : environ 5 kg. 500. En bois de Teck bien séché et poli.



N° 254. Pharmacie Portative 'Tabloid'
(L'Indienne)
Dimensions en cm. : 23 × 17 × 16

N° 254. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(L'Indienne)*

Contient : *Seize* flacons de 52 cmc. bouchant à l'émeri et *sept* flacons de 15 cmc., remplis de produits 'Tabloid et 'Soloid,' des instruments et un plateau garni de pansements divers, etc.

Poids approximatif : 5 kg. 500.

En Métal Laqué.

Équipement idéal pour missionnaires, expéditions et stations, lorsqu'on désire un équipement plus restreint que le N° 250 ou le N° 251.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 255. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 24.5 × 14 × 20. Contient : *Dix-huit* flacons de 100 cmc. bouchant à l'émeri, remplis de produits 'Tabloid' et 'Soloid,' ainsi que d'autres produits de choix de B. W. & Cie, un plateau, quelques pansements et divers accessoires.

En Métal Laqué Noir.

N° 256. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 26 × 14.5 × 19.5. Même contenu que le N° 255, sauf que les produits 'Tabloid' et 'Soloid' sont contenus dans des tubes extra légers.

En Aluminium.

N° 258. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Le Colon)*

N° 258 Pharmacie Portative 'Tabloid' (Le Colon)

Dimensions en cm. : 21 × 11 × 14.5.

Contient : *Douze* flacons de 45 cmc. de produits marqués 'Tabloid' et 'Soloid,' Crème 'Hazeline,' Pansements Pliés et Comprimés 'Tabloid' et autres accessoires.

En Métal Laqué Noir.

Cette pharmacie constitue un équipement très utile, occupant peu de volume, adapté aux besoins des colons, et pouvant rendre de grands services dans les camps, fermes et localités isolés.

N° 601. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 22 × 10.5 × 5. Contient *six* flacons de produits 'Tabloid.' Place pour bandes ou charpie. Choix des produits 'Tabloid' au gré de l'acheteur.

Boîte en Métal Laqué Noir ou Aluminisé à l'extérieur, blanc à l'intérieur.

Au besoin, les boîtes se vendent non garnies.*

N° 602. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 22 × 20 × 5. Contient *onze* flacons de produits 'Tabloid' et *un* flacon de produits 'Soloid.' Place pour bandes ou charpie. Choix des produits 'Tabloid' au gré de l'acheteur.

Boîte en Métal Laqué Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur.

Au besoin, les boîtes se vendent non garnies.*

---

* Voir l'avis au bas de la page suivante

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205–215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 603. Pharmacie Portative 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 17 × 8 × 5. Contient *cinq* flacons ovales de produits 'Tabloid' et *un* flacon d'Acide Borique 'Soloid' *(parfumé)*. Choix des produits 'Tabloid' au gré de l'acheteur.

En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster ou en Métal Aluminisé.

Au besoin, les boîtes se vendent non garnies.

Classe IV.—Boîte à Contrepoisons 'Tabloid'

(Ce modèle est la propriété exclusive de Burroughs Wellcome & Cie)

N° 300. Boîte à Contrepoisons marque 'Tabloid'



N° 300 Boîte à Contrepoisons marque 'Tabloid' Dimensions : 31 × 15.5 × 8 cm.

Contient : Un tube-siphon pour l'estomac, une sonde uréthrale, une Seringue Hypodermique Brevetée de B. W. & Cie, Nickelée, deux aiguilles, Produits Hypodermiques marque 'Tabloid,' Nitrite d'Amyle 'Vaporole,' Tableau des Contrepoisons, *dix-huit* flacons de 15 cmc. et *trois* tubes d'antidotes 'Tabloid,' etc.

BOÎTES ET TROUSSES 'SOLOID'

Classe V.—Boîtes à Antiseptiques, marque 'Soloid'

(Ces modèles sont la propriété exclusive de Burroughs Wellcome & Cie)

N° 400. Boîte à Antiseptiques, marque 'Soloid'

Dimensions en cm. : 17 × 14 × 6. Contient : *Quatre* tubes extra légers de produits 'Soloid.'

En peau de Vache solide, non doublée, ou en peau de Vache doublée.

'Avis.—Ces Pharmacies Portatives 'Tabloid,' garnies ou non, sont vendues sous la réserve expresse qu'elles ne devront renfermer exclusivement que des préparations de la maison Burroughs Wellcome & Cie. En cas de revente, celle-ci ne pourra avoir lieu que sous la même réserve.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 401. Boîte à Antiseptiques, marque 'Soloid'

Dimensions en cm. : 20 × 14 × 6. Contient : *Cinq* tubes extra légers de produits 'Soloid.'

En peau de Vache.

N° 410. Boîte à Antiseptiques, marque 'Soloid'

Dimensions en cm. : 24.5 × 14 × 20. Contient : *Dix-huit* flacons de 100 cmc. bouchés à l'émeri, remplis de produits 'Soloid,' plateau pour pansements, etc.

En Métal Laqué Noir.

Classe VI.—Boîtes pour Analyses, marque 'Soloid'

(Les modèles spéciaux de ces boîtes sont la propriété exclusive de la maison Burroughs Wellcome & Cie)

Les Boîtes pour Analyses, marque 'Soloid,' constituent des équipements très portatifs contenant les appareils et réactifs nécessaires pour faire des analyses d'urines, d'eaux, d'eaux d'égouts, etc.

N° 500. Boîte pour l'Analyse des Eaux, marque 'Soloid'

Cette boîte très commode se porte à la main et fournit, sous un petit volume, les appareils, réactifs, etc. nécessaires pour examiner à la source même des échantillons d'eau, et des imprimés pour y consigner les résultats de l'analyse.

N° 500. Boîte pour Analyses d'Eaux, marque 'Soloid'
Dimensions en cm. : 32 × 26.5 × 11.5

Contient : Une cuvette d'évaporation en nickel, un flacon d'Erlenmeyer, un trépied, une lampe à alcool, une éprouvette graduée de 100 cmc. et autres éprouvettes, des ampoules de réactif Nessler 'Soloid'; divers produits 'Soloid' : Nitrate d'Argent, Sulfate de Métaphénylène-diamine, Permanganate de Potasse, Ferrocyanure de Potassium, Chromate de Potassium, Bisulfate de Soude, Savon, Zinc en Poudre, etc.

En Bois extra-sec, non ourdi, fini Acajou.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205–215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 501. Boîte pour l'Analyse des Eaux, marque 'Soloid'

(Modèle réglementaire dans l'Armée britannique)

Pour usage en campagne, dans les expéditions, etc.

En Bois extra-sec, non ourdi, fini Acajou. Solidement vissé et assemblé en queue d'aronde et capitonné, afin d'éviter la casse des objets en verre, etc. La boîte est recouverte d'une enveloppe de toile imperméable, munie de courroies pour la fixer sur les épaules ou sur la selle.

Dimensions en cm. (enveloppe comprise) : 34 × 29 × 13.

Contient les appareils et produits 'Soloid' renfermés dans la boîte précédente (N° 500), avec des éprouvettes et un tableau résumant les opérations à effectuer, etc.

N° 502. Boîte pour Analyses d'Eaux et d'Eaux d'Égouts, marque 'Soloid'

En Bois extra-sec, non ourdi, fini Acajou. Dimensions en cm. : 47 × 31 × 13. Cette boîte forme, pour l'examen des eaux et des effluences d'égout, un équipement très complet, qui comprend les réactifs et appareils nécessaires, parmi lesquels un appareil distillatoire spécial pour l'estimation de l'ammoniaque.

N° 505. Trousse Bactériologique 'Soloid'

Permet aux médecins de faire eux-mêmes des recherches bactériologiques sans avoir à recourir, comme autrefois, à l'intermédiaire de praticiens de laboratoire. Par suite de son volume restreint et de son poids léger, cette trousse peut être emportée facilement dans la chambre même du malade et être utilisée pour obtenir un spécimen du sang ou d'exsudat de la gorge. Elle est en Métal Nickelé, et peut être facilement rendue aseptique. Dimensions en cm. : 13 × 8.5 × 4. Elle contient :

Trois flacons, bouchés à l'émeri, contenant : Alcool méthylique, 5 cmc. ; alcool absolu, 5 cmc. ; eau distillée, 5 cmc. Un flacon avec baguette-bouchon de Baume du Canada ; une pipette graduée ; pince pour lamelles et pince à dissection ; douze lames de verre ; une lampe à alcool ; un entonnoir en verre ; deux verres de montre ; une boîte en métal d'aiguilles (droites, N° 9) ; un paquet de papiers à filtrer ; des pipettes pour recueillir le sang ; cinquante couvre-plaques ; une tige de verre pour pulvériser les colorants microscopiques, etc. ; un tampon à exsudat stérilisé ; et *un* tube de chacun des Colorants Microscopiques 'Soloid' ci-après : Éosine, Violet Méthyle, Fuchsine, Teinture Romanowsky, Bleu Éosine-Méthylène, Bleu de Méthylène, Hæmalum, Teinture Poison pour le Sang.

Complète dans une gaine en peau de Daim. *(Voir planche colorée après la page 202)*

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

N° 506. Trousse 'Soloid' pour l'Essai du Sang



N° 506. Trousse 'Soloid' pour l'Essai du Sang
Dimensions en cm. 11 × 9 × 4

Contient : Colorant Microscopique 'Soloid' Teinture Romanowsky (Poudre de Leishman), flacon à gouttes de 20 cmc. contenant de l'eau distillée, deux flacons de 10 cmc. d'Alcool Méthylique (bouchant à l'émeri et recouverts d'un capuchon), une échelle pour hémoglobinomètre, et des papiers absorbants pour son usage, baguette en verre, pinceau, tube de vaseline, pipette de 1 cmc., crayon gras et une boîte pouvant tenir dans le gousset et contenant six lames microscopiques, et une aiguille dans une solution phéniquée.

En Métal Nickelé, dans une gaine en peau de Daim.

N° 510. Boîte pour Analyses d'Urines, marque 'Soloid'

Dimensions en cm. : 11,5 × 7 × 3. En Métal Nickelé, extra fini. Contient : Un urinomètre dans une boîte en métal nickelé, un albuminimètre d'Esbach, une éprouvette graduée, une pipette, des tubes et porte-tubes, une lampe à alcool, des papiers réactifs et formulaires pour analyses, des produits 'Soloid' pour la Réaction de Fehling, du Réactif à l'Indigo, de l'Acide Picrique, du Ferrocyanure de Potassium et de l'Acide Citrique. Complète dans une gaine en peau de Daim.

Les parties suivantes de l'appareil peuvent s'obtenir séparément : Albuminimètre d'Esbach, urinomètre, tube gradué de 30 cmc., tube à immersion, éprouvettes. *(Voir planche coloriée après la page 202)*

Pharmacies Portatives N°s 601 à 603. *(Voir pages 195 et 196)*

Classe VII. Premiers-Secours 'Tabloid' pour Automobilistes, Aviateurs, Aéronautes, Yachtsmen, Sportsmen, Voyageurs, Touristes, etc.

(Les modèles spéciaux de ces boîtes sont la propriété exclusive de la maison Burroughs Wellcome & Cie)

Ces équipements renferment des médicaments, pansements et accessoires de premiers secours, sous une forme compacte et

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

complète. Commodes et d'un transport facile, ils constituent un équipement idéal pour les automobilistes, cyclistes, aviateurs, infirmières, etc.

N° 702.
Premier Secours 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 18 × 13 × 8

N° 702. Premier-Secours 'Tabloid'

Contient : Bandes et Pansements 'Tabloid.' Ammoniaque Aromatique 'Vaporole' à employer comme "sels," 'Borofax,' Crème 'Hazeline,' sal volatil, liniment oléo-calcaire (épaissi), jaconas, huile de ricin, emplâtre, taffetas liquide, tourniquet, ciseaux, épingles, etc., et *huit* tubes de produits 'Tabloid' et 'Soloid.'

En Cuir Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster.

N° 704. Premier-Secours 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 22 × 17 × 8.5. Même contenu que celui du Premier-Secours 'Tabloid' N° 723, mais dans une trousse impénétrable à la poussière.

En Cuir Rouge Rex ou Bleu Royal.

N° 707. Premier-Secours 'Tabloid'

Dimensions en cm. : 17 × 8 × 5. Contient : Bandes et Pansements 'Tabloid,' Ammoniaque Aromatique 'Vaporole' à employer comme "sels," 'Borofax,' liniment oléo-calcaire (épaissi) avec jaconas, huile de ricin, emplâtre, taffetas liquide, ciseaux, épingles, etc., et *sept* tubes de produits 'Tabloid' et 'Soloid.'

En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster ou en Métal Aluminisé. *(Voir planche colorée après la page 202)*

N° 708. Premier-Secours 'Tabloid' (pour Infirmières et Gardes-Malades)

Dimensions en cm. : 17 × 8 × 5. Contient : Bandes et Pansements 'Tabloid,' Ammoniaque Aromatique 'Vaporole' à employer comme "sels,"

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205–215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

'Borofax,' liniment oléo-calcaire (épaissi), jaconas, emplâtre, taffetas liquide, épingles, etc., et *deux* tubes de produits 'Tabloid' et 'Soloid.'

En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster ou en Métal Aluminisé.

Sangles sur demande, pour fixer la trousse à la bicyclette ou à la ceinture.

N° 709. Premier-Secours 'Tabloid' (pour Jeune Éclaireur de Bataillon Scolaire)



N° 709. Premier-Secours 'Tabloid'
Dimensions en cm.: 17 × 8 × 5

Même contenu que le N° 708, mais avec une quantité additionnelle de pansements au lieu de tubes de produits.

En Métal Émaillé Rouge Rex ou Bleu Royal.

Sangles sur demande, pour fixer la trousse à la ceinture ou la bicyclette.

N° 710. Premier-Secours 'Tabloid'

Dimensions en cm.: 10 × 8 × 1.5. Contient: Bande et Pansements 'Tabloid,' Ammoniaque Aromatique 'Vaporole' à employer comme "sels," 'Borofax,' liniment oléo-calcaire (épaissi), emplâtre adhésif, taffetas anglais, pinceau et épingles.

En Métal Émaillé Rouge Vif.

N° 715. Premier-Secours 'Tabloid'

Dimensions en cm.: 19 × 11 × 5. Contient: Bandes et Pansements 'Tabloid,' Ammoniaque Aromatique 'Vaporole' à employer comme "sels," 'Borofax,' sal volatile, liniment oléo-calcaire (épaissi), jaconas, emplâtre, taffetas liquide, ciseaux, épingles, etc., et *huit* tubes de produits 'Tabloid' et 'Soloid.'

En Métal Emaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster, ou en Métal Aluminisé ou Laqué Noir. *(Voir planche colorée après la page suivante)*

N° 722. Premier-Secours 'Tabloid'

Dimensions en cm.: 17 × 12 × 6. Contenu semblable à celui du N° 702.

En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster ou en Métal Aluminisé.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205-215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

N° 723. Premier-Secours 'Tabloid'

Contient : Bandes et Pansements 'Tabloid,' Ammoniaque Aromatique 'Vaporole' à employer comme "sels," 'Borofax,' Crème 'Hazeline,' sal volatile, liniment oléo-calcaire (épaissi), jaconas, emplâtre, taffetas liquide,



N° 723 Premier-Secours 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 20 × 14 × 6

tourniquet, lancette, ciseaux, épingles, etc., et *neuf* tubes de produits 'Tabloid' et 'Soloid.'

En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster ou en Métal Aluminisé.

N° 730. Premier-Secours 'Tabloid'
(Trousse murale pour Bureaux, Théâtres, Salles de Réunions, etc.)

Dimensions en cm. : 42 × 27 × 6. Contient : Bandes et Pansements 'Tabloid,' Ammoniaque Aromatique 'Vaporole' à employer comme "sels," 'Borofax,' 'Hazeline,' Crème 'Hazeline,' "Neige 'Hazeline,'" liniment oléo-calcaire (épaissi), jaconas, sal volatile, emplâtre adhésif, taffetas anglais, ciseaux, pinces, pinceaux, épingles, etc., et *dix* flacons de produits 'Tabloid' et 'Soloid.'

En Acajou avec porte vitrée.

N° 740. Premier-Secours 'Tabloid'
(Pour Fabriques, Ateliers, Mines, etc.)

Dimensions en cm : 50 × 38 × 19.

Contient : Bandes et Pansements 'Tabloid,' 'Borofax, 'Hazeline,' Crème 'Hazeline,' tourniquet, éclisses, thermomètre clinique, pinces à artères, scie pour les os et autres instruments de chirurgie, chloroforme, éther, trousses hypodermique et ophthalmique, etc., *quinze* flacons de produits 'Tabloid' et 'Soloid'; produits 'Vaporole,' etc., etc. ; le tout formant un équipement pour cas d'urgence, comprenant ceux qui nécessitent la présence d'un médecin.

En bois de Teck, Acajou ou en Métal Laqué Noir.

En passant les commandes, prière de spécifier les couleurs désirées

Des réapprovisionnements pour tous ces équipements de premiers-secours sont fournis sur demande.

Voir aussi la section du Prix-Courant *(pages 205–215)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

Trousses Caractéristiques marques 'TABLOID' et 'SOLOID'

N° 20. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique marque 'Tabloid'



N° 20. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique 'Tabloid

Contient : Produits Hypodermiques 'Tabloid,' une Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, etc. *(Voir page 179)*

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim.

N° 91. Trousse de Poche Ophthalmique Aseptique marque 'Tabloid'

Contient : Produits Ophthalmiques 'Tabloid' et 'Soloid,' pinceaux, mortier, pilon, etc. *(Voir page 183)*

Un râtelier en métal nickelé supporte les tubes de produits ophthalmiques.

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim.

(Pour les prix, voir le Prix-Courant ci-après)



N° 91. Trousse de Poche Ophthalmique Aseptique 'Tabloid'
Dimensions en cm. : 5.8 × 3.2 × 2

Les étiquettes et les instructions sont en français

N° 125. TROUSSE DE POCHE À MÉDICAMENTS MARQUE 'TABLOID'

Une trousse pratique pour la poche intérieure du paletot. Spécialement combinée pour les cas urgents. Contient : Produits 'Tabloid,' Produits Hypodermiques 'Tabloid,' Seringue Hypodermique Nickelée, B. W. & Cie (Brevetée), etc. *(Voir page 185)*

En peau de Vache, de Sanglier ou de Crocodile, en Maroquin, et en Veau Marin.

N° 125. Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid.' Dimensions en cm. : 14 × 10 × 4

N° 232. PHARMACIE PORTATIVE 'TABLOID' (L'URGENTE POUR MÉDECINS)

Dimensions en cm. : 22 × 15 × 9

Contient : Produits 'Vaporole' et 'Soloid,' 'Ernutin,' Chloroforme 'Wellcome,' Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, Produits Hypodermiques 'Tabloid,' etc. En peau de Vache. *(Voir page 193)*

(Pour les prix, voir le Prix-Courant ci-après)

N° 232. Pharmacie Portative 'Tabloid'

N° 505. Trousse Bactériologique marque 'Soloid'



N° 505. Trousse Bactériologique 'Soloid'
Dimensions en cm. 13 × 8 5 × 4

Cette trousse permet aux médecins de faire eux-mêmes des recherches sans devoir recourir, comme autrefois, à l'intermédiaire de praticiens de laboratoire. Grâce à ses dimensions restreintes et son poids léger, elle peut être emportée facilement dans la chambre même du malade et être utilisée pour obtenir un spécimen du sang ou d'exsudat de la gorge. Elle contient les matériaux pour recueillir, préparer, colorer et monter les spécimens pour examens bactériologiques.

(Pour la liste complète du contenu, voir page 198)

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim.

N° 510. Boîte pour Analyses d'Urines marque 'Soloid'

Cette boîte de poche compacte et aseptique contient le matériel nécessaire pour les analyses d'urines et pour la recherche de l'albumine, du sucre, etc. Contient urinomètre, albuminimètre d'Esbach, éprouvette graduée, pipette, tubes, lampe à l'alcool, etc. *(Voir page 199)*

En Métal Nickelé, complète dans une gaine en peau de Daim.

(Pour les prix, voir le Prix-Courant ci-après)



N° 510. Boîte pour Analyses d'Urines marque 'Soloid'
Dimensions en cm. 14.5 × 7 × 3

N° 707. PREMIER-SECOURS MARQUE 'TABLOID'

Contient Bandes et Pansements 'Tabloid,' Produits 'Tabloid,' Produits 'Soloid,' Ammoniaque Aromatique 'Vaporole' à employer comme "sels," etc.

(Pour la liste complète du contenu, voir page 200)

En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal, ou Vert Brewster, ou Aluminisé.

N° 707. Premier-Secours 'Tabloid'
Dimensions en cm. 17 × 8 × 5

N° 715. PREMIER-SECOURS MARQUE 'TABLOID'

N° 715. Premier-Secours 'Tabloid'
Dimensions en cm. 19 × 11 × 5

Contient des Bandes et Pansements 'Tabloid,' de l'Ammoniaque Aromatique 'Vaporole,' du 'Borofax,' du sal volatil, du liniment oléo-calcaire épaissi, du jaconas, de l'emplâtre, du taffetas liquide des ciseaux, des épingles, etc. et tubes de Produits 'Tabloid,' Produits 'Soloid,' etc., etc. *(Voir page 201)*

En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster ou Aluminisé ou Laqué Noir.

(Pour les prix, voir le Prix-Courant ci-après)

Bureaux et Magasins Centraux :
SNOW HILL BUILDINGS, LONDRES, E.C. (ANGLETERRE)

Salle d'Exposition : 54, WIGMORE STREET, LONDRES, W.

Usines et Laboratoires : DARTFORD, près de LONDRES

LONDRES : *Adresse Télégraphique*—"TABLOID, LONDON"

CODES EN USAGE :—A B C ET LIEBER

Prix à Londres, sujets à changements sans avis préalable

Ces prix ne comprennent pas les frais de transport ; ni les droits de douane dont certains produits sont frappés.

Prix à Londres Fr.

Aiguilles pour Seringues à Sérums et pour Seringues Hypodermiques *(voir* Appareils Hypodermiques, *page* 225*)*

'Alaxa,' LIQUEUR AROMATIQUE DE CASCARA SAGRADA
(Marque de Fabrique)

Une cuillerée à café (3 cmc. 5) contient l'équivalent de 1 cmc. 4 d'Extrait de Cascara Sagrada Fluide, Pharmacopée Française.

Flacons de 112 cmc. ... ... le flacon 2.50

Alcool Méthylique (Pur)

Pour emploi avec les colorants pour la microscopie.

Capsules de verre de 15 cmc. hermétiquement scellées la capsule 0.85

Ammoniaque, Inhalateur 'Vaporole' au Chlorhydrate d' *(voir page* 310*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Analyses, Boîtes 'Soloid' pour *(voir pages* 213–214*)* — Prix à Londres Fr.

‡ ***Analyse de l'Eau, Méthode Simple pour l',*** par J. C. THRESH, Docteur en Médecine, Docteur ès Sciences, etc. ... ... l'exemplaire, net 2.50

Ouvrage-type donnant les renseignements nécessaires pour effectuer l'analyse chimique d'échantillons d'eau potable avec l'aide des Boîtes 'Soloid' pour l'Analyse des Eaux *(voir page* 197*)*. Un chapitre spécial est consacré à l'examen des eaux d'égouts.

‡ **Analyses, Formulaires pour**
Paquets de 25 ... ... le paquet 1.25

Anesthésiques Locaux *(voir* Produits Hypodermiques 'Tabloid,' *page* 228 ; Produits 'Soloid,' *pages* 254–260 ; *et* Produits 'Vaporole,' *pages* 308–310*)*

Antidotes, Boîte à *(voir* Boîte à Contrepoisons 'Tabloid,' *page* 213*)*

Antiseptiques, Boîtes 'Soloid' à *(voir page* 213*)*

'Aol' *(voir* Produits 'Tabloid,' *page* 267*)*
(Marque de Fabrique)

Appareils et Accessoires Hypodermiques *(voir* Appareils Hypodermiques, *page* 225*)*

Appareil Photographique marque 'Tabloid' *(voir page* 244*)*

Atomisateur *(voir* Vaporisateur, *page* 307*)*

Auxiliaires et Produits Photographiques *(voir page* 245*)*

Bactériologique, Trousse, marque 'Soloid' *(voir page* 214*)*

‡ **Bandes Hygiéniques Pliées et Comprimées, marque 'Tabloid'** — Prix à Londres : la boîte Fr.

Créées et mises sur le marché par B. W. & Cie

N° 1,	boîtes de 12	... ...	...	2.10
,, 2	,, ,,	... ...	...	2.55
,, 3	,, ,,	... ...	...	2.85
,, 4	,, ,,	(modèle le plus grand) ...	...	3.15

Une ceinture est renfermée dans chaque boîte.

Bandes et Pansements 'Tabloid' *(voir* Pansements 'Tabloid,' *page* 239*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Benzoïque, Composé d'Acide, marque 'Tabloid' *(voir pages 243 et 265)*

Bismuth, Gaze 'Tabloid' au *(voir page 242)*

'BIVO,' VIN FERRUGINEUX A L'EXTRAIT DE VIANDE
(Marque de Fabrique)

Reconstituant et stimulant. Possède des qualités exceptionnelles qui le distinguent des préparations ordinaires du commerce.

	Prix à Londres : le flacon Fr.
Flacons de 225 cmc.	2.50
,, 450 cmc.	4.85

'Bivo' (VIN FERRUGINEUX A L'EXTRAIT DE VIANDE) **avec Quinine**

Flacons de 225 cmc.	3.15
,, 450 cmc.	5.65

Boîtes et Trousses 'Soloid' *(voir pages 213–214)*

Boîtes et Trousses 'Tabloid' *(voir ci-après)*

BOÎTES ET TROUSSES 'TABLOID' MARQUE DE FABRIQUE

Le mot 'TABLOID' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque en faisant les commandes.

On trouvera aux *pages* 177–202 la description, avec illustrations, de la série des nombreuses trousses 'Tabloid' et 'Soloid,' garnies de médicaments pour tous les climats. Les prix sont donnés ci-après *(pages 205–215)*.

BOÎTES ET TROUSSES 'TABLOID'

CLASSE I. { TROUSSES HYPODERMIQUES ET OPHTHALMIQUES, marque 'TABLOID'

(A) Trousses de Poche Hypodermiques 'Tabloid'

	Prix à Londres : la pièce Fr.
N° 3. Trousse de Poche Hypodermique 'Tabloid' *(Pour description et illustration, voir page 177)*	
En peau de Vache ou en Maroquin	17.65
En peau de Sanglier ou en Veau Marin (Brun ou Vert)	20.15
En peau de Crocodile (Brune ou Verte)	29.00

On remplace la seringue hypodermique nickelée par la Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, moyennant un supplément de Fr. 1.25 *(voir page 225)*.

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Tabloid'—*suite*

Trousses de Poche Hypodermiques, marque 'Tabloid'—*suite*

Prix à Londres : la pièce Fr.

‡ N° 5. Trousse de Poche Hypodermique 'Tabloid'
(Pour description, voir page 177)
En Maroquin 19.00
En Veau Marin (Brun ou Vert) 25.20
En peau de Lézard, Maroquin écrasé, ou peau de Crocodile (Brune ou Verte) 31.50

‡ ,, 7. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique 'Tabloid'
(Pour description et illustration, voir page 178)
En Aluminium ou en Métal Oxydé 19.00
En Argent massif 69.25

‡ ,, 10. **Trousse de Poche Hypodermique Aseptique 'Tabloid'**
(Pour description et illustration, voir page 178)
En Métal Nickelé. Complète dans une gaine en peau de Daim 15.10

‡ ,, 15. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique, marque 'Tabloid'
(Pour description, voir page 179)
En Métal Poli. Complète dans une gaine en peau de Daim 44.10

‡ ,, 20. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique 'Tabloid'
(Pour description et illustration, voir page 179 et aussi la planche colorée après la page 202)
En Métal Nickelé. Complète dans une gaine en peau de Daim 20.15

‡ ,, 21. Trousse de Poche Hypodermique 'Tabloid'
(Pour description, voir page 179)
En Maroquin 22.00
En Veau Marin (Brun ou Vert) 26.50
En Maroquin écrasé, peau de Lézard ou peau de Crocodile (Brune ou Verte) 31.50

‡ ,, 22. Trousse de Poche Hypodermique 'Tabloid'
(Pour description, voir page 180)
En Aluminium cannelé ou martelé 19.00

‡ ,, 23. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique 'Tabloid'
(Pour description et illustration, voir page 180)
En Aluminium ou en Métal Oxydé (avec seringue hypodermique en métal nickelé) 22.75
En Argent massif 75.60

‡ ,, 28. Trousse de Poche Hypodermique 'Tabloid'
(Pour description, voir page 180)
En Maroquin ou Veau Marin (Brun ou Vert) ... 10.10
En peau de Crocodile (Brune ou Verte) 11.35

On remplace la seringue hypodermique nickelée par la Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, moyennant un supplément de Fr. 1.25 *(voir page 225)*.

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Tabloid'—*suite*

Trousses de Poche Hypodermiques, marque 'Tabloid'—*suite* — Prix à Londres : la pièce Fr.

‡N° 33. Trousse de Poche Hypodermique 'Tabloid' en Argent
(Pour description, voir page 180)
En Argent massif, dorée à l'intérieur. Complète ... 265.00

‡ ,, 35. Trousse de Poche Hypodermique 'Tabloid' en Or
(Pour description, voir page 180)
En Or massif finement travaillé. Complète 2270.00

‡ ,, 40. Trousse de Poche Hypodermique Aseptique 'Tabloid'
(La Coquille de Moule)
(Pour description et illustration, voir page 181)
En Métal Nickelé. Complète dans une gaine en peau de Daim 17.65

‡ ,, 45. Trousse de Poche 'Tabloid' pour Injections de Quinine
(Pour description et illustration, voir page 181)
En Métal Nickelé. Complète dans une gaine en peau de Daim 44.10

‡ ,, 50. Trousse de Poche Hypodermique Vétérinaire 'Tabloid'
(Pour description, voir page 182)
En Métal Nickelé 40.30

(B) Trousses de Poche Hypodermiques et Ophthalmiques, marque 'Tabloid'

‡N° 80. Trousse de Poche Hypodermique et Ophthalmique, marque 'Tabloid' (Modèle règlementaire dans l'Armée Britannique)
(Pour description et illustration, voir page 182)
En Aluminium 21.40

(C) Trousses de Poche Ophthalmiques 'Tabloid'

‡N° 91. Trousse de Poche Ophthalmique Aseptique 'Tabloid'
(Pour description, voir page 183 et aussi la planche colorée après la page 202)
En Métal Nickelé. Complète dans une gaine en peau de Daim 13.25

‡ ,, 92. Trousse de Poche Ophthalmique Aseptique 'Tabloid' *(La Coquille de Moule)*
(Pour description et illustration, voir page 183)
En Métal Nickelé. Complète dans une gaine en peau de Daim 7.60

CLASSE II. {TROUSSES DE POCHE A MÉDICAMENTS, marque 'TABLOID'

N° 112. Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 184)
En Métal Nickelé ... ... *prix approximatif* 7.60

On remplace la seringue hypodermique nickelée par la Seringue Hypodermique Aseptique, Tout en Verre, B. W. & Cie, moyennant un supplément de Fr. 1.25 *(voir page 225)*.

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Tabloid'—*suite*

Trousses de Poche à Médicaments marque 'Tabloid'—*suite* — Prix à Londres : la pièce Fr.

¦ N° 114.	Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid' *(L'Alpestre)* *(Pour description, voir page 184)*	
	En Maroquin	22.75
¦ ,, 115.	Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid' *(Pour description et illustration, voir page 184)*	
	En Maroquin ... ... *prix approximatif*	24.00
	En peau de Vache ... ... ,, ,,	29.00
	En peau de Sanglier ... ... ,, ,,	35.25
	En Veau Marin ... ... ,, ,,	42.85
	En peau de Crocodile ... ... ,, ,,	47.90
¦ ,, 116.	Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid' *(Pour description, voir page 184)*	
	En Maroquin ... ... *prix approximatif*	26.50
	En peau de Vache ... ... ,, ,,	32.75
	En Veau Marin ... ... ,, ,,	37.75
¦ ,, 117.	Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid' *(Pour description et illustration, voir page 185)*	
	En Maroquin ... ... *prix approximatif*	35.25
	En peau de Vache ... ... ,, ,,	36.50
	En Veau Marin ... ... ,, ,,	47.90
	En peau de Sanglier ... ... ,, ,,	50.40
	En peau de Crocodile ... ... ,, ,,	70.50
¦ ,, 122.	Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid' *(Pour description, voir page 185)*	
	En Maroquin ... ... *prix approximatif*	10.75
¦ ,, 123.	Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid' *(Pour description, voir page 185)*	
	En Maroquin ... ... *prix approximatif*	13.85
	En peau de Sanglier ... ... ,, ,,	17.65
	En Veau Marin ... ... ,, ,,	24.00
	En peau de Crocodile (Brune ou Verte) ,, ,,	34.00
¦ ,, 124.	Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid' *(Pour description et illustration, voir page 185)*	
	En peau de Vache ou en Maroquin *prix approximatif*	20.15
	En peau de Sanglier ... ... ,, ,,	25.20
	En Veau Marin ... ... ,, ,,	29.00
	En peau de Crocodile ... ... ,, ,,	46.60
¦ ,, 125.	Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid' *(Pour description, voir page 185 et aussi la planche colorée après la page 202)*	
	En peau de Vache ou en Maroquin *prix approximatif*	30.25
	En peau de Sanglier ... ... ,, ,,	36.50
	En Veau Marin (Brun ou Vert) ... ,, ,,	37.75
	En peau de Crocodile (Brune ou Verte) ,, ,,	56.75

Les prix varient avec le contenu choisi

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

¦ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Tabloid'—*suite*

Trousses de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'—*suite* — Prix à Londres : la pièce Fr.

‡ N° 126. Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 186*)*

En peau de Vache ou en Maroquin	*prix approximatif*	34.75
En peau de Sanglier	,, ,,	42.25
En Veau Marin (Brun ou Vert) ...	,, ,,	42.85
En peau de Crocodile (Brune ou Verte)	,, ,,	68.00

‡ ,, 127. Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 186*)*

En peau de Vache ou de Sanglier	*prix approximatif*	63.00

‡ ,, 133. Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description et illustration, voir page 186*)*

En Maroquin	*prix approximatif*	25.20
En peau de Vache	,, ,,	27.75

‡ ,, 134. Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 186*)*

En Maroquin	*prix approximatif*	20.25
En peau de Vache solide, non doublée	,, ,,	22.00
En peau de Vache	,, ,,	23.25
En peau de Sanglier	,, ,,	34.00
En Veau Marin Brun	,, ,,	36.50
En peau de Crocodile	,, ,,	46.60

‡ ,, 135. Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 187*)*

En Maroquin	*prix approximatif*	35.25
En peau de Vache	,, ,,	44.10

‡ ,, 136. Trousse de Selle à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 187*)*

En peau de Vache solide, non doublée	*prix approximatif*	27.75
En peau de Vache	,, ,,	27.75
En peau de Sanglier	,, ,,	42.85

‡ ,, 137. Trousse de Selle à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description et illustration, voir page 187*)*

En peau de Vache	*prix approximatif*	40.25
En peau de Sanglier	,, ,,	47.90

‡ ,, 138. Trousse de Selle à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 187*)*

En peau de Vache	*prix approximatif*	53.00
En peau de Sanglier	,, ,,	61.75

‡ ,, 139. Trousse de Selle à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 187*)*

En peau de Vache	*prix approximatif*	88.25
En peau de Sanglier	,, ,,	95.75

Les prix varient avec le contenu choisi

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Tabloid'—*suite*

Trousses de Poche à Médicaments, marque 'Tabloid'—*suite*

Prix à Londres : la pièce Fr.

¦ N° 140. Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 187*)*
En Maroquin ... ... *prix approximatif* 23.25

¦ ,, 141. Trousse de Poche à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 187*)*
En Maroquin ... ... *prix approximatif* 35.25

¦ ,, 143. Trousse de Selle à Médicaments 'Tabloid'
(Pour description, voir page 187*)*
En peau de Vache ... ... *prix approximatif* 79.40

CLASSE III. { PHARMACIES PORTATIVES pour CYCLE, VOITURE et AUTOMOBILE, et ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX, marque 'TABLOID'

Prix à Londres : la pièce Fr.

¦ N° 200. Pharmacie Portative 'Tabloid' pour Médecins (Modèle s'adaptant au guidon d'une bicyclette)
(Pour description et illustration, voir page 188*)*
En peau de Vache Vernie Noire *prix approximatif* 41.00

¦ ,, 202. Pharmacie Portative 'Tabloid' pour Médecins (Modèle s'adaptant à la barre horizontale d'une bicyclette)
(Pour description, voir page 189*)*
En peau de Vache Vernie Noire *prix approximatif* 56.75

¦ ,, 204. Pharmacie Portative 'Tabloid' (Modèle Bouée de Sauvetage pour Yacht)
(Pour description, voir page 189*)*
Complète ... ... *prix approximatif* 113.50

¦ ,, 206. Pharmacie Portative 'Tabloid'
(Pour description, voir page 189*)*
En Cuir apprêté et verni ... *prix approximatif* 113.50

¦ ,, 208. Pharmacie Portative 'Tabloid'
(Pour description et illustration, voir page 189*)*
En Cuir apprêté et verni ... *prix approximatif* 163.75

¦ ,, 209. Pharmacie Portative 'Tabloid'
(Pour description, voir page 190*)*
En peau de Vache ou en Maroquin *prix approximatif* 133.00
En peau de Sanglier ... ... ,, ,, 150.00

¦ ,, 211. Pharmacie Portative 'Tabloid'
(Pour description, voir page 190*)*
En Maroquin ou peau de Vache *prix approximatif* 214.25

¦ ,, 216. Pharmacie Portative 'Tabloid'
(Pour description, voir page 190*)*
En Maroquin ou peau de Vache *prix approximatif* 145.00

Les prix varient avec le contenu choisi

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

¦ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Tabloid'—*suite*

Pharmacies Portatives pour Cycle, Voiture et Automobile, et Équipements Médicaux, marque 'Tabloid'—*suite*

		Prix à Londres : la pièce Fr.
N° 218.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page 190)*	
	En peau de Vache ou en Maroquin du Levant *prix approximatif*	100.75
	En peau de Sanglier ... ... ,, ,,	116.00
,, 219.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page 190)*	
	En Maroquin ... ... *prix approximatif*	171.35
,, 220.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page 190)*	
	En Maroquin ou peau de Vache *prix approximatif*	189.00
,, 221.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description et illustration, voir page 191)*	
	En peau de Vache, *fini supérieur* *prix approximatif*	292.00
	En Maroquin, *fini supérieur* ... ,, ,,	292.00
	En peau de Sanglier ... ... ,, ,,	332.00
	En peau de Crocodile, *fini supérieur* ,, ,,	371.00
,, 222.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page 191)*	
	En peau de Vache ... ... *prix approximatif*	353.00
,, 223.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page 191)*	
	En peau de Vache ... ... *prix approximatif*	504.00
,, 227.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page 191)*	
	En peau de Vache ... ... *prix approximatif*	100.75
	En peau de Sanglier ... ... ,, ,,	107.10
,, 229.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page 192)*	
	Complète ... ... *prix approximatif*	113.50
,, 230.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description et illustration, voir page 192)*	
	En Maroquin ou peau de Vache *prix approximatif*	63.00
,, 231.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description et illustration, voir page 192)*	
	En Métal Laqué Noir ... ... *prix approximatif*	97.75
	Avec contenu modifié ... ... ,, ,,	88.00
,, 232.	Pharmacie Portative 'Tabloid' (l'Urgente pour Médecins) *(Pour description, voir page 193 et aussi la planche colorée après la page 202)*	
	En peau de Vache ... ... *prix approximatif*	145.00

Les prix varient avec le contenu choisi

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Tabloid'—*suite*

Pharmacies Portatives pour Cycle, Voiture et Automobile, et Équipements Médicaux, marque 'Tabloid'—*suite*

	Prix à Londres : la pièce Fr.
‡ N° 233. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page* 193*)* En Métal Aluminisé	18.90
‡ ,, 250. Pharmacie Portative 'Tabloid' (Modèle ayant servi à Sir H. M. STANLEY, ÉMIN-PACHA, etc.) *(Pour description et illustration, voir page* 193*)* Les prix varient	de Fr. 265.00 à Fr. 397.00
‡ ,, 251. Pharmacie Portative 'Tabloid' (Modèle fourni à diverses expéditions polaires) *(Pour description et illustration, voir page* 194*)* En Aluminium ... ... *prix approximatif*	605.00
‡ ,, 252. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(L'Indienne)* *(Pour description, voir page* 194*)* En bois de Teck bien séché et poli *prix approximatif*	97.75
‡ ,, 254. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(L'Indienne)* *(Pour description et illustration, voir page* 194*)* En Métal Laqué ... ... *prix approximatif*	94.50
‡ ,, 255. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page* 195*)* En Métal Laqué Noir ... ... *prix approximatif*	106.00
‡ ,, 256. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page* 195*)* En Aluminium ... ... *prix approximatif*	238.00
D'autres Pharmacies Portatives 'Tabloid' en Aluminium, prêtes à livrer, complètes	de Fr. 250.00 à Fr. 750.00
‡ ,, 258. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Le Colon)* *(Pour description et illustration, voir page* 195*)* En Métal Laqué Noir	35.25
‡ ,, 260. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Le Safari)* En Métal Laqué Noir, complète dans une toile avec courroies	163.75
‡ ,, 601. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page* 195*)* En Métal Laqué Noir ou en Métal Aluminisé, *complète*	14.00
Au besoin, les boites se vendent non garnies *(voir avis, page* 196*)*	5.00
‡ ,, 602. Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page* 195*)* En Métal Laqué Noir ... ... *complète*	27.75
Au besoin, les boites se vendent non garnies *(voir avis, page* 196*)*	9.00

Les prix varient avec le contenu choisi

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Tabloid'—*suite*

Pharmacies Portatives pour Cycle, Voiture et Automobile, et Équipements Médicaux, marque 'Tabloid'—*suite*

		Prix à Londres : la pièce Fr.
N° 603.	Pharmacie Portative 'Tabloid' *(Pour description, voir page 196)*	
	En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster, ou en Métal Aluminisé ... *complète*	7.55
	Au besoin, les boîtes se vendent non garnies *(voir avis, page 196)*	3.80

(Les prix des pharmacies portatives qui précèdent varient avec le contenu choisi)

CLASSE IV. { BOÎTE A CONTREPOISONS marque 'TABLOID'

N° 300. Boîte à Contrepoisons, 'Tabloid'
(Pour description et illustration, voir page 196)
La boîte complète 53.00

CLASSE V. { BOÎTES A ANTISEPTIQUES marque 'SOLOID'

N° 400. Boîte à Antiseptiques 'Soloid'
(Pour description, voir page 196)
En peau de Vache solide, non doublée, *prix approximatif* 37.75
En peau de Vache ... ... ,, ,, 43.50

,, 401. Boîte à Antiseptiques 'Soloid'
(Pour description, voir page 197)
En peau de Vache ... ... *prix approximatif* 53.00

,, 410. Boîte à Antiseptiques 'Soloid'
(Pour description, voir page 197)
En Métal Laqué Noir ... ... *prix approximatif* 79.50

(Les prix des Boîtes N° 400, 401 et 410 varient avec le contenu choisi)

CLASSE VI. { BOÎTES POUR ANALYSES marque 'SOLOID'

N° 500. Boîte 'Soloid' pour l'Analyse des Eaux
(Pour description et illustration, voir page 197)
La boîte complète 53.00

,, 501. Boîte 'Soloid' pour l'Analyse des Eaux
(Pour description, voir page 198)
La boîte complète 95.75

,, 502. Boîte 'Soloid' pour Analyses d'Eaux et d'Eaux d'Égouts
(Pour description, voir page 198)
La boîte complète 83.25

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Soloid'—*suite*

Boîtes pour Analyses, marque 'Soloid'—*suite*

Prix à Londres: la pièce Fr.

¦ N° 505. **Trousse Bactériologique 'Soloid'**
(Pour description, voir page 198 et aussi la planche colorée après la page 202)
Complète dans une gaine en peau de Daim 31.50

¦ ,, 506. **Trousse 'Soloid' pour l'Essai du Sang**
(Pour description et illustration, voir page 199 et aussi la planche colorée après la page 202)
En Métal Nickelé, dans une gaine en peau de Daim 31.50

¦ ,, 510. **Boîte 'Soloid' pour Analyses d'Urines**
(Pour description, voir page 199)
En Métal Nickelé, dans une gaine en peau de Daim 31.50
Les parties suivantes peuvent s'obtenir séparément:
Albuminimètre d'Esbach 4.20
Urinomètre 4.20
Tube gradué de 30 cmc. 1.60
Tube à immersion 0.35
Deux éprouvettes 0.35
L'assortiment complet 9.50

CLASSE VII. PREMIERS-SECOURS 'TABLOID' pour AUTOMOBILISTES, AVIATEURS, AÉRONAUTES, YACHTSMEN, SPORTSMEN, VOYAGEURS, TOURISTES, etc.

Prix à Londres: la pièce Fr.

¦ N° 702. Premier-Secours 'Tabloid'
(Pour description et illustration, voir page 200)
En Cuir Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster 63.00

¦ ,, 704. Premier-Secours 'Tabloid'
(Pour description, voir page 200)
En Cuir Rouge Rex ou Bleu Royal 113.50

¦ ,, 706. Premier-Secours 'Tabloid' (l'Aviateur)
En Aluminium 9.45

¦ ,, 707. Premier-Secours 'Tabloid'
(Pour description, voir page 200 et aussi la planche colorée après la page 202)
En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster, ou en Métal Aluminisé 9.45

¦ ,, 708. Premier-Secours 'Tabloid' (pour Infirmières et Gardes-Malades)
(Pour description, voir page 200)
En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster, ou en Métal Aluminisé 6.30
Sangles pour fixer la trousse à la ceinture ou à la bicyclette ... ... *la pièce* 0.65

¦ ,, 709. Premier-Secours 'Tabloid' (pour Jeune Éclaireur de Bataillon Scolaire)
(Pour description et illustration, voir page 201)
En Métal Émaillé Rouge Rex ou Bleu Royal ... 6.30
Sangles pour fixer la trousse à la ceinture ou à la bicyclette ... ... *la pièce* 0.65

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

¦ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Boîtes et Trousses 'Tabloid'—*suite*

Premiers-Secours 'Tabloid' pour Automobilistes, Aviateurs, Aéronautes, Yachtsmen, Sportsmen, Voyageurs, Touristes, etc.—*suite*

		Prix à Londres : la pièce Fr.
N° 710.	Premier-Secours 'Tabloid' *(Pour description, voir page 201)* En Métal Émaillé Rouge Vif	2.50
,, 715.	Premier-Secours 'Tabloid' *(Pour description, voir page 201 et aussi la planche colorée après la page 202)* En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster, ou en Métal Aluminisé ou Laqué Noir	13.25
,, 722.	Premier-Secours 'Tabloid' *(Pour description, voir page 201)* En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster, ou en Métal Aluminisé	31.50
,, 723.	Premier-Secours 'Tabloid' *(Pour description et illustration, voir page 202)* En Métal Émaillé Rouge Rex, Bleu Royal ou Vert Brewster ou Aluminisé	44.00
,, 730.	Premier-Secours 'Tabloid' (Trousse murale pour Bureaux, Théâtres, Salles de Réunions, etc.) *(Pour description, voir page 202)* En Acajou avec porte vitrée	50.50
,, 740.	Premier-Secours 'Tabloid' (pour Fabriques, Ateliers, Mines, etc.) *(Pour description, voir page 202)* En bois de Teck, en Acajou, ou en Métal Laqué Noir	630.00

'Borofax,' Onguent a l'Acide Borique

Marque de Fabrique)

Prix à Londres Fr.

Antiseptique, émollient et sédatif. Contient 10 pour cent d'acide borique.

Tubes compressibles	le tube	0.65
,, ,, (grand modèle)	,,	1.05

Bouts en Vulcanite

Recourbés	la pièce	0.55
Droits	,,	0.55

S'adaptent aux tubes compressibles de Crème 'Hazeline,' et servent à l'application de cette préparation sur les muqueuses du nez, de l'oreille, de l'urèthre et du rectum.

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens lorsque contient les produits dont l'importation est autorisée

Prix à Londre

'Brockedon,' Produits

Burroughs Wellcome & Cie sont les successeurs et seuls propriétaires de la maison BROCKEDON, qui, en 1842, INTRODUISIT dans la Pharmacie les MÉDICAMENTS COMPRIMÉS en forme de disques biconvexes, sous la désignation de Pilules Comprimées.

Bicarbonate de Soude pur Comprimé, marque 'Brockedon'

Bicarbonate de Potasse pur Comprimé, marque 'Brockedon'

Chlorate de Potasse pur Comprimé, marque 'Brockedon'
En boîtes, la boîte ... ... Fr. 0.45, 0.90 et 2.3

Café-Menthe *(voir* 'Coffee-Mint' 'Tabloid,' *page* 273*)*

Cascara Sagrada marque 'Tabloid' *(voir* Produits 'Tabloid,' *pages* 271–272*)*

Charpie Pliée et Comprimée marque 'Tabloid' *(voir* Pansements 'Tabloid,' *page* 241*)*

Chirurgicaux, Pansements *(voir* Pansements 'Tabloid,' *page* 239*)*

Chloroforme marque 'Wellcome' *(voir page* 315*)*

'Coffee-Mint' (Café-Menthe) 'Tabloid' *(voir page* 273*)*

Colorants 'Soloid' pour la Microscopie *(voir page* 262*)*

Colorants 'Soloid' pour la Photographie *(voir page* 248*)*

Contrepoisons, Boîte à *(voir page* 213*)*

Coton Plié et Comprimé, marque 'Tabloid'
(Absorbant ; Boriqué ; au Cyanure Double, 3 pour cent ; Iodoformé)
(voir Pansements 'Tabloid,' *page* 241*)*

Crème 'Hazeline' *(voir* 'Hazeline,' *page* 223*)*

Diphthérie, Sérum contre la *(voir page* 251*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

Eaux, Boîtes 'Soloid' pour l'Analyse des *(voir page* 213*)*

Eaux Minérales *(voir* Sels d'Eaux Minérales, marque 'Tabloid,' *page* 295*)*

Effervescents, Produits Médicamenteux *(voir* Produits Effervescents 'Tabloid,' *page* 275*)*

'Elixoid,' Produits marque *(voir ci-après)*

PRODUITS

Marque **'ELIXOID'** de Fabrique

Le mot 'ELIXOID' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque en faisant les commandes.

Les Produits 'Elixoid' présentent des préparations liquides de drogues, etc., élégantes, attractives et de saveur agréable.

	Prix à Londres : le flacon Fr.
'ELIXOID' *(Marque de Fabrique)*—	
,, Formiates, Composé de, flacons de 112 cmc. ...	1.65
100 cmc. de ce composé contiennent : Formiate de Chaux, 2 gr. 73 ; Formiate de Soude, 1 gr. 36 ; Formiate de Magnésie, 1 gr. 36.	
,, Glycérophosphates, flacons de 112 cmc.	1.65
Chaque 100 cmc. contient : Glycérophosphate de Chaux, 0 gr. 90 ; Glycérophosphate de Soude, 0 gr. 45 ; Glycérophosphate de Potasse, 0 gr. 45 ; et Glycérophosphate de Magnésie, 0 gr. 22.	
,, Goudron Végétal, Composé de, flacons de 112 cmc....	1.90
Préparation agréable au goût : contient Goudron, 'Pinol,' Hydrate de Terpilène, Écorce de Cerisier, Tolu et Ipécacuanha.	
,, Mucine, flacons de 112 cmc.	3.15
Chaque 10 cmc. contient 0 gr. 46 de Mucine.	
,, Valérianate d'Ammoniaque, flacons de 225 cmc. ...	3.35
Chaque 10 cmc. contient 0 gr. 36 de Valérianate d'Ammoniaque.	

D'autres produits sont également fournis sous la marque 'Elixoid'

Emplâtres de Composé de Menthol (B. W. & Cie) *(voir page* 236*)*

'Enule,' Suppositoires Rectaux marque *(voir la page suivante)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

SUPPOSITOIRES RECTAUX

Marque **'ENULE'** de Fabrique

Le mot 'ENULE' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque en faisant les commandes.



Suppositoire Rectal 'Enule' sans enveloppe
Forme créée par B. W. & Cie

Le Suppositoire marque 'Enule' possède des avantages frappants sur les suppositoires ordinaires de forme conique, qui sont d'une introduction difficile, et quelquefois même expulsés. Les Suppositoires 'Enule' sont renfermés dans des enveloppes de papier d'étain pur, qu'on enlève facilement au moment de l'emploi. Ils contiennent des médicaments purs rigoureusement dosés, les substances actives sont incorporées d'une manière uniforme dans le véhicule et conservent leur activité entière pendant de très longues périodes.



Suppositoire Rectal 'Enule' dans son enveloppe d'étain pur
Forme créée par B. W. & Cie

Le PROF. CASPARI, dans son *Treatise on Pharmacy*, p. 390, s'exprime ainsi au sujet des Suppositoires 'Enule' :

" La forme habituelle des suppositoires rectaux est celle d'un cône au sommet arrondi, mais la difficulté qu'on éprouve à faire passer ceux-ci dans le rectum a amené *Mr. H. S. Wellcome, de Londres, à leur donner une forme différente*, dont les avantages seront appréciés si l'on se rend compte du fait que le bout renflé pénètre le premier dans le rectum et qu'aussitôt que le plus grand diamètre a franchi l'anus, l'expulsion du suppositoire devient impossible par cette contraction même du sphincter qui rend si difficile la rétention des suppositoires coniques ordinaires."

Les Suppositoires 'ENULE' doivent être gardés dans un endroit frais et sec.

Chaque sorte se vend par boîte d'une douzaine (dans un seul dosage)

'ENULE' *(Marque de Fabrique)*— N°				Prix à Londres : la boite Fr.
‡ ,, 10.	Belladone, Extrait de,	0 gr. 016	... ...	2.10
‡ ,, 11.	,, ,,	0 gr. 032	... ...	2.10
‡ ,, 12.	,, ,,	0 gr. 065	... ...	2.10
,, 9.	Bismuth, Sous-Gallate de,	0 gr. 648	... ...	2.50
,, 14.	Cocaïne, Chlorhydrate de,	0 gr. 032	... ...	2.50
,, 2.	Glycérine (Anhydre), 95 pour cent.		Pour Adultes	0.95
,, 1.	,, ,, ,, ,,		Pour Enfants	0.95

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Enule,' Suppositoires Rectaux—*suite*

'ENULE' *(Marque de Fabrique)—suite*

N°		Prix à Londres : la boîte Fr.
,, 5.	'Hazeline,' Composé d'	2.10
	Ces suppositoires, outre l' 'Hazeline,' renferment de l'Extrait d'Hamamélis et de l'oxyde de zinc.	
	(Voir aussi Suppositoires 'Hazeline,' *page* 224*)*	
,, 24.	'Hemisine' *(Marque de Fabrique)*, 0 gr. 001 ...	3.35
,, 7.	Lait Assimilable.—Pour Adultes	2.10
	Chaque suppositoire contient 1 gr. 166 de peptone concentrée de lait frais.	
,, 6.	Lait Assimilable.—Pour Enfants	1.55
	Chaque suppositoire contient 0 gr. 648 de peptone concentrée de lait frais.	
‡ ,, 16.	Morphine, Chlorhydrate de, 0 gr. 016	2.50
‡ ,, 17.	,, ,, 0 gr. 032	2.50
,, 18.	,, ,, 0 gr. 065	2.50
,, 15.	Morphine et Belladone	2.50
	Chlorhydrate de Morphine ... 0 gr. 016 Extrait de Belladone ... ... 0 gr. 032	
,, 25.	Noix de Galle et Opium	2.50
	Chacun contient 0 gr. 016 d'Extrait d'Opium et 0 gr. 194 d'Acide Tannique, équivalent à 0 gr. 324 de Noix de Galle.	
,, 20.	Opium, Extrait d', 0 gr. 065	2.50
‡,, 19.	Plomb et Opium	2.50
	Acétate de Plomb ... ... 0 gr. 194 Poudre d'Opium ... ... 0 gr. 065	
,, 13.	Quassin Amorphe, 0 gr. 032	2.10
,, 8.	Quinine Neutre, Sulfate de (Bisulfate de Quinine), 0 gr. 324	2.10
,, 21.	Santonine, 0 gr. 194	2.50
,, 23.	Savon, Composé de	1.55
	Savon Animal ... ... 0 gr. 454 Sulfate de Soude desséché ... 0 gr. 454	
,, 4.	Viande Assimilable.—Pour Adultes	2.10
	Chaque suppositoire contient 0 gr. 972 de peptone concentrée de bœuf frais de premier choix.	
,, 3.	Viande Assimilable.—Pour Enfants	1.55
	Chaque suppositoire contient 0 gr. 551 de peptone concentré de bœuf frais de premier choix.	

D'autres produits sont également fournis sous la marque 'Enule.'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

PRODUITS
Marque 'EPININE' de Fabrique

L' 'Epinine' (3 : 4-dihydroxyphényléthylméthylamine) est un produit synthétique de grande stabilité et pureté, possédant à un degré élevé l'action pharmacologique du principe actif de la glande surrénale.

	Prix à Londres : le flacon Fr.
'Epinine' au 100e *(Marque de Fabrique)*	
Flacons ambrés de 10 cmc. bouchant à l'émeri ...	1.65
,, ,, 25 cmc. ,, ,, ...	3.15

Un approvisionnement de Chlorure de Sodium 'Soloid,' 0 gr. 23, pour la préparation de solution saline normale, est fourni avec chaque flacon.

'Epicaine' ('Epinine' et Chlorhydrate de Cocaïne) *(Marque de Fabrique)*

Flacons ambrés de 10 cmc. bouchant à l'émeri ...	1.25

Chaque centimètre cube contient : 'Epinine,' 0 gr. 0003, et Chlorhydrate de Cocaïne, 0 gr. 02.

(Voir aussi 'Epinine' 'Tabloid' [Ophthalmique], *page* 238 ; Composé d' 'Epinine' 'Tabloid,' *page* 275 ; 'Epinine' 'Vaporole' *et* 'Epicaine' 'Vaporole' *page* 308*)*

Équipements Médicaux 'Tabloid' *(voir pages* 205 *à* 215*)*

Équipement Photographique 'Tabloid' *(voir page* 249*)*

'Ernutin,' Produits marque *(voir ci-après)*

PRODUITS
Marque 'ERNUTIN' de Fabrique

Les produits 'Ernutin' présentent les principes thérapeutiques actifs de l'Ergot—Ergotoxine, 'Tyramine' et 'Ergamine'—dans une solution stable et dans un état de pureté chimique. Les produits 'Ernutin' sont libres des constituants inactifs et peu désirables de l'Ergot.

	Prix à Londres Fr.
'Ernutin' (pour l'administration orale) *(Marque de Fabrique)*	
Flacons de 30 cmc. ... ... le flacon	2.50
,, 112 cmc. ... ... ,,	7.55
,, 450 cmc. ... ... ,,	25.20

'Ernutin' (Hypodermique) *(voir* 'Ernutin' 'Vaporole,' *page* 309*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

Ether, en capsules de verre, hermétiquement scellées, contenant chacune 3 cmc. 55 (les mêmes que celles qui sont fournies dans les Trousses de Poche 'Tabloid' Hypodermiques N° 21, 22 et 23) ... la capsule — Prix à Londres Fr. 0.40

'Eucalyptia,' essence pure d'*Eucalyptus globulus*
(Marque de Fabrique)
Flacons de 55 cmc. ... ... le flacon 1.65
(Voir aussi Composé d'"Eucalyptia' 'Soloid,' *page* 258*)*

Extrait de Malt 'Kepler' et Combinaisons *(voir* Produits de Malt 'Kepler,' *pages* 234 *à* 236*)*

'Fairchild,' Produits Digestifs *(voir ci-après)*

PRODUITS DIGESTIFS 'FAIRCHILD'

	Prix à Londres La douzaine Fr.	Prix à Londres Le flacon Fr.
'Enzymol' *(Marque de Fabrique)*		
Flacons de 112 cmc.	32.75	2.75
Glycerinum Pepticum		
Flacons de 112 cmc.	30.25	2.55
,, 450 cmc.	97.00	8.10
'Holadin' et Sels de Bile		
Flacons de 25 capsules	25.20	2.10
,, 100 ,, ...	73.10	6.10
Lécithine Glycérolée—'Fairchild'		
Flacons de 225 gr.	73.10	6.10
'Panopepton' *(Marque de Fabrique)*		
Flacons de 170 cmc.	34.00	2.85
,, 340 cmc.	58.00	4.85
'Pepsencia' *(Marque de Fabrique)*		
Flacons de 112 cmc.	27.70	2.35
,, 225 cmc.	50.40	4.20
Pepsine—'Fairchild'—en écailles—		
Flacons de 7 gr.	16.40	1.40
,, 28 gr.	40.30	3.40
,, 112 gr.	...	9.45
,, 225 gr.	...	16.40
,, 450 gr.	...	30.25
Pepsine—'Fairchild'—en poudre—		
Flacons de 7 gr.	16.40	1.40
,, 28 gr.	40.30	3.40
,, 112 gr.	...	9.45
,, 225 gr.	...	16.40
,, 450 gr.	...	30.25

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

¦ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Fairchild,' Produits igestifs—*suite*	Prix à Londres La douzaine Fr.	Prix à Londres Le flacon Fr.
Peptogenic Milk Powder (Poudre de Lait Peptogénique)		
Flacons	27.70	2.35
,, grands	55.45	4.65
‡ 'Zymine' (Extrait de Pancréas)—La 'Zymine' *(Marque de Fabrique)* est un produit inaltéré d'extrait de pancréas. Elle renferme *tous* les ferments digestifs de cet organe à un état exceptionnel de pureté et d'activité.		
Flacons de 7 gr.	16.40	1.40
,, 28 gr.	49.15	4.10
‡ 'Zymine,' Tubes Peptonisants		
Boîtes de 12 tubes	18.90	1.55
'PEPULE' *(Marque de Fabrique)*—		
‡ ,, Pepsine, 0 gr. 065, *dragéifié*		
Flacons de 25	7.55	0.65
,, 100	21.40	1.80
‡ ,, Pepsine, 0 gr. 194, *dragéifié*		
Flacons de 25	13.85	1.20
,, 100	36.55	3.05
‡ ,, Pepsine et Zymine, *dragéifié*		
Pepsine ... ... 0 gr. 13 'Zymine' ... ... 0 gr. 194		
Flacons de 25	25.20	2.10
,, 100	73.10	6.10
‡ ,, Pepsine, Bismuth et Zymine, *dragéifié*		
Pepsine ... ... 0 gr. 097 Sous-Nitrate de Bismuth 0 gr. 13 'Zymine' ... ... 0 gr. 097		
Flacons de 25	16.40	1.40
,, 100	49.15	4.10
‡ ,, Zymine, 0 gr. 194, *dragéifié*		
Flacons de 25	16.40	1.40
,, 100	49.15	4.10
‡ ,, Zymine, Composé de, *dragéifié*		
'Zymine' ... ... 0 gr. 13 Sous-Nitrate de Bismuth 0 gr. 194 Poudre d'Ipécacuanha ... 0 gr. 0065		
Flacons de 25	16.40	1.40
,, 100	49.15	4.10
On a observé que le Composé de Zymine 'Pepule,' pris *une heure avant* de s'embarquer, assure une traversée exempte de mal de mer, même quand la mer est houleuse.		

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Fehling, Réactif, marque 'Soloid' *(voir* Produits 'Soloid,' *page* 261*)*

Fer Dialysé (B. W. & Cie)

		Prix à Londres Fr.
Flacons de 112 cmc., avec compte-gouttes	le flacon	2.55
,, 450 cmc. ,, ,, ,,	,,	4.20

Fer Dialysé Wyeth *(voir page* 310*)*

Filasse *(voir* Pansements 'Tabloid,' *page* 241*)*

Galéniques 'Wellcome,' Produits *(voir page* 311*)*

Gazes *(voir* Pansements 'Tabloid,' *page* 239*)*

Glande Mammaire 'Tabloid' *(voir* 'Mamos' 'Tabloid,' *page* 283*)*

Glande Pituitaire *(voir* Hypophyse 'Tabloid,' *page* 281, et Extrait d'Hypophyse [Infundibulaire], marque 'Vaporole,' *page* 309*)*

Glande Prostatique 'Tabloid' *(voir page* 291*)*

Glande Surrénale 'Tabloid' *(voir page* 297*)*

Glande Thyroïde 'Tabloid' *(voir page* 298*)*

'HAZELINE' ET SES PRÉPARATIONS
(Marque de Fabrique)

'Hazeline'—*Hamamelis virginica*

Cette préparation présente les principes volatils actifs de l'écorce fraîche des jeunes rameaux de l'arbuste.

		Prix à Londres Fr.
Flacons de 112 cmc.	le flacon	1.25
,, 450 cmc.	,,	3.80

Crème 'Hazeline' ('Hazeline' Cream)
(Marque de Fabrique) (Trade Mark)

Préparation élégante d'"Hazeline" dans un émollient d'une finesse et d'une pureté exceptionnelles.

Pots de verre	le pot	1.15
Tubes compressibles (fermeture à large tête) ...	le tube	0.65
,, ,, (grand modèle)	,,	1.05

Bouts en Vulcanite (s'adaptant aux tubes compressibles pour applications nasales, rectales, etc.) *(voir page* 215*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Hazeline' et ses Préparations—*suite*

‡ **"Neige 'Hazeline'"** (**"'Hazeline' Snow"**) Prix à Londres
(Marque de Fabrique) *(Trade Mark)*

C'est la première préparation non graisseuse qui ait été introduite pour la conservation de la peau et du teint. Fr.

Pots de verre ... ... le pot 1.15

Suppositoires à l'"Hazeline'

Astringents et calmants. Ils contiennent de l' 'Hazeline' pure et ne tachent pas le linge.

Boîtes de 12 ... ... la boîte 2.10

(Voir aussi Composé d' 'Hazeline' 'Enule,' *page* 219*)*

D'autres préparations sont également fournies sous la marque 'Hazeline.'

PRODUITS
Marque 'HEMISINE' de Fabrique

Les Produits 'Hemisine' présentent le principe actif de la moelle de la glande surrénale, sous une forme absolument pure et stable. Étant physiologiquement titrés, ils sont constants, uniformes et d'une action thérapeutique sûre.

'Hemisine' au 1000e Prix à Londres
(Marque de Fabrique) Fr.

Flacons ambrés de 5 cmc. bouchés à l'émeri... le flacon 1.25
,, ,, 10 cmc. ,, ,, 1.90

Un approvisionnement de Chlorure de Sodium 'Soloid,' 0 gr. 23, est fourni avec chaque flacon pour préparer des solutions salines normales.

'Hemisine' et Chlorhydrate de Cocaïne
(Marque de Fabrique)

Flacons ambrés de 10 cmc. bouchés à l'émeri le flacon 1.25

Chaque cmc. contient : 'Hemisine,' 0 gr. 00003, et Chlorhydrate de Cocaïne, 0 gr. 02

(Voir aussi 'Hemisine' 'Enule,' *page* 219, 'Hemisine' 'Tabloid' [Ophthalmique], *page* 238, 'Hemisine' 'Soloid,' *page* 256, 'Hemisine' 'Tabloid,' *page* 279 ; et 'Hemisine' 'Vaporole' *page* 309*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler' *(voir* Produits 'Kepler,' *page* 234*)*

Hypodermiques, Appareils: tels que Seringues, Aiguilles, etc. *(voir ci-dessous)*

Hypodermiques, Produits, marque 'Tabloid' *(voir page* 228 *et suivantes)*

Hypodermiques, Trousses de Poche, marque 'Tabloid' *(voir* la description et les illustrations, *page* 177, et les prix, *page* 205*)*

APPAREILS HYPODERMIQUES

Seringue Hypodermique Aseptique, B. W. & Cie, Tout en Verre

Cette seringue est entièrement en verre ; elle ne se dérange pas aisément et est facile à stériliser.

	Prix à Londres : la pièce Fr.
1 cmc. Complète avec deux aiguilles d'acier ordinaires	10.10
2 cmc. 4 ,, ,, ,, ,, ,,intramusculaires	15.10
3 cmc. 5 ,, ,, ,, ,, ,, ,,	17.65

Sans les aiguilles les seringues ci-dessus coûtent chacune Fr. 0.60 *de moins.*

Une barrette nickelée détachable, pour être employée avec cette seringue	0.65
Un support nickelé détachable, marque 'Tabloid,' pour être employé avec la Seringue Hypodermique Aseptique, B. W. & Cie, Tout en Verre	0.95
Étuis en métal nickelé, avec râtelier détachable	
Pour les seringues de 1 cmc. ou 2 cmc. 4	2.60
Pour la seringue de 3 cmc. 5	4.55

N.B.—Cette seringue peut s'adapter à toutes les Boîtes et Trousses marque 'Tabloid,' en remplacement de la Seringue en métal nickelé. Prix supplémentaire 1.25

Seringue Hypodermique Brevetée, B. W. & Cie, en Métal Nickelé

Cette seringue est munie d'un cylindre en verre et d'un piston en cuir. Les parties métalliques sont nickelées.

0 cmc. 9, ou 1 cmc. 2, complète avec deux aiguilles d'acier ordinaires et barrette 9.45

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Hypodermiques, Appareils *suite*

Prix à Londres la pièce Fr.

‡ Seringue Hypodermique Brevetée, B.W. & Cie, en Argent Massif

1 cmc. 2, d'un fini parfait, complète avec deux aiguilles de platine iridié et avec étui 37.80

‡ Seringue Hypodermique Dentaire, B. W. & Cie

Cette seringue possède les avantages suivants : Étant entièrement en nickel pur, sans aucun pas de vis, elle est rapidement démontable et facilement stérilisée dans l'étui servant de plateau ; les trois ajutages sont de diverses formes ; le volume de l'injection est réglé par une vis de sûreté ; la prise pour la main est parfaite, étant donnée par la poignée convexe et par la barrette qui se fixe à n'importe quel point de la seringue ; le tout favorise la sûreté de l'injection.

1 cmc. 8, avec barrette détachable, trois ajutages pour aiguilles et trois aiguilles d'acier.

Complète dans un étui de métal nickelé, avec gaine en peau de daim 37.80

‡ Seringue à Sérums Aseptique, B. W. & Cie, Tout en Verre

2 cmc.	Dans un étui de métal avec 2 aiguilles d'acier	18.90
3 cmc.	,, ,, ,, ,, ,,	22.05
5 cmc.	,, ,, ,, ,, ,,	25.25
10 cmc.	,, ,, ,, ,, ,,	37.80
25 cmc.	,, ,, ,, ,, ,,	41.00

N.B.—Si on le désire, cette seringue peut être munie d'aiguilles de platine iridié, à un prix supérieur.

RÉPARATIONS.—En cas de bris, la seringue endommagée sera échangée contre une seringue neuve, et la partie brisée seule sera facturée.

‡ Seringue à Sérums, Nickelée, B. W. & Cie

5 cmc. ou 10 cmc., complète avec deux aiguilles spéciales de platine iridié 31.50

‡ **Seringue à Sérums** de 10 cmc., nickelée, d'un fini moins parfait que la précédente, mais fonctionnant bien, dans un étui métallique, avec 2 aiguilles d'acier 18.90

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Hypodermiques, Appareils—*suite*

Gaines pour Étuis à Seringues

Prix à Londres : la pièce Fr.

En peau de daim, pour les étuis en métal contenant les Seringues à Sérums, B. W. & Cie, de 5 ou 10 cmc.... 1.90

N.B.—Si on le désire, au lieu du bourrelet ordinaire, les seringues ci-dessus sont fournies au même prix avec un bourrelet d'asbeste.

Aiguilles pour Seringues B. W. & Cie

N.B.—Les prix des aiguilles en platine iridié sont sujets aux fluctuations du marché.

N°		
	ORDINAIRES	
3.	Aiguille d'acier, fine, courte	0.35
6.	,, ,, ,, longueur moyenne	0.35
4.	,, ,, calibre moyen, courte	0.35
5.	,, ,, ,, ,, petite	0.35
7.	,, ,, ,, ,, longueur moyenne	0.35
8.	,, ,, ,, ,, longue	0.45
21:	,, de platine iridié	4.75
22.	,, ,, ,, fine	4.75
	EXPLORATRICES	
11.	Aiguille d'acier	0.95
25.	,, de platine iridié	13.85
	INTRAMUSCULAIRES	
13.	Aiguille d'acier, modèle H	0.45
26.	,, de platine iridié, modèle H	6.95
27.	,, ,, ,, très forte, 4 cm. 4 ...	13.65
	POUR L'OREILLE	
33.	Aiguille d'acier argenté	2.50
	DENTAIRES	
1.	Aiguille ordinaire, d'acier, fine, 1 cm. 25	0.35
2.	,, ,, ,, calibre moyen, 1 cm. 25	0.35
31.	,, courbée, d'acier argenté	1.25
30.	,, ,, ,, doré	1.25
20.	,, droite, de platine iridié, 1 cm. 25... ...	4.20
	LACRYMALES	
32.	Aiguille d'or massif	5.70
	POUR SERINGUE HYPODERMIQUE EN ARGENT MASSIF	
28.	Aiguille de platine iridié, avec monture en argent...	6.30

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Hypodermiques, Appareils—*suite*

Prix à Londres : la pièce Fr.

‡ Aiguilles pour Seringues de B. W. & Cie—*suite*

N° POUR SERINGUE A SÉRUMS, TOUT EN VERRE

9.	Aiguille d'acier, fine	0.65
10.	,, ,, calibre moyen	0.65
23.	,, de platine iridié	5.85
24.	,, ,, ,, fine, longue	7.55

POUR SERINGUE À SÉRUMS, NICKELÉE

12.	Aiguille d'acier, fine...	0.65
34.	,, de platine iridié	5.85
35.	,, ,, ,, fine, longue	7.55

POUR SERINGUE HYPODERMIQUE DENTAIRE

105.	Aiguilles aseptiques, sans ajutages, tubes de 6 aiguilles ... ... le tube	1.05

PRODUITS HYPODERMIQUES

Marque **'TABLOID'** de Fabrique

Le mot 'TABLOID' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque en faisant les commandes.

Les Produits Hypodermiques 'Tabloid' contiennent des médicaments d'une pureté et d'un dosage exceptionnels. Ils se dissolvent rapidement, leur activité est uniforme et ils se conservent parfaitement bien.

En prescrivant ou en faisant les commandes, il suffit d'indiquer le numéro distinctif, par exemple : Produit Hypodermique 'Tabloid' "36."

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)* **(Hypodermique)**—

Prix à Londres : le tube Fr.

N°		
‡ ,, 300.	Aconitine, Nitrate d', 0 gr. 0001	0.85
,, 71.	*Anesthésique, Composé, A	1.05

Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 0065
Chlorhydrate de Morphine ... 0 gr. 0013
Chlorure de Sodium ... 0 gr. 058
En dissoudre un dans 6 gr. 50 d'eau stérilisée

* *Tubes de* 12. *Les autres sont des tubes de* 20

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Hypodermiques, Produits 'Tabloid' *suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*

(Hypodermique)—

N°		Prix à Londres : le tube Fr.
,, 70.	*Anesthésique, Composé, B	1.05
	Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 013 Chlorhydrate de Morphine ... 0 gr. 0013 Chlorure de Sodium ... 0 gr. 058 En dissoudre un dans 6 gr. 50 d'eau stérilisée	
,, 80.	*Anesthésique, Composé, C	0.65
	Lactate d'Eucaïne ... ... 0 gr. 028 Chlorure de Sodium ... ... 0 gr. 255 Dissous dans 28 gr. 50 environ d'eau stérilisée, un produit donne une solution contenant 1 pour 1000 de Lactate d'Eucaïne et 9 pour 1000 de Chlorure de Sodium.	
,, 323.	Apomorphine, Chlorhydrate d', 0 gr. 0025 ...	0.65
,, 301.	,, ,, 0 gr. 005 ...	0.65
,, 93.	* { Apomorphine, Chlorhydrate d', 0 gr. 0065 Strychnine, Chlorhydrate de, 0 gr. 00108 }	0.85
,, 324.	Atropine, Sulfate d', 0 gr. 0005	0.65
,, 302.	,, ,, 0 gr. 001	0.65
,,	Atropine et Morphine *(voir* N° 325, *page* 231*)*	
,, 121.	{ Atropine, Sulfate d', 0 gr. 00032 Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 00065 } ...	0.85
,, 122.	{ Atropine, Sulfate d', 0 gr. 00043 Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 00081 } ...	0.85
,, 303.	*Caféine, Sodio-salicylate de, 0 gr. 03... ...	0.85
,, 328.	* ,, ,, 0 gr. 05... ...	0.85
,, 329.	* ,, ,, 0 gr. 10... ...	0.85
,, 23.	Cocaïne, Chlorhydrate de, 0 gr. 0065 ...	0.65
,, 304.	,, ,, 0 gr. 01 ...	0.65
,, 322.	* ,, ,, 0 gr. 015 ...	0.65
,, 305.	* ,, ,, 0 gr. 02 ...	0.65
,, 326.	* ,, ,, 0 gr. 03 ...	0.85
	Cocaïne, Composés de *(voir* Anesthésiques, Composés A et B*)*	
,, 327.	Codéine, Phosphate de, 0 gr. 015	0.85
,, 330.	*Cotarnine, Chlorhydrate de, 0 gr. 015 ...	0.85
,, 331.	* ,, ,, 0 gr. 025 ...	0.85
,, 46.	Curare, 0 gr. 0054	0.85
,, 30.	Digitaline amorphe, 0 gr. 00065	0.65
,, 86.	{ Digitaline amorphe, 0 gr. 00065 Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 00065 } ...	0.65

* *Tubes de* 12. *Les autres sont des tubes de* 20

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Hypodermiques, Produits 'Tabloid' *suite*

	N°	'TABLOID' *(Marque de Fabrique)* (Hypodermique)—	Prix à Londres : le tube Fr.
‡	,, 306.	Digitaline cristallisée, 0 gr. 0005	0.85
	,, 125.	Digitaline amorphe, 0 gr. 00065 Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 00065 Trinitrine, 0 gr. 00065 ...	0.85
	,, 130.	*Émétine, Chlorhydrate d', 0 gr. 022 ...	1.70
	,, 362.	*'Ergamine' *(Marque de Fabrique)* (β-iminazolyléthylamine), 0 gr. 001	0.85
	,, 38.	Ergotinine, Citrate d', 0 gr. 00032	0.85
‡	,, 307.	,, ,, 0 gr. 0005	0.85
	,, 92.	* Ergotinine, Citrate d', 0 gr. 00065 Morphine, Sulfate de, 0 gr. 011 ...	1.05
	,, 81.	* Ergotinine, Citrate d', 0 gr. 00065 Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 0032 ...	0.85
	,, 116.	*Ergotoxine, 0 gr. 00065	0.85
	,, 119.	* Ergotoxine, 0 gr. 00065 Morphine, Sulfate de, 0 gr. 011	1.05
	,, 120.	* Ergotoxine, 0 gr. 00065 Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 0032 ...	0.85
	,,	Ésérine *(voir plus loin* Physostigmine*)*	
	,, 79.	*Eucaïne, Chlorhydrate d', 0 gr. 022	0.65
	,, 78.	* ,, ,, 0 gr. 065	1.25
	,, 112.	*Eucaïne, Lactate d', 0 gr. 022	0.65
	,, 113.	* ,, ,, 0 gr. 065	1.25
	,, 102.	Héroïne, Chlorhydrate d', 0 gr. 0026 ...	0.65
‡	,, 101.	,, ,, 0 gr. 0054 ...	0.65
	,, 127.	,, ,, 0 gr. 011	0.85
‡	,, 332.	Homatropine, Chlorhydrate d', 0 gr. 00025 ...	0.85
‡	,, 334.	Hyoscine, Bromhydrate d', 0 gr. 0003 ...	0.65
‡	,, 100.	,, ,, 0 gr. 00065 ...	0.65
‡	,, 48.	* ,, ,, 0 gr. 00086 ...	0.65
	,, 95.	*Hyoscine, Composé A d'	1.05
		Bromhydrate d'Hyoscine 0 gr. 00065 Sulfate de Morphine ... 0 gr. 011 Sulfate d'Atropine ... ... 0 gr. 00036	
	,, 96.	*Hyoscine, Composé B d'	1.05
		Bromhydrate d'Hyoscine 0 gr. 00065 Sulfate de Morphine ... 0 gr. 016 Sulfate d'Atropine ... ... 0 gr. 00043	

* *Tubes de* 12. *Les autres sont des tubes de* 20

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Hypodermiques, Produits 'Tabloid' — *suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*

(Hypodermique)—

N°		Prix à Londres : le tube Fr.
,, 335.	*Hyoscyamine, Sulfate d', 0 gr. 001	0.85
,, 41.	* ,, ,, 0 gr. 0032	0.85
,, 308.	Mercure, Bichlorure de (Sublimé corrosif), 0 gr. 001	0.65
,, 28.	,, ,, ,, ,, 0 gr. 0022	0.65
,, 333.	,, ,, ,, ,, 0 gr. 01	0.65
,, 124.	Mercure, Succinimure de, 0 gr. 0065	0.65
,, 98.	,, ,, 0 gr. 013	0.65
,, 336.	Morphine, Chlorhydrate de, 0 gr. 005 ...	0.85
,, 309.	,, ,, 0 gr. 01 ...	0.85
,, 310.	,, ,, 0 gr. 015 ...	0.85
,, 311.	,, ,, 0 gr. 02 ...	0.85
,, 337.	* ,, ,, 0 gr. 03 ...	0.85
,, 132.	Morphine, Hypophosphite de, 0 gr. 016 ...	0.85
,, 133.	,, ,, 0 gr. 022 ...	0.85
,, 134.	* ,, ,, 0 gr. 032 ...	0.85
,, 135.	* ,, ,, 0 gr. 065 ...	1.25
,, 27.	Morphine, Méconate de, 0 gr. 008	1.05
,, 26.	,, ,, 0 gr. 011	1.05
,, 25.	,, ,, 0 gr. 016	1.05
,, 24.	,, ,, 0 gr. 022	1.05
,, 6.	Morphine, Sulfate de, 0 gr. 0054	0.85
,, 5.	,, ,, 0 gr. 008	0.85
,, 312.	,, ,, 0 gr. 01	0.85
,, 313.	,, ,, 0 gr. 015	0.85
,, 314.	,, ,, 0 gr. 02	0.85
,, 315.	* ,, ,, 0 gr. 03	0.85
,, 316.	* ,, ,, 0 gr. 05	1.05
,, 76.	* ,, ,, 0 gr. 065	1.25
,, 88.	Morphine, Tartrate de, 0 gr. 016	0.85
,, 74.	* { Morphine, Chlorhydrate de, 0 gr. 011 / Atropine, Sulfate d', 0 gr. 0009 } ...	0.85
,, 325.	{ Morphine, Chlorhydrate de, 0 gr. 01 / Atropine, Sulfate d', 0 gr. 0003 } ...	0.85
,, 12.	{ Morphine, Sulfate de, 0 gr. 0054 / Atropine, Sulfate d', 0 gr. 00026 } ...	0.85
,, 11.	{ Morphine, Sulfate de, 0 gr. 008 / Atropine, Sulfate d', 0 gr. 00032 } ...	0.85

* *Tubes de* 12. *Les autres sont des tubes de* 20

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Hypodermiques, Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*

(Hypodermique)—

	N°		Prix à Londres: le tube Fr.
,,	10.	Morphine, Sulfate de, 0 gr. 011 Atropine, Sulfate d', 0 gr. 00036	0.85
,,	9.	Morphine, Sulfate de, 0 gr. 016 Atropine, Sulfate d', 0 gr. 00043	0.85
,,	8.	Morphine, Sulfate de, 0 gr. 022 Atropine, Sulfate d', 0 gr. 00054	0.85
,,	85.	Morphine, Sulfate de, 0 gr. 022 Atropine, Sulfate d', 0 gr. 00108	0.85
,,	7. *	Morphine, Sulfate de, 0 gr. 032 Atropine, Sulfate d', 0 gr. 00065	0.85
,,	89.	Morphine, Sulfate de, 0 gr. 016 Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 00108	0.85
		Nitroglycérine *(voir* Trinitrine*)*	
		Nouvelle Tuberculine (W), (Humaine), contenant :	
,,	355. †	0 mgr. 00001 de substance bacillaire de tubercule	1.25
,,	356. †	0 mgr. 0001 ,, ,, ,,	1.25
,,	357. †	0 mgr. 001 ,, ,, ,,	1.25
		Nouvelle Tuberculine (W), Bovine, contenant :	
,,	358. †	0 mgr. 00001 de substance bacillaire de tubercule	1.25
,,	359. †	0 mgr. 0001 ,, ,, ,,	1.25
,,	360. †	0 mgr. 001 ,, ,, ,,	1.25
‡ ,,	339.	Physostigmine (Ésérine), Salicylate de, 0 gr. 0005	0.65
,,	84.	Picrotoxine, 0 gr. 00108	0.85
‡ ,,	338.	Pilocarpine, Chlorhydrate de, 0 gr. 001 ...	0.85
‡ ,,	34.	Pilocarpine, Nitrate de, 0 gr. 0065	0.95
‡ ,,	317.	,, ,, 0 gr. 01	1.25
‡ ,,	33. *	,, ,, 0 gr. 022	1.50
‡ ,,	32. *	,, ,, 0 gr. 032	1.90
,,	82. *	Potasse, Permanganate de, 0 gr. 13	0.65
‡ ,,	318. *	Quinine, Bromhydrate Basique de, 0 gr. 03 ...	0.85
‡ ,,	319. *	,, ,, ,, 0 gr. 05 ...	0.85
‡ ,,	83. *	Quinine, Chlorhydrate Neutre de (Bichlorhydrate), 0 gr. 065	0.65
‡ ,,	73. *	,, ,, ,, 0 gr. 194	0.85

* *Tubes de* 12. † *Tubes de* 6. *Les autres sont des tubes de* 20

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Hypodermiques, Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*

(Hypodermique)—

N°		Prix à Londres: le tube Fr.
,, 97.	*Quinine, Chlorhydrate Neutre de (Bichlorhydrate), 0 gr. 324	1.05
,, 103.	*Quinine, Sulfate Neutre (Bisulfate) de, 0 gr. 324	1.05
,, 56.	*Spartéine, Sulfate de, 0 gr. 032	0.85
,, 52.	Strophanthine, 0 gr. 00013	0.85
,, 109.	Strychnine, Chlorhydrate de, 0 gr. 00032 ...	0.65
,, 110.	,, ,, 0 gr. 00065 ...	0.65
,, 111.	,, ,, 0 gr. 0022 ...	0.65
,, 320.	Strychnine, Nitrate de, 0 gr. 0005	0.65
,, 321.	,, ,, 0 gr. 001	0.65
,, 62.	,, ,, 0 gr. 0043	0.85
,, 61.	,, ,, 0 gr. 0065	0.85
,, 18.	Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 00043	0.65
,, 17.	,, ,, 0 gr. 00065	0.65
,, 16.	,, ,, 0 gr. 00108	0.65
,, 104.	,, ,, 0 gr. 0013	0.65
,, 99.	,, ,, 0 gr. 0016	0.65
,, 75.	,, ,, 0 gr. 0022	0.65
,, 123.	,, ,, 0 gr. 0032	0.65
,, 126.	Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 0013; Trinitrine (Nitroglycérine), 0 gr. 00065 ...	0.65
,, 65.	Trinitrine (Nitroglycérine), 0 gr. 00026 ...	0.65
,, 115.	,, ,, 0 gr. 00065 ...	0.65
,,	Tuberculine *(voir* Nouvelle Tuberculine [W], *page* 232*)*	
,, 361.	*'Tyramine' (Para-hydroxyphényléthylamine), *(Marque de Fabrique)* 0 gr. 02	1.65

D'autres produits hypodermiques sont également fournis sous la marque 'Tabloid.'

Indicateurs 'Soloid' de Réaction *(voir page* 262*)*

Inhalateur au Chlorhydrate d'Ammoniaque marque 'Vaporole' *(voir page* 310*)*

Jus Wyeth de Viande de Bœuf *(voir page* 310*)*

* *Tubes de* 12. *Les autres sont des tubes de* 20

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par, tous les pharmaciens

PRODUITS DE MALT

Marque **'KEPLER'** de Fabrique

AVIS IMPORTANT. Comme il existe de nombreuses imitations des Produits de Malt 'Kepler,' il est recommandé de se prémunir contre toute substitution, la valeur des produits de malt variant beaucoup selon leur mode de préparation. On devra donc toujours insister pour obtenir les véritables PRODUITS 'KEPLER.'

‡ Extrait de Malt 'Kepler'—

L'Extrait de Malt 'Kepler' constitue la "moelle du malt." Il présente les enzymes et l'essence concentrée des constituants nutritifs du malt de l'orge la plus fine.

	Prix à Londres: le flacon Fr.
Flacons	2.30
Grands flacons	4.10

Fourni aussi en bidons de ½ kilo et 1 kilo aux mêmes prix respectifs.

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC ALIMENT CHIMIQUE *(Composé de Phosphates)*—

Renferme par 100 cmc.: Phosphate de Fer, 0 gr. 15; Phosphate de Chaux, 0 gr. 70; Phosphate de Soude, 0 gr. 056; Phosphate de Potasse, 0 gr. 056.

En flacons 3.50

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC CASCARA SAGRADA—

Renferme 1 gr. 37 d'Extrait de Cascara Sagrada par 100 cmc.

En flacons 3.00

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC CITRATE DE FER ET DE QUININE—

Renferme 1 gr. 70 de Citrate de Fer et de Quinine par 100 cmc.

En flacons 3.50

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC FER—

Renferme 0 gr. 90 de Pyrophosphate de Fer Soluble par 100 cmc.

En flacons 2.50

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC FER, QUININE ET STRYCHNINE *(Easton)*—

Renferme par 100 cmc.: Phosphate de Fer, 0 gr. 118; Phosphate de Quinine, 0 gr. 084; Phosphate de Strychnine, 0 gr. 0035.

En flacons 3.50

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC HÉMOGLOBINE—

Renferme 2 gr. d'hémoglobine par 100 cmc.

En flacons 2.75

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Kepler,' Produits de Malt—*suite*

Prix à Londres : le flacon Fr.

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC HYPOPHOSPHITES—

Renferme par 100 cmc. : Hypophosphite de Chaux, 1 gr. 82 ; Hypophosphite de Potasse, 0 gr. 90 ; Hypophosphite de Soude, 0 gr. 90.

Flacons 2.75

Grands flacons 5.00

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC IODURE DE FER—

Renferme 0 gr. 15 d'Iodure de Fer par 100 cmc.

En flacons 3.00

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC PEPSINE—

Renferme 0 gr. 90 de Pepsine pure par 100 cmc.

En flacons 3.00

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC PEPSINE ET PANCRÉATINE—

Renferme 0 gr. 90 de Pepsine pure et de Pancréatine pure par 100 cmc.

En flacons 3.00

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC PHOSPHORE—

Renferme 0 gr. 0035 de Phosphore pur par 100 cmc.

En flacons 3.00

EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' AVEC VIANDE DE BŒUF ET FER—

Renferme par 100 cmc. : Extrait de Viande de Bœuf, 1 gr. 85 ; Citrate de Fer ammoniacal, 0 gr. 225.

En flacons 3.00

Huile de Foie de Morue avec l'Extrait de Malt 'Kepler'—

Présente l'huile de foie de morue la plus fine incorporée dans l'Extrait de Malt 'Kepler' de telle façon que l'assimilation en est absolument assurée.

Flacons 2.30

Grands flacons 4.10

Fournie aussi en bidons de ½ kilo et 1 kilo aux mêmes prix respectifs.

HUILE DE FOIE DE MORUE AVEC L'EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' ET ALIMENT CHIMIQUE *(Composé de Phosphates)*—

Renferme par 100 cmc. : Phosphate de Fer, 0 gr. 45 ; Phosphate de Chaux, 0 gr. 70 ; Phosphate de Soude, 0 gr. 05 ; Phosphate de Potasse, 0 gr. 05.

En flacons 3.50

'Kepler,' Produits de Malt *suite*

Prix à Londres : le flacon Fr.

HUILE DE FOIE DE MORUE AVEC L'EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' ET HYPOPHOSPHITES—

Renferme par 100 cmc. : Hypophosphite de Chaux, 0 gr. 90 ; Hypophosphite de Potasse, 0 gr. 45 ; et Hypophosphite de Soude, 0 gr. 45.

Flacons 2.75

Grands flacons 5.00

HUILE DE FOIE DE MORUE AVEC L'EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' ET IODURE DE FER—

Renferme 0 gr. 45 d'Iodure de Fer par 100 cmc.

En flacons 3.00

HUILE DE FOIE DE MORUE AVEC L'EXTRAIT DE MALT 'KEPLER' ET PHOSPHORE—

Renferme 0 gr. 035 de Phosphore pur par 100 cmc.

En flacons 3.00

D'autres préparations sont également fournies sous la marque 'Kepler.'

Lint *(voir* Charpie 'Tabloid,' *page* 241*)*

Malléine 'Wellcome,' *pour le diagnostic de la Morve.* Ampoules de 1 cmc. *(suffisant pour une injection)* ... ... l'ampoule Fr. 1.00

Malt, Extrait de *(voir* Produits 'Kepler,' *page* 234*)*

Menthol, Emplâtres Composé de (B. W. & Cie)

Procurent l'action continue du menthol contre les douleurs locales. Dimensions en cm. : 18.5 × 12.5 ; chaque emplâtre est dans une boîte de fer-blanc : la pièce 0.90

Rouleaux de 0 m. 90, en boîtes de fer-blanc ...chaque 4.10

Menthol, Composé de (pour priser) (B.W. & Cie)

En boîtes de métal émaillées rappelant les anciennes tabatières, or sur fond noir ... ... la boîte 0.65

Microscopie, Colorants 'Soloid' pour la *(voir page* 262*)*

Milieux de Culture 'Soloid' *(voir page* 263*)*

Mucine *(en paillettes)*

Flacons de 28 gr. ... ... le flacon 5.65

(Voir aussi pages 217, 258 *et* 286*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

"Neige 'Hazeline'" (*"'Hazeline' Snow"*) — Prix à Londres Fr.
(Marque de Fabrique) *(Trade Mark)*

(Voir 'Hazeline' et ses Préparations, *page* 223*)*

Nessler, Réactif

(Voir Produits 'Soloid' pour Analyses, *page* 261*)*

'Nizin'—Sel de Zinc de l'Acide Sulfanilique
(Marque de Fabrique)

Flacons de	28 gr.	le flacon	1.25
,,	112 gr.	,,	4.40
,,	450 gr.	,,	15.10

(Voir aussi 'Nizin' 'Soloid,' *page* 259*)*

'Opa,' DENTIFRICE LIQUIDE
(Marque de Fabrique)

Dentifrice liquide aromatique fortement antiseptique

Flacons de	55 cmc. (avec stilligouttes)	le flacon	1.50
,,	112 cmc. ,,	,,	2.50

Ophthalmiques 'Soloid,' Produits *(voir page* 239*)*

Ophthalmiques 'Tabloid,' Produits *(voir ci-dessous)*

Ophthalmiques 'Tabloid,' Trousses de Poche *(voir page* 207*)*

PRODUITS
OPHTHALMIQUES
Marque 'TABLOID' de Fabrique

Le mot 'TABLOID' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie.

Les Produits Ophthalmiques 'Tabloid,' d'une grosseur minuscule, et minces comme du papier, contiennent des médicaments d'un dosage exact et d'une pureté exceptionnelle, préparés avec une base tout à fait inoffensive qui se dissout rapidement.

En prescrivant ou en faisant les commandes, il suffit d'indiquer la lettre distinctive, ainsi: "Produit Ophthalmique 'Tabloid' A."

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)* — Prix à Londres : le tube Fr.
(Ophthalmique)—

,, T	Alun	0 gr. 00026	0.95
,, EE	Argyrol	0 gr. 0027	0.95
,, X	Atropine, Sulfate d'	0 gr. 00011	0.95
,, LL	,, ,, ...	0 gr. 0003	0.95
,, MM *	,, ,, ...	0 gr. 003 ...	0.95

* *Tubes de* 12. *Les autres sont des tubes de* 25

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Ophthalmiques, Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*
(Ophthalmique)—

				Prix à Londres : le tube Fr.
,,	KK	Atropine, Bromhydrate d' ...	0 gr. 0003	0.95
		Cocaïne, Chlorhydrate de ...	0 gr. 0003	
,,	AA	Cocaïne, Chlorhydrate de ...	0 gr. 0013	0.95
‡ ,,	NN	* ,, ,, ...	0 gr. 003 ...	0.95
,,	BB	Dionin	0 gr. 0005	0.95
,,	FF	* ,, ...	0 gr. 005 ...	0.95
,,	OO	Duboisine, Sulfate de	0 gr. 00025	0.95
,,	AC	*'Epinine' ... ... *(Marque de Fabrique)*	0 gr. 006 ...	1.25
,,		Ésérine *(voir* Physostigmine*)*		
,,	Y	*Euphtalmine, Chlorhydrate d'	0 gr. 0016	0.95
,,	Z	*Fluorescéine	0 gr. 00026	0.95
,,	CC	*'Hemisine' ... ... *(Marque de Fabrique)*	0 gr. 0006	1.25
‡ ,,	SS	Homatropine, Chlorhydrate d'	0 gr. 00015	0.95
‡ ,,	E	* ,, ,,	0 gr. 0016	0.95
,,	TT *	Homatropine, Chlorhydrate d'	0 gr. 00025	0.95
		Cocaïne, Chlorhydrate de...	0 gr. 0025	
,,	W *	Homatropine, Chlorhydrate d'	0 gr. 0013	0.95
		Cocaïne, Chlorhydrate de...	0 gr. 0013	
‡ ,,	U	Hyoscine, Bromhydrate d' ...	0 gr. 00011	0.95
,,	AD	Physostigmine, Salicylate de ...	0 gr. 000016	0.95
,,	GG	,, ,, ...	0 gr. 000032	0.95
‡ ,,	PP	,, ,, ...	0 gr. 0001	0.95
,,	RR *	Physostigmine, Salicylate de ...	0 gr. 0001	0.95
		Tropacocaïne, Chlorhydrate de,	0 gr. 0006	
,,	AE	Pilocarpine, Nitrate de ...	0 gr. 000022	0.95
‡ ,,	K	,, ,, ...	0 gr. 00016	0.95
‡ ,,	M	Pilocarpine, Nitrate de ...	0 gr. 00013	0.95
		Cocaïne, Chlorhydrate de ...	0 gr. 00032	
,,	UU	*Tropacocaïne, Chlorhydrate de	0 gr. 002 ...	0.95
,,	XX	Tuberculine	0 gr. 0002	1.90

Des produits de Contrôle Ophthalmique 'Tabloid' sont donnés avec chaque tube de Tuberculine Ophthalmique 'Tabloid.'

‡ ,,	WW	Zinc, Sulfate de	0 gr. 00025	0.95
,,	DD *	Zinc, Sulfate de	0 gr. 00026	0.95
		Cocaïne, Chlorhydrate de ...	0 gr. 0032	

D'autres produits ophthalmiques sont également fournis sous la marque 'Tabloid.'

* *Tubes de* 12. *Les autres sont des tubes de* 25

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

PRODUITS OPHTHALMIQUES

Marque **'SOLOID'** de Fabrique

Le mot 'SOLOID' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie.

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)* **(Ophthalmique)**— Prix à Londres Fr.

‡ „ J Sublimé Corrosif (Bichlorure de Mercure), 0 gr. 000065, tubes de 25 ... ... le tube 0.65

(Pour d'autres produits 'Soloid' employés pour l'ophthalmologie, voir pages 254 à 260)

Ouate *(voir* Coton 'Tabloid,' *page* 241*)*

'Panopepton' *(voir* Produits Digestifs 'Fairchild,' *page* 221*)*

Pansements Chirurgicaux 'Tabloid' *(voir ci-après)*

‡ PANSEMENTS PLIÉS ET COMPRIMÉS

Marque **'TABLOID'** de Fabrique

L'introduction en médecine des Bandes et Pansements Pliés et Comprimés, marque 'Tabloid,' constitue un progrès important dans la préparation des accessoires chirurgicaux.

Progrès important

Ces bandes et pansements sont fabriqués avec des matériaux de la meilleure qualité, et sont soumis à une forte pression sous laquelle ils prennent une forme rectangulaire. Après compression, chacun d'eux est automatiquement entouré d'une enveloppe de parchemin imperméable.

Les conditions requises par la chirurgie moderne sont remplies si imparfaitement par beaucoup des pansements ordinaires du commerce, que la grande supériorité des produits de la maison Burroughs Wellcome & Cie est indiscutable. Leurs importants avantages peuvent être résumés ainsi :

1. Seuls des matériaux de qualité exceptionnelle entrent dans leur fabrication, et leur excellence défie toute critique.

2. Ils occupent le plus petit espace possible, et cependant ils peuvent être déployés aussi aisément que le pansements ordinaires.

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Pansements Pliés et Comprimés marque 'Tabloid'—*suite*

3. Il se conservent exempts de tout risque de contamination.

4. Ils sont médicamentés d'une façon uniforme sur tous les points de leur surface.

5. En raison de leur volume extrêmement réduit, ces pansements sont très commodes à transporter dans une valise ou une sacoche de bicyclette.

La figure suivante fait voir d'une façon graphique la différence de volume entre une bande ordinaire et une Bande Pliée 'Tabloid.'

Graphique montrant la différence de volume entre une bande ordinaire et une Bande Pliée 'Tabloid.' Chaque bande mesure 5 m. 50 × 6 cm. 25.

Ces pansements sont aussi fournis *stérilisés* dans des enveloppes imperméables spéciales. Les conditions voulues pour la chirurgie aseptique, et si insuffisamment observées dans la plupart des pansements ordinaires, sont remplies d'une façon idéale dans ces produits pliés et stérilisés.

	Prix à Londres Fr.
‡**Bandage Ajustable pour la Tête, Comprimé, marque 'Tabloid'** ... ... chaque	1.05

(Créé et introduit par Burroughs Wellcome & Cie)

‡**Bandes Pliées et Comprimées, marque 'Tabloid'**—

Flanelle, 6 cm. 25 × 4 m. 50	la bande	1.25
,, 6 cm. 25 × 4 m. 50, *stérilisée*	,,	1.35
Tissu à jour, 2 cm. 5 × 5 m. 50 ...	,,	0.30
,, 2 cm. 5 × 5 m. 50, *stérilisée*	,,	0.35
,, 6 cm. 25 × 5 m. 50 ...	,,	0.45
,, 6 cm. 25 × 5 m. 50, *stérilisée*	,,	0.50
Triangulaires (Dessins), paquets de deux, le paquet		0.95
,, ,, *stérilisées*	,, ,,	1.05

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Pansements Pliés et Comprimés marque 'Tabloid'—*suite*

‡Charpie (ou Lint) Pliée et Comprimée, marque 'Tabloid'—

		Prix à Londres : le paquet Fr.
Simple,	paquets de chacun 28 gr.	0.30
,,	,, ,, ,, 55 gr.	0.50
,,	,, ,, ,, 28 gr., *stérilisée* ...	0.40
,,	,, ,, ,, 55 gr., *stérilisée* ...	0.60
Boriquée,	paquets de chacun 28 gr.	0.30
,,	,, ,, ,, 55 gr.	0.45
,,	,, ,, ,, 28 gr., *stérilisée* ...	0.35
,,	,, ,, ,, 55 gr., *stérilisée* ...	0.50
Phéniquée,	paquets de chacun 28 gr.	0.40
,,	,, ,, ,, 28 gr., *stérilisée* ...	0.45

‡Coton Plié et Comprimé, marque 'Tabloid'—

Absorbant,	paquets de chacun 28 gr. subdivisés en 4	0.40
,,	,, ,, ,, 28 gr.	0.30
,,	,, ,, ,, 55 gr.	0.45
,,	,, ,, ,, 28 gr., *stérilisé* ...	0.35
,,	,, ,, ,, 55 gr., *stérilisé* ...	0.50
Boriqué,	paquets de chacun 28 gr.	0.30
,,	,, ,, ,, 55 gr.	0.45
,,	,, ,, ,, 28 gr., *stérilisé* ...	0.35
,,	,, ,, ,, 55 gr., *stérilisé* ...	0.50
Au Cyanure Double, 3%,	paquets de chacun 28 gr.	0.40
,,	,, ,, ,, 55 gr.	0.60
,,	,, ,, ,, 28 gr., *stérilisé* ...	0.45
,,	,, ,, ,, 55 gr., *stérilisé* ...	0.65
Iodoformé,	paquets de chacun 28 gr.	0.75
,,	,, ,, ,, 55 gr.	1.25
,,	,, ,, ,, 28 gr., *stérilisé* ...	0.85
,,	,, ,, ,, 55 gr., *stérilisé* ...	1.35

‡Filasse Phéniquée, Pliée et Comprimée, marque 'Tabloid'—

Paquets de chacun 55 gr.	0.40
,, ,, ,, 55 gr., *stérilisée*	0.45

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Pansements Pliés et Comprimés marque 'Tabloid' *suite*

Prix à Londres : le paquet Fr.

‡Gaze Pliée et Comprimée, marque 'Tabloid'—

Absorbante,	2 m. 75	0.65
,,	2 m. 75, *stérilisée*	0.70
		la boîte de 6 Fr.
Au Bismuth,	0 m. 90 × 1 cm. 25, *stérilisée** ...	1.70
,,	0 m. 90 × 2 cm. 5, *stérilisée**	1.90
,,	0 m. 90 × 5 cm., *stérilisée** ...	2.30
,,	0 m. 90 × 7 cm. 5, *sterilisée**	2.75
		le paquet Fr.
,,	2 cm. 5 × 5 m. 50	0.85
,,	2 cm. 5 × 11 m.	1.45
,,	5 cm. × 5 m. 50	1.05
,,	5 cm. × 11 m.	1.90
,,	7 cm. 5 × 5 m. 50	1.25
,,	7 cm. 5 × 11 m.	2.35
,,	2 m. 75 × 0 m. 90	1.55
,,	2 m. 75 × 0 m. 90, *stérilisée*	1.65
Boriquée,	2 m. 75	0.80
,,	2 m. 75, *stérilisée*	0.85
Au Cyanure Double,	3%, 2 m. 75	0.80
,,	,, ,, 2 m. 75, *stérilisée* ...	0.85
Iodoformée,	0 m. 90	0.65
,,	0 m. 90, *stérilisée*	0.70
,,	2 m. 75	1.55
,,	2 m. 75, *stérilisée*	1.65
,,	5 m. 50 × 2 cm. 5	0.85
,,	5 m. 50 × 2 cm. 5, *stérilisée*	0.90
Au Sel Alembroth,	1%, 2 m. 75	0.75
,,	,, ,, 2 m. 75, *stérilisée*	0.80

* Ces pansements ne sont pas fournis Pliés et Comprimés

‡Gaze Ouatée, Pliée et Comprimée, marque 'Tabloid'—

Paquets de chacun	55 gr.	0.45
,, ,, ,,	55 gr., *stérilisée*	0.55

'Paroleine'—Huile inodore, incolore, insipide et parfaitement inaltérable, employée principalement comme dissolvant.
(Marque de Fabrique)

Flacons de 112 cmc.	... ... le flacon	0.95
,, 520 cmc.	... ... ,,	2.50

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Paroleine,' Vaporisateur *(voir* Vaporisateur, *page* 307*)*

Pastilles marque 'Tabloid' *(voir ci-après)*

PASTILLES 'TABLOID'

(Marque de Fabrique)

Les Pastilles 'Tabloid' fournissent les moyens d'appliquer des médicaments aux muqueuses de la bouche et de la gorge, d'une façon graduelle et prolongée. Ces médicaments sont présentés sous une forme agréable qui permet d'administrer commodément les remèdes astringents, antiseptiques, anesthésiques, expectorants et laxatifs. La base de ces pastilles, étant adoucissante, augmente beaucoup la valeur des ingrédients.

PASTILLES 'TABLOID'

(Marque de Fabrique)

N°		Prix à Londres Boîtes de deux grandeurs La boîte Fr.	La boîte Fr.
2.	**Acide Benzoïque, Composé d'** ...	0.85	1.65
	Acide Benzoïque ... ... 0 gr. 032 Codéine ... ... 0 gr. 0065 Menthol ... ... 0 gr. 0065 Ipécacuanha en Poudre ... 0 gr. 0065 Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 0016 Gomme Rouge ... ... 0 gr. 032 Essence de Menthe Poivrée *q.s.* *(Voir aussi page* 265*)*		
1.	Ammoniaque et Réglisse, Chlorhydrate d',	0.65	1.25
	Chaque produit renferme 0 gr. 065 de Chlorhydrate d'Ammoniaque		
3.	Cocaïne, Chlorhydrate de, 0 gr. 0065 ...	0.65	1.25
4.	Codéine, 0 gr. 008...	0.95	1.90
18.	**Fruit Laxatif**	1.25	2.50
	Chaque produit contient 0 gr. 324 d'extrait du fruit du Séné		
5.	Glycérine	0.65	1.25
6.	Glycérine et Cassis	0.65	1.25
7.	Glycérine, Tanin et Cassis	0.65	1.25
8.	Glycérine, Tanin, Capsicum et Cassis ...	0.65	1.25
14.	Gomme Rouge et Cocaïne	0.65	1.25
	Gomme Rouge ... ... 0 gr. 065 Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 0032		
19.	**Goudron Végétal, Composé de** ...	0.65	1.25
	Chaque produit contient Goudron, Térébène, Benjoin, Tolu, Ipécacuanha, etc.		
11.	Graine de Lin, Réglisse et Chlorodyne ...	0.65	1.25
	Chaque produit contient 0 gr. 00054 de Chlorhydrate de Morphine		

Pastilles 'Tabloid'—*suite*

N°		Prix à Londres Boîtes de deux grandeurs La boîte Fr.	La boîte Fr.
10.	Jus de Citron	0.65	1.25
16.	Menthol, 0 gr. 008...	0.65	1.25
17.	Menthol et Eucalyptus	0.65	1.25
	Menthol ... ... 0 gr. 0032 Essence d'Eucalyptus *1 gtt. 25 (0 cmc. 03)		
12.	Morphine et Ipécacuanha	0.65	1.25
	Chlorhydrate de Morphine 0 gr. 0018 Ipécacuanha en Poudre ... 0 gr. 0054		
20.	**Pectorales**	0.85	1.65
	Contiennent Réglisse, Scille, Tolu, Polygala, Écorce de Cerisier, Ipécacuanha, etc.		
13.	'Pinol,' *2 gtt. 5 (0 cmc. 059)	0.65	1.25
15.	Ratanhia, Menthol et Cocaïne	0.65	1.25
	Extrait de Ratanhia ... 0 gr. 13 Menthol ... ... 0 gr. 0032 Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 0032		

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

'Pepana' *(voir* Produits marque 'Tabloid,' *page* 287*)*

'Pepsencia' ... **Pepsine** ...
Peptogenic Milk Powder ...
'Pepule,' Produits marque
(Voir Produits Digestifs 'Fairchild,' *pages* 221 *et* 222*)*

Pharmacies Portatives marque 'Tabloid' *(voir pages* 210 *à* 213*)*

Phénacétine marque 'Tabloid' *(voir* Produits 'Tabloid,' *page* 287*)*

'Phenofax,' ONGUENT A L'ACIDE PHÉNIQUE
(Marque de Fabrique)

Prix à Londres Fr.

Renferme 4 pour cent de Phénol pur dans un véhicule adoucissant.

Pots de verre ... ... le pot 1.05

Photographie, Produits pour la *(voir la page suivante)*

Photographique, Appareil 'Tabloid'

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*

,, Appareil Photographique ... ... l'appareil 30.25

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

PRODUITS MARQUE 'TABLOID'

POUR LA

PHOTOGRAPHIE

Le mot 'TABLOID' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie.

Les Produits Chimiques 'Tabloid' pour la Photographie sont beaucoup plus commodes que les produits ordinaires. On n'a pas à les peser, et leur qualité supérieure ainsi que leur dosage exact assurent les meilleurs résultats.

Révélateurs

Les révélateurs sont empaquetés dans des boîtes en carton avec l'accélérateur 'Tabloid' correspondant.

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)* (Photographique)—	Prix à Londres : la boîte Fr.
,, 'Rytol,' Révélateur Universel ... ... *(Marque de Fabrique)*	1.25
Chaque boîte contient :—'Rytol' 'Tabloid' et Accélérateur pour 'Rytol'—22 de chacun.	
,, Révélateur à l'Amidol	1.25
Chaque boîte contient :—Amidol 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Amidol—22 de chacun.	
,, Révélateur à l'Édinol	1.25
Chaque boîte contient :—Édinol 'Tabloid' et Accélérateur pour Édinol 'Tabloid'—22 de chacun.	
,, Révélateur à la Glycine	1.25
Chaque boîte contient :—Glycine 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Glycine—22 de chacun.	
,, Révélateur à l'Hydroquinone (Quinol)	1.25
Chaque boîte contient :—Hydroquinone 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Hydroquinone — 40 de chacun.	
,, Révélateur à l'Iconogène	1.25
Chaque boîte contient :—Iconogène 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Iconogène—40 de chacun.	
,, Révélateur au Métol	1.25
Chaque boîte contient :—Métol 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Métol—22 de chacun.	
,, Révélateur au Métol-Quinol	1.25
Chaque boîte contient :—Métol-Quinol 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Métol-Quinol — 22 de chacun.	
,, Révélateur à l'Ortol	1.25
Chaque boîte contient :—Ortol 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Ortol—22 de chacun.	

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

Photographie, Produits 'Tabloid' pour la—*suite*

Révélateurs—*suite*

Prix à Londres : la boite Fr.

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)* (Photographique)—

,, Révélateur au Paramidophénol 1.25

Chaque boite contient :—Paramidophénol 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Paramidophénol—22 de chacun.

,, Révélateur au Pyro 1.25

Chaque boite contient :—Acide Pyrogallique 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Pyro—40 de chacun.

,, Révélateur au Pyro-Métol *(Formule Normale "Imperial")* 1.25

Chaque boite contient : Composé de Pyro-Métol 'Tabloid' et Accélérateur 'Tabloid' pour Pyro-Métol —22 de chacun.

,,*Révélateur au Pyro-Soude *(Formule "Ilford")* ... 1.25

(Destiné spécialement au développement des Plaques "Ilford")

Chaque boite contient :—Acide Pyrogallique 'Tabloid' et Composé de Soude 'Tabloid'—40 de chacun.

N.B.—Outre les révélateurs complets ci-dessus mentionnés, on fournit le 'Rytol' 'Tabloid,' l'Amidol, l'Edinol, la Glycine, l'Hydroquinone (Quinol), l'Iconogène, le Métol, le Métol-Quinol, l'Ortol, le Paramidophénol, le Pyro et le Pyro-Métol sans leurs accélérateurs, en tubes, à Fr. 0.95 le tube, et les accélérateurs séparément à Fr. 0.65.

* En commandant ce révélateur spécial, il faut toujours spécifier Formule "Ilford."

Auxiliaires

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)* (Photographique)—

Le flacon ou tube Fr.

,, AFFAIBLISSEURS—

Ferricyanure de Potassium 'Tabloid' tubes de 22 0.65

Persulfate d'Ammoniaque 'Tabloid' ,, 15 0.65

,, ALCALI—

Carbonate de Soude 'Tabloid' ... flacons de 22 0.65

,, BAIN POUR DURCIR—

Alun 'Tabloid' ... ... flacons de 30 0.65

,, BAIN POUR ÉCLAIRCIR ET DURCIR—

Composé d'Alun et d'Acide Citrique, 'Tabloid,' flacons de 25 0.65

,, FIXATEUR—

Thiosulfate de Soude (Hypo), Déshydraté, 'Tabloid' ... ... flacons de 25 0.65

Chaque produit représente 3 gr. de Thiosulfate de Soude cristallisé.

Photographie, Produits 'Tabloid' pour la—*suite*

Auxiliaires—*suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)* (Photographique)—		Prix à Londres : le flacon ou tube Fr.
,, PRÉSERVATEURS—		
Métabisulfite de Potasse 'Tabloid'...	flacons de 25	0.65
Sulfite de Soude, Déshydraté, 'Tabloid'	,, 50	0.65
,, RENFORÇATEURS—		
Renforçateur au Chrome 'Tabloid'	flacons de 25	0.65
Iodure de Mercure et Sulfite de Soude 'Tabloid,'	tubes de 15	0.65
,, RETARDATEURS—		
Bromure d'Ammonium 'Tabloid' ...	tubes de 30	0.65
Bromure de Potassium 'Tabloid' ...	,, 30	0.65
Citrate de Soude 'Tabloid'... ...	,, 25	0.65
,, SENSIBILISATEUR—		
Chromate de Potasse et d'Ammoniaque 'Tabloid' *(pour papier au charbon, etc.)* ...	tubes de 6	0.65

Bains de Virage

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)* (Photographique)—		La boîte ou le tube Fr.
,, **Virage Sépia** *(pour plaques pour projections et épreuves au bromure)*	la boîte	1.25
Chaque boîte contient : Composé pour Blanchir 'Tabloid' et Composé de Sulfure de Sodium 'Tabloid'—12 de chacun.		
,, Composé pour Blanchir, tubes de 12 ...	... le tube	0.65
,, Composé de Ferrocyanure de Cuivre *(pour virer les épreuves au bromure et les plaques pour projections)*, tubes de 15	le tube	0.65
,, Composé de Platine *(pour virer le papier mat ordinaire P.O.P.)*, tubes de 9 ...	le tube	1.65
,, Composé de Sulfure de Sodium, tubes de 12	le tube	0.65
,, Chlorure d'Or avec Borax	B 1, la boîte	1.25
,, Chlorure d'Or avec Bicarbonate de Soude	B 2, la boîte	1.25
,, Chlorure d'Or avec Phosphate de Soude	B 3 la boîte	1.25
,, Chlorure d'Or avec Tungstate de Soude	B 4, la boîte	1.25
,, Chlorure d'Or avec Composé de Formiate de Soude (Formiate de Soude et Bicarbonate de Soude)	B 5, la boîte	1.25
,, Chlorure d'Or avec Composé de Sulfocyanure (Sulfocyanure d'Ammonium et Sulfite de Soude)	B 6, la boîte	1.25

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

Photographie, Produits 'Tabloid' pour la *suite*

Bains de Virage—*suite*

Prix à Londres : la boîte ou le tube Fr.

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*
(Photographique)—

,, Chlorure d'Or avec Composé de Thiosulfate *(Viro-fixateur pour épreuves ordinaires P.O.P.)* B 10, la boîte 1.25

Pour faciliter les commandes, désigner les formules qui précèdent par leurs numéros respectifs, par exemple : Chlorure d'Or 'Tabloid' (B1), (B2), etc. Chaque boîte renferme un nombre suffisant de produits pour préparer six bains de virage de 150 à 300 cmc. ou plus.

,, Virage Bleu *(pour papiers à la lumière du gaz, épreuves au bromure ou plaques pour projections)*, la boîte 1.25

Chaque boîte contient deux tubes — 12 produits dans chaque.

,, Virage Vert *(pour papiers à la lumière du gaz, épreuves au bromure ou plaques pour projections)*, la boîte 1.25

Chaque boîte contient deux tubes — 12 produits dans chaque.

Pour Photographie Directe en Couleurs

(Avec plaques Autochromes, Dufay, Omnicolores, etc.)

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*
(Photographique)—

,, Composé Renversateur ... ... le tube de 15 1.25

,, Renforçateur pour plaques en Couleurs la boîte 1.25

D'autres produits photographiques sont également fournis sous la marque 'Tabloid.'

Colorants 'Soloid' pour la Photographie

Permettent d'obtenir des effets de coloration frappants et originaux par simple immersion de la diapositive ou de l'épreuve au bromure, au platine, etc., dans une solution du produit de la teinte désirée. La coloration est permanente.

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*
(Photographique)—

Prix à Londres Fr.

,, Bleu, tubes de 6 ... ... le tube 0.65

,, Jaune ,, ,, ... ,, 0.65

,, Rouge ,, ,, ... ,, 0.65

,, Saumon,, ,, ... ,, 0.65

,, Vert ,, ,, ... ,, 0.65

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

‡PHOTOGRAPHIC EXPOSURE RECORD AND DIARY, THE 'WELLCOME'

(Agenda Photographique 'Wellcome') (En anglais)

Cette encyclopédie de poche constitue un guide complet et compact pour le photographe. Elle contient un calculateur mécanique qui indique correctement, par la simple rotation d'une seule échelle, le temps de pose pour toutes les circonstances et dans toutes les conditions. Les tables mensuelles de lumière sont en face du calculateur durant toute l'année. Ce guide contient des pages réglées pour enregistrer les temps de pose tant négatifs que positifs, un agenda et feuilles pour notes, règlements de douane, poids et mesures métriques et anglais, liste de la rapidité des plaques, temps de pose pour les objets en mouvement, temps de pose pour augmenter et réduire, temps de pose pour le tirage par contact, temps de pose pour téléphotographies, etc., etc.

Spécifier l'édition désirée. Il y en a trois :

L'édition pour l'Hémisphère Nord et les régions tropicales s'applique à toutes les contrées situées entre le Cercle Polaire Arctique et le Tropique du Capricorne (environ 20° lat. S.).

L'édition pour l'Hémisphère Sud et les régions tropicales est destinée aux contrées situées au sud du Tropique du Cancer (environ 20° lat. N.).

Prix à Londres: Fr.

Relié en percale (verte), avec pochette et crayon la pièce 1.25

L'édition pour les États-Unis d'Amérique (en percale rouge).

Equipement Photographique 'Tabloid,' No 905

Équipement complet et compact pour développer et fixer les plaques, pellicules, papiers au bromure ou à la lumière du gaz, ainsi que pour virer et fixer les épreuves ordinaires. Étiquettes et instructions en français.

Dimensions en cm. : 10 × 10 × 5.

Contenu-type (qui peut être modifié sur demande): 'Rytol' 'Tabloid,' Révélateur Universel, pour faire 2 litres ½ de bain ; Thiosulfate de Soude 'Tabloid' (Hypo) ; Renforçateur au Chrome 'Tabloid,' pour faire 1 litre ½ de bain ; Chlorure d'Or avec Composé de Thiosulfate 'Tabloid,' pour faire 1 litre de bain ; Virage Sépia 'Tabloid,' pour faire 2 litres ½ de bain.

En boîtes de métal émaillé rouge rex, bleu royal, vert impérial ou écarlate vif, avec contenu-type complet 6.30

En faisant les commandes, prière de spécifier la couleur que l'on désire.

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

	Prix à Londres: Fr.
'Pinol'—Essence distillée de *Pinus pumilio* *(Marque de Fabrique)*	
Flacons de 14 cmc. ... ... le flacon	2.10
,, 28 cmc. ... ... ,,	3.45

Pravaz, Seringues de *(voir* Seringues Hypodermiques B. W. & Cie, *page* 225*)*

Prises de Composé de Menthol *(voir page* 236*)*

Produits 'Brockedon' *(voir page* 216*)*

Produits 'Elixoid' *(voir page* 217*)*

Produits 'Enule' *(voir* Suppositoires 'Enule,' *page* 218*)*

Produits 'Epinine' *(voir page* 220*)*

Produits 'Ernutin' *(voir page* 220*)*

Produits 'Fairchild' *(voir page* 221*)*

Produits 'Hazeline' *(voir page* 223*)*

Produits 'Hemisine' *(voir page* 224*)*

Produits Hypodermiques 'Tabloid' *(voir page* 228*)*

Produits 'Kepler' *(voir page* 234*)*

Produits Ophthalmiques 'Tabloid' et 'Soloid' *(voir pages* 237 *à* 239*)*

Produits Photographiques 'Tabloid' *(voir page* 245*)*

Produits 'Soloid' *(voir pages* 254 *à* 263*)*

Produits 'Tabloid' *(voir pages* 264 *à* 301*)*

Produits 'Valoid' *(voir page* 307*)*

Produits 'Valule' *(voir page* 307*)*

Produits 'Vaporole' *(voir page* 308*)*

Produits 'Wellcome' *(voir pages* 311 *à* 326. *Voir aussi:* Sérums 'Wellcome,' *page* 251; Tuberculines 'Wellcome,' *page* 302; Vaccins 'Wellcome,' *page* 305*)*

Pulvérisateur *(voir* Vaporisateur, *page* 307*)*

Quinine 'Tabloid' *(voir pages* 291 *à* 293*)*

Quinine 'Wellcome' *(voir pages* 324–325*)*

'Rytol' 'Tabloid,' Révélateur Universel *(voir* Photographie, *page* 245*)*

Seringues Hypodermiques *(voir* Hypodermiques, Appareils, *page* 225*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

SÉRUMS

Marque **'WELLCOME'** de Fabrique

Le mot 'WELLCOME' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Afin de s'assurer un approvisionnement de ces préparations pures et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque en faisant les commandes.

Réputation

La haute réputation que ces sérums ont acquise dans le monde médical est constamment confirmée par des rapports favorables qui s'accumulent avec le temps et prouvent que cette haute réputation est méritée.

Épreuves

Les Sérums marque 'Wellcome' sont préparés dans les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques, Brockwell Hall, Londres, Angleterre, dans des conditions conformes à toutes les exigences de la science moderne, et sous la surveillance directe de spécialistes ayant une expérience éprouvée et variée. Les sérums ne quittent pas les laboratoires avant d'avoir subi avec succès des épreuves rigoureuses sur leur stérilité et leur absence de toxicité ; ce n'est qu'alors qu'ils sont livrés dans des ampoules de grandeur commode.

La maison Burroughs Wellcome & Cie distribue ces sérums, en s'efforçant toujours de les expédier immédiatement après la réception des commandes par lettres ou par télégrammes.

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

	Prix à Londres: l'ampoule Fr.
,, *Sérum Antidiphthérique	
Dans des ampoules	
Contenant 1000 unités Ehrlich	1.90
,, 2000 ,, ,, ...	3.50
,, 3000 ,, ,, ...	5.05
,, 4000 ,, ,, ...	6.30
,, †Antitoxine Diphthérique Concentrée	
Dans des ampoules	
Contenant 1000 unités Ehrlich	2.50
,, 2000 ,, ,, ...	4.40
,, 3000 ,, ,, ...	6.30
,, 4000 ,, ,, ...	7.55
,, 5000 ,, ,, ...	8.80

Des doses plus fortes sont fournies sur demande spéciale

* 1000 unités sont contenues dans au plus 2 cmc. 5
† 1000 unités sont contenues dans au plus 1 cmc.

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

Sérums marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*— Prix à Londres : Fr.

,, **Sérum Antitétanique**

Dans des ampoules de 10 cmc.

Contenant 1500 unités ... ... l'ampoule 4.75

,, 1000 ,, *(pour usage vétérinaire)* ,, 3.50

,, ***Sérum Anti-Bacille du Côlon :** de chevaux immunisés contre nombre d'espèces de *Bacillus coli* obtenues principalement de cas de péritonite et de fièvre puerpérale :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antidysentérique :** de chevaux immunisés contre des cultures de *Bacillus dysenteriæ* obtenus de cas graves de dysenterie :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antigonococcique :** de chevaux immunisés contre des cultures de gonocoques obtenus de cas d'uréthrite et de conjonctivite gonorrhéique :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antiméningococcique :** de chevaux immunisés contre des cultures de méningocoques *(Micrococcus Meningitidis intracellularis)* obtenus de plusieurs sources différentes :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antistaphylococcique, Polyvalent :** de chevaux immunisés contre des cultures variées de *Staphylococcus pyogenes aureus*, *albus*, *citreus* et *hemorrhagicus* :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antistreptococcique de l'Érysipèle:** de chevaux immunisés contre des cultures de cas typiques d'érysipèle :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antistreptococcique de la Fièvre Puerpérale :** de chevaux immunisés contre nombre de cultures de streptocoques de cas de fièvre puerpérale :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

* Fourni dans des flacons de 10 cmc. sur demande spéciale

Sérums marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*— Prix à Londres : Fr.

,, **Sérum Antistreptococcique, Polyvalent :** de chevaux immunisés contre des cultures de streptocoques provenant d'un grand nombre de sources différentes, et des maladies suivantes :

ÉRYSIPÈLE, FIÈVRE SCARLATINE, FIÈVRE PUERPÉRALE, RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU, SEPTICÉMIE, ANGINE, PNEUMONIE, ENDOCARDITE ULCÉRATIVE.

Ampoules de 10 cmc. ... ... l'ampoule 3.50
,, 25 cmc. ... ... ,, 8.25

,, ***Sérum Antistreptococcique, Pyogénique :** de chevaux immunisés contre quelques cultures de *Streptococcus pyogenes.*

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antistreptococcique du Rhumatisme Articulaire Aigu :** de chevaux immunisés contre des cultures de cas graves de rhumatisme articulaire aigu et d'arthrite rhumatoïde :—

Ampoules de 25 cmc ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antistreptococcique de la Scarlatine :** de chevaux immunisés contre des cultures de plusieurs cas graves (quelques-uns d'entre eux ayant causé la mort) de fièvre scarlatine :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antityphoïde :** de chevaux immunisés contre des cultures de *Bacillus typhosus* de plusieurs cas de fièvre typhoïde :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 8.25

,, ***Sérum Antivenin :** de chevaux immunisés contre le venin du cobra et de la vipère Russel *(Daboia)* :—

Ampoules de 25 cmc. ... ... l'ampoule 13.85

,, **Sérum Normal de Cheval, No 1**

Ampoules de 10 cmc. ... ... l'ampoule 1.25
,, 25 cmc. ... ... ,, 3.15

* Fourni dans des flacons de 10 cmc. sur demande spéciale

Seringues à Sérum *(voir page 226)*

Serviettes Hygiéniques Pliées et Comprimées, marque 'Tabloid' *(voir* Bandes Hygiéniques, *page 204)*

'Soamin' *(Marque de Fabrique)* (Para-aminophénylarsonate de Sodium)—

			Prix à Londres: Fr.
Flacons de	5 gr.	le flacon	1.90
,,	30 gr.	,,	7.60

(Voir aussi 'Soamin' 'Tabloid,' *page 295)*

'Soloid,' Boîtes pour Analyses, marque *(voir page 213)*

'Soloid,' Boîtes et Trousses, marque *(voir page 213)*

'Soloid,' Colorants pour la Microscopie *(voir page 262)*

'Soloid,' Colorants pour la Photographie *(voir page 248)*

'Soloid,' Milieux de Culture Bactériologique *(voir page 263)*

'Soloid,' Produits marque *(voir ci-après)*

'Soloid,' Produits pour Analyses, marque *(voir pages 261 et 262)*

PRODUITS

Marque **'SOLOID'** de Fabrique

Le mot 'SOLOID' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque en faisant les commandes.

La série des Produits 'Soloid' comprend les substances antiseptiques, astringentes et anesthésiques ; elle fournit aussi des moyens commodes de préparer des colorants pour la microscopie, et des solutions de réactifs pour les analyses d'eaux potables, d'eaux d'égouts et d'urine. Leur portabilité, leur activité, la précision de leur dosage et leur solubilité les rendent préférables aux solutions toutes faites.



Marque de Fabrique

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

	Prix à Londres	
	Flacons de 25: Fr.	Flacons de 100: Fr.
'Soloid,' Produits—*suite*		
'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—		
,, **Acide Borique**, 0 gr. 389 *(parfumé à l'essence de roses)*	0.85	...
,, Acide Borique, 1 gr.	0.55	...
,, ,, ,, 1 gr., flacons de 50, le flacon, Fr. 0.85		
,, Acide Borique et Sulfate de Zinc *(parfumé à l'essence de roses)*...	0.85	...
Acide Borique ... ... 0 gr. 389 Sulfate de Zinc... ... ... 0 gr. 032		
,, **Acide Phénique** (Phénol), 0 gr. 324, tubes de 25, le tube, Fr. 0.65		
,, ,, ,, ,, 1 gr., tubes de 10, le tube, Fr. 0.75		
,, ,, ,, ,, 3 gr. 89, tubes de 6, le tube, Fr. 0.85		
Point de fusion du Phénol employé pour la préparation de l'Acide Phénique 'Soloid,' 40° C.		
,, Alcalin, Composé *(voir* Nasal, *page* 258*)*		
,, Alun, 0 gr. 648	...	1.25
,, Alun et Sulfate de Zinc	0.90	...
Alun ... ... 0 gr. 972 Sulfate de Zinc... ... ... 0 gr. 972		
,, Alun et Zinc, Composé d', *fort*	1.25	...
Alun ... ... 1 gr. 944 Sulfate de Zinc... ... ... 0 gr. 972		
,, Analyses, Produits pour *(voir pages* 261–262*)*		
,, Antiseptique et Alcalin, Composé *(voir* Nasal, *page* 258*)*		
,, Argent, Nitrate d', 0 gr. 065, le tube de 25, Fr. 1.25		
,, ,, ,, 0 gr. 324	2.50	...
,, Argyrol, 0 gr. 065 le tube de 12, Fr. 0.90		
,, ,, 0 gr. 353 ,, 6, Fr. 1.65		
Un dans 3 gr. 50 d'eau donne une solution au 10e		
,, Atropine, Sulfate d', 0 gr. 0353, tubes de 6, le tube, Fr. 1.05		
Un dans 3 gr. 50 d'eau donne une solution au 100e		
,, Atropine et Cocaïne le tube de 6, Fr. 1.45		
Sulfate d'Atropine ... ... 0 gr. 0177 Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 0706		
Un dans 3 gr. 50 d'eau donne une solution au 200e de Sulfate d'Atropine et à 2 pour 100 de Chlorhydrate de Cocaïne.		

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Soloid,' Produits—*suite*	Prix à Londres: Flacons de 25 : Fr.	Prix à Londres: Flacons de 100 : Fr.
'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—		
,, **Bichlorure de Mercure** *(voir* Sublimé Corrosif, *page* 260*)*		
,, Chinosol, 0 gr. 113	0.75	...
,, ,, 0 gr. 567	1.35	4.85
‡ ,, Cocaïne, Chlorhydrate de, 0 gr. 032, tubes de 25 ... ... le tube, Fr. 1.15	...	4.00
‡ ,, Cocaïne, Chlorhydrate de, 0gr. 05, tubes de 25 le tube, Fr. 2.10	...	7.55
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 25	7.35	...
,, Cocaïne et Eucaïne, N° 2, tubes de 25 le tube, Fr. 1.90 Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 025 Lactate d'Eucaïne ... ... 0 gr. 025		
,, Colorants pour Photographie *(voir page* 248*)*		
,, Colorants pour Microscopie *(voir page* 262*)*		
,, Cuivre, Sulfate de, 0 gr. 065	...	1.25
‡ ,, Encre Écarlate	0.75	...
‡ ,, ,, Noire	0.70	...
(Voir aussi Encre 'Tabloid,' *page* 275*)*		
,, Eucaïne, Chlorhydrate d', 0 gr. 05, tubes de 25 ... ... le tube, Fr. 1.90		
,, Eucaïne, Chlorhydrate d', 0 gr. 25	6.95	...
,, **Eucaïne, Lactate d'**, 0 gr. 065	1.90	...
,, ,, ,, 0 gr. 324	7.60	...
Très soluble ; on peut facilement préparer des solutions à 20 pour cent avec de l'eau froide.		
,, 'Eucalyptia,' Composé d' *(voir page* 258*)*		
,, Goulard, Eau de *(voir* Plomb, Sous-Acétate*)*		
,, 'Hemisine,' 0 gr. 0012, tubes de 6 *(Marque de Fabrique)* le tube, Fr. 1.25		
,, ,, 0 gr. 005, le tube de 6, Fr. 3.15		
,, 'Hemisine' et Cocaïne, tubes de 12 le tube, Fr. 1.25 'Hemisine' ... ... 0 gr. 00032 Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 008		
,, 'Hemisine' avec de l'Eucaïne, Composé d', N° 1, tubes de 6 ... le tube, Fr. 2.10 'Hemisine' ... ... 0 gr. 001 Chlorure de Sodium ... ... 0 gr. 90 Lactate d'Eucaïne ... ... 0 gr. 20		

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Soloid,' Produits—*suite*	Prix à Londres: Flacons de 25: Fr.	Prix à Londres: Flacons de 100: Fr.
'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—		
,, 'Hemisine' avec de l'Eucaïne, Composé d', N° 2, tubes de 12 ... le tube, Fr. 1.25 (Un dixième de la force du N° 1)		
,, 'Hemisine' avec Sulfate d'Atropine *(pour injections intraveineuses)*, tubes de 12 le tube, Fr. 1.25		
'Hemisine' ... ... 0 gr. 0002 Sulfate d'Atropine ... ... 0 gr. 001		
L' 'Hemisine' 'Soloid' et ses combinaisons presentent le principe actif de la moelle de la glande surrénale sous une forme *sèche* et *soluble*, permettant la préparation instantanée de solutions.		
,, Homatropine, Bromhydrate d', 0 gr. 0353, tubes de 6 ... ... le tube, Fr. 5.25		
Un dans 3 gr. 50 d'eau donne une solution au 100e		
,, Homatropine et Cocaïne, tubes de 6 le tube, Fr. 5.65		
Bromhydrate d'Homatropine ... 0 gr. 0353 Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 0706		
Un dans 3 gr. 50 d'eau donne une solution à 1 pour cent de Bromhydrate d'Homatropine et à 2 pour cent de Chlorhydrate de Cocaïne.		
,, Homatropine, Méthyl-Bromhydrate d', et Cocaïne, tubes de 6 le tube, Fr. 5.65		
Méthyl-Bromhydrate d'Homatropine, 0 gr. 0353 Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 0706		
Un dans 3 gr. 50 d'eau donne une solution à 1 pour cent de Méthyl-Bromhydrate d'Homatropine et à 2 pour cent de Chlorhydrate de Cocaïne.		
,, Indicateurs de Réaction *(voir page 262)*		
,, Iodic-Hydrarg. *(voir* Mercure et de Potassium, Iodure de, *page 258)*		
,, Lotion Mercurielle Noire	0.85	...
Un pulvérisé et dissous dans 28 gr. d'eau donne une lotion qui correspond à la Lotio Hydrargyri Nigra de la Pharm. Brit.		
,, **Mercure, Bichlorure de** *(voir* Sublimé Corrosif, *page 260)*		
,, Mercure, Oxycyanure de, 0 gr. 10, le tube de 25, Fr. 0.65	...	1.90
,, ,, ,, 0 gr. 25... ...	0.85	2.50
,, ,, ,, 0 gr. 50... ...	1.05	3.15

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Soloid,' Produits—*suite*	Prix à Londres Flacons de 25: Fr.	Prix à Londres Flacons de 100: Fr.
SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—		
,, **Mercure et de Potassium, Iodure de** *(désigné autrefois sous le nom* Iodic-Hydrarg.), 0 gr. 113, tubes de 25 le tube, Fr. 0.90	...	2.10
Un dissous dans 113 gr. d'eau donne une solution au 1000e (désignée souvent sous le nom de Solution de Bi-iodure de Mercure).		
,, Mercure et de Potassium, Iodure de *(désigné autrefois sous le nom* Iodic-Hydrarg.), 0 gr. 283	1.15	3.75
Un dissous dans 283 gr. d'eau donne une solution au 1000e.		
,, Mercure et de Potassium, Iodure de *(désigné autrefois sous le nom* Iodic-Hydrarg.), 0 gr. 50	1.90	...
Un dans 500 gr. d'eau donne une solution au 1000e.		
,, Milieux de Culture *(voir page 263)*		
,, Mucine et de Menthol, Composé de ...	2.10	6.30
Mucine ... ... 0 gr. 291		
Bicarbonate de Soude ... ... 0 gr. 291		
Menthol ... ... 0 gr. 0032		
,, **Nasal,** Composé Alcalin	0.65	1.35
Borax ... ... 0 gr. 324		
Chlorure de Sodium ... ... 0 gr. 324		
,, Nasal, Composé Antiseptique et Alcalin ...	0.65	1.35
Bicarbonate de Soude ... ... 0 gr. 324		
Acide Phénique ... ... 0 gr. 032		
Borax ... ... 0 gr. 324		
,, **Nasal, Composé de Bicarbonate de Soude**	0.65	1.35
Bicarbonate de Soude ... ... 0 gr. 324		
Borax ... ... 0 gr. 324		
Chlorure de Sodium ... ... 0 gr. 324		
,, Nasal, Composé de Bicarbonate de Soude, Sucré	0.65	1.35
Bicarbonate de Soude ... ... 0 gr. 324		
Borax ... ... 0 gr. 324		
Chlorure de Sodium ... ... 0 gr. 324		
Sucre blanc ... ... 0 gr. 324		
,, **Nasal, Composé d' 'Eucalyptia'** ...	0.95	2.75
Bicarbonate de Soude ... ... 0 gr. 518		
Borax ... ... 0 gr. 518		
Benzoate de Soude ... ... 0 gr. 022		
Salicylate de Soude ... ... 0 gr. 022		
Essence d'Eucalyptus ... *0 gtt. 4 (0 cmc. 01)		
Thymol ... ... 0 gr. 011		
Menthol ... ... 0 gr. 0054		
Essence de Gaulthérie ... *0 gtt. 2 (0 cmc. 005)		

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

'Soloid,' Produits—*suite*	Prix à Londres: Flacons de 25 : Fr.	Prix à Londres: Flacons de 100 : Fr.
'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—		
,, Nasal, Composé de Phénol	0.75	...
Bicarbonate de Soude ... ... 0 gr. 778 Acide Phénique ... ... 0 gr. 097 Chlorure de Sodium ... ... 0 gr. 13		
,, **Naso-Pharyngien, Composé**	1.15	3.45
Chlorure de Sodium ... ... 0 gr. 454 Borax ... ... 0 gr. 162 Acide Borique ... ... 0 gr. 049 Benzoate de Soude ... ... 0 gr. 032 Menthol ... ... 0 gr. 0013 Thymol ... ... 0 gr. 00065 Chlorhydrate de Cocaïne ... 0 gr. 011 Essence de Gaulthérie ... *0 gtt. 13 (0 cmc. 003)		
,, **'Nizin'** *(Marque de Fabrique)*, 0 gr. 15 ...	...	1.25
,, ,, ,, 1 gr. ...	2.10	...
Sel de Zinc de l'Acide Sulfanilique		
,, Paraformol, 0 gr. 324	...	2.10
‡ ,, Plomb et Opium, Lotion de	0.75	...
Acétate de Plomb ... ... 0 gr. 13 Teinture d'Opium (Ph. Brit.) *49 gtt. (1 cmc. 184)		
‡ ,, **Plomb, Sous-Acétate de,** 0 gr. 648 ...	0.75	...
Préparé avec de l'Acétate de Plomb *Basique*. Un dans 142 gr. d'eau distillée donne une solution correspondant à l'Eau de Goulard.		
‡ ,, Potasse, Permanganate de, 0 gr. 065 ...	...	0.75
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 324 ...	0.60	1.15
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 50 ...	0.65	1.25
,, Potasse, Permanganate de, et Alun ...	...	2.10
Permanganate de Potasse ... 0 gr. 194 Alun ... ... 0 gr. 324		
‡ ,, Protargol, 0 gr. 065	...	3.80
,, ,, 0 gr. 259	3.45	10.05
,, Salin, Composé, N° 2, tubes de 12 le tube, Fr. 0.75		
Chlorure de Calcium ... ... 0 gr. 05 Chlorure de Potassium ... ... 0 gr. 05 Bicarbonate de Soude ... ... 0 gr. 025 Chlorure de Sodium ... ... 2 gr. 25 Dextrose ... ... 0 gr. 25 Un dissous dans 250 gr. d'eau bouillie (stérile) pour injection intraveineuse à 38° C.		
‡ ,, Sodium, Chlorure de, 0 gr. 23, tubes de 12, le tube, Fr. 0.35 Un dissous dans 25 gr. d'eau bouillie (stérile) donne une solution saline (0,9 pour cent) pour diluer les solutions d'"Hemisine," ou pour l'injection intraveineuse.		

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Soloid,' Produits—*suite*	Prix à Londres Flacons de 25 : Fr.	Prix à Londres Flacons de 100 : Fr.
'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—		
,, Sodium, Chlorure de, 2 gr. 592, tubes de 12 le tube, Fr. 0.75		
Pour injection intraveineuses, à la température de 38° C., deux produits dissous dans 567 gr. d'eau bouillie (stérile) donnent une solution contenant 0,9 pour cent. de Chlorure de Sodium.		
,, Sodium, Chlorure de, 5 gr. 184, tubes de 6, le tube, Fr. 0.65		
Pour injections intraveineuses, à la température de 38° C., dissoudre un produit dans 567 gr. d'eau bouillie (stérile).		
,, Soude, Bicarbonate de, 2 gr. 85	0.85	...
Un dans 142 gr. d'eau donne une solution à 2 pour 100.		
,, Soude, Citrate de, et Chlorure de Sodium ...	1.25	3.75
Citrate de Soude ... ... 0 gr. 194 Chlorure de Sodium ... ... 1 gr. 037		
,, **Sublimé Corrosif** (Bichlorure de Mercure), 0 gr. 000065 *(Ophthalmique)* *(voir page 239)*		
‡ ,, Sublimé Corrosif (Bichlorure de Mercure), 0 gr. 113	...	0.85
Un dans 113 gr. d'eau donne une solution au 1000e		
‡ ,, Sublimé Corrosif (Bichlorure de Mercure), 0 gr. 50	0.65	1.70
Un dans 500 gr. d'eau donne une solution au 1000e		
‡ ,, Sublimé Corrosif (Bichlorure de Mercure), 1 gr., tubes de 10... le tube, Fr. 0.65	1.05	3.15
Un dissous dans un litre d'eau donne une solution au 1000e.		
‡ ,, Zinc, Chlorure de, 0 gr. 324	0.95	...
Préparé avec du Chlorhydrate d'Ammoniaque		
,, Zinc, Permanganate de, 0 gr. 008	...	1.05
‡ ,, Zinc, Sulfate de, 0 gr. 065	...	0.85
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 648	...	1.25
,, Zinc, Sulfophénate de, 0 gr. 13	...	1.15
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 50	0.85	...

D'autres produits sont fournis aussi sous la marque 'Soloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes : " *Tabloid, London* "

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

‡PRODUITS
Marque **'SOLOID'** de Fabrique
pour Analyses, etc.

Grâce a leur précision, leur commodité, leur portabilité et leur stabilité, ainsi qu'à la qualité exceptionnelle de leurs constituants, les Produits 'Soloid' pour Analyses et pour la Microscopie se sont acquis une réputation unique de supériorité et d'utilité.

N.B.—En faisant des commandes de Produits Chimiques 'Soloid' pour Analyses, il faut toujours mentionner la série dans laquelle figure la substance demandée, plusieurs produits 'Soloid' de la même substance se préparant en divers dosages, selon le but auquel on les destine: par exemple, l'Acide Oxalique 'Soloid' (Analyse d'Eaux), l'Acide Oxalique 'Soloid' (Analyse d'Eaux d'Égouts), etc.

Pour l'Analyse des Urines

(Pour le mode d'emploi, voir pages 119–126*)* — Prix à Londres Tubes de 20: le tube Fr.

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—

,, Acide Citrique, 0 gr. 065 ... ... 0.85
,, Acide Picrique, 0 gr. 065 ... ... 0.85
,, Acide Sulfosalicylique, 0 gr. 13 le tube de 16, Fr. 0.85
,, Potassium, Ferrocyanure de, 0 gr. 065 ... ... 0.85
,, Réactif à l'Indigo *(pour la recherche du sucre dans les urines)* (Nitrophényl-Propiolate de Soude, 0 gr. 016) 0.85
,, Réactif Fehling *(pour préparer la liqueur de Fehling)*, boîtes de 24 ... ... la boîte, Fr. 0.95

Pour l'Analyse de l'Eau

(Pour le mode d'emploi, voir pages 127 *et* 128*)* — Paquets de 25: le paquet Fr.

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—

,, Acide Oxalique, 0 gr. 10 ... ... 0.85
,, Ammoniaque, Chlorhydrate d', 0 gr. 00016 ... ... 0.85
,, Argent, Nitrate d', 0 gr. 0096 ... ... 0.85
,, Métaphénylènediamine, Sulfate de, 0 gr. 01 ... 0.85
,, Nessler, Réactif,
en capsules de verre hermétiquement scellées:
‡ 0 cmc. 5, boîtes de 30 capsules la boîte, Fr. 3.15
‡ 2 cmc., boîtes de 24 capsules la boîte, Fr. 4.00
,, Plomb, Acétate de, 0 gr. 0184 ... ... 0.85
,, Potasse, Chromate de, 0 gr. 0065 ... ... 0.85
,, Potasse, Nitrate de, 0 gr. 00144 ... ... 0.85

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Soloid,' Produits—*suite*

Pour l'Analyse de l'Eau—suite

Prix à Londres Paquets de 25 : le paquet Fr.

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Potasse, Permanganate de, 0 gr. 00395 ... ... 0.85
‡ ,, Potassium, Ferrocyanure de, 0 gr. 013 ... ... 0.85
‡ ,, Savon 0.85
‡ ,, Soude, Bisulfate de, 0 gr. 324 ... ... 0.85
‡ ,, Zinc en Poudre, 0 gr. 13 ... ... 0.85
‡ ,, Zinc, Sulfure de, 0 gr. 25 ... ... 0.85

Pour l'Analyse des Eaux d'Égouts

(Pour le mode d'emploi, voir page 129*)*

Paquets de 25 : le paquet Fr.

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Acide Oxalique, 0 gr. 0079 ... ... 0.85
‡ ,, Acide Pyrogallique, 0 gr. 032 ... ... 0.85
‡ ,, Potasse, Permanganate de, 0 gr. 00395 ... ... 0.85
‡ ,, Soude, Hydroxyde de, 0 gr. 13 ... ... 0.85

Indicateurs de Réaction

(Pour le mode d'emploi, voir page 129*)*

Tubes de 10 : le tube Fr.

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,,*Acide Rosolique 0.85
‡ ,, Amidon, 0 gr. 50 ... ... 0.85
‡ ,,*Indigo-Carmin 0.85
‡ ,,*Lacmoïde 0.85
‡ ,,*Méthyl-Orange 0.85
‡ ,,*Phénolphtaléine 0.85

* Un produit dissous dans 10 cmc. du liquide dissolvant fournit le réactif indicateur du terme de la réaction dans les analyses volumétriques, etc.

Colorants pour la Microscopie

(Pour le mode d'emploi, voir pages 130–137*)*

Tubes de 6 : le tube Fr.

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Bleu Borax Méthylène 0.85
‡ ,, Bleu de Méthylène, pur, 0 gr. 10 ... ... 0.85
‡ ,, Bleu Éosine-Méthylène (Teinture Louis Jenner), 0 gr. 05 0.85
‡ ,, Bleu Thionine, pur, 0 gr. 10 ... ... 0.85
‡ ,, Brun Bismarck, pur, 0 gr. 10 ... ... 0.85
‡ ,, Éosine, pure, 0 gr. 10 ... ... 0.85

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Soloid,' Produits—*suite*

Colorants pour la Microscopie—*suite*

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—	Prix à Londres Tubes de 6 : le tube Fr.
‡ ,, Éosine-Azur *(pour teindre par le procédé de Giemsa)*, 0 gr. 038	1.90
‡ ,, Fuchsine (Basique), pure, 0 gr. 10	0.85
‡ ,, Hæmalum	0.85
‡ ,, Hématoxyline, pure, 0 gr. 10	0.85
‡ ,, Liqueur de Gram, 15 cmc.	0.85
‡ ,, Teinture Romanowsky (Poudre Leishman), 0 gr. 015	0.85
‡ ,, Teinture Toison pour le Sang	0.85
‡ ,, Teinture Triple d'Ehrlich	1.05
‡ ,, Violet Gentiane, pur, 0 gr. 10	0.85
‡ ,, Violet Méthyle, pur, 0 gr. 10	0.85

Alcool Méthylique (pur) *(voir page* 203*)*

Colorants 'Soloid' pour la Photographie

(Voir Photographie, Colorants 'Soloid' pour la, *page* 248*)*

Milieux de Culture Bactériologique

(Pour le mode d'emploi, voir pages 137 *et* 139*)*

'SOLOID' *(Marque de Fabrique)*—	Prix à Londres Tubes de 6 : le tube Fr.
‡ ,, Agar-Agar Nourricier	0.65
‡ ,, Agar-Agar au Sel de Bile (MacConkey)	0.65
‡ ,, Bouillon de Culture	0.65

Solutions Salines pour Injections Intraveineuses

(Voir Chlorure de Sodium 'Soloid,' *page* 259*)*

Strophanthus, Teinture de

(Titrée physiologiquement, Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques)

	Prix à Londres : le flacon Fr.
Flacons de 14 cmc.	0.60
,, 28 cmc.	0.80
,, 510 cmc.	7.00

(Voir aussi Produits marque 'Tabloid,' *page* 264*)*

Suppositoires 'Enule' *(voir page* 218*)*

Suppositoires 'Hazeline' *(voir page* 224*)*

Surrénale, Extrait de la Glande

(voir 'Epinine,' *page* 220, et 'Hemisine,' *page* 224*)*

Surrénale, Glande *(voir* Produits marque 'Tabloid,' *page* 297*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Tabloid,' Pastilles *(voir page 243)*

'Tabloid,' Produits Hypodermiques, marque *(voir page 228)*

'Tabloid,' Produits marque *(voir ci-dessous)*

'Tabloid,' Produits Ophthalmiques, marque *(voir page 237)*

'Tabloid,' Produits pour la Photographie, marque *(voir pages 245 à 249)*

PRODUITS

Marque **'TABLOID'** de Fabrique

Le mot 'TABLOID' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque en faisant les commandes.

Les Produits 'Tabloid,' dont l'excellence et les avantages sont de nos jours universellement reconnus, ne contiennent que des substances d'une pureté exceptionnelle ; ils sont essentiellement portatifs et d'une très grande exactitude de dosage.

Sous la marque 'Tabloid' la maison B. W. & Cie fournit une immense variété de drogues et de combinaisons de drogues toutes préparées avec les ingrédients les plus purs, et divisées en doses exactes en vue de leur emploi thérapeutique. Les Produits 'Tabloid' ne nécessitent ni pesage ni mesurage ; des doses exactes peuvent être administrées immédiatement, et les produits demeurent inaltérés dans tous les climats. Grâce à leur extrême portabilité, on peut en porter dans la poche et en prendre régulièrement, tout en vaquant à ses occupations habituelles. Les préparations d'un goût désagréable sont recouvertes d'une légère couche de sucre blanc, facilement soluble dans l'estomac, tandis que celles destinées à agir après avoir quitté l'estomac sont recouvertes d'une couche de kératine, soluble seulement dans les sécrétions alcalines de l'intestin.

Dosage exact

Pour la commodité des membres du corps médical, la maison entreprend la préparation de drogues ou combinaisons de drogues se prêtant à cette méthode d'administration et faite d'après les formules particulières des médecins. Produits non dragéifiés, par quantités de 1000 et au-dessus ; dragéifiés, par quantités de 3000 et au-dessus.

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Acétanilide *(voir* Antifébrine, *page* 267*)*			
,, Acet-Phénétidine *(voir* Phénacétine, *page* 287*)*			
,, Acide Acétyl-Salicylique *(voir* 'Xaxa,' *page* 300*)*			
,, Acide Arsénieux, 0 gr. 00065 ...	100	0.95	...
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 001 ...	100	0.95	...
,, ,, ,, 0 gr. 0025 ...	100	0.95	...
,, ,, ,, 0 gr. 005 ...	100	0.95	...
,, Acide Benzoïque, 0 gr. 324 ...	...	...	2.30
,, **Acide Benzoïque, Composé d'** ... Acide Benzoïque ... 0 gr. 032; Codéine ... ... 0 gr. 0065; Menthol ... ... 0 gr. 0065; Poudre d'Ipécacuanha ... 0 gr. 0065; Chlorhydrate de Cocaine 0 gr. 0016; Essence de Menthe Poivrée *0 gtt. 16 (0 cmc. 0037); Gomme Rouge ... ... *q.s.*	25	1.25	3.75
‡ ,, Acide Borique, 0 gr. 324	...	...	0.85
,, Acide Citrique, 0 gr. 324	...	...	1.45
‡ ,, Acide Phénique (Phénol), *pour la gorge*, 0 gr. 015	25	0.75	2.10
‡ ,, ,, ,, ,, ,, 0 gr. 032	25	0.75	2.10
,, ,, ,, 0 gr. 065, (Capsule), boîtes de 24, la boîte, Fr. 1.45			
,, Acide Phénique et Orme Fauve, flacons de 25, le flacon, Fr. 1.65 — Dans chaque produit 0 gr. 032 d'Acide Phénique.	...	...	5.00
‡ ,, Acide Salicylique *(physiologiquement pur)*, 0 gr. 50	25	0.85	...
,, Acide Tannique *(voir* Tanin, *page* 297*)*			
,, Aconit, Teinture d', Pharm. Brit., *0 gtt. 6 (0 cmc. 015)	100	0.85	...

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
‡ ,, Aconit, Teinture d', Pharm. Brit., *2 gtt. 5 (0 cmc. 059)	100	0.85	...
‡ ,, ,, ,, *13 gtt. (0 cmc. 296)	36	0.85	1.25
,, Aliment Chimique *(voir* "Chemical Food," *page* 272*)*			
‡ ,, Aloès et Fer (Pil. Pharm. Brit.), 0 gr. 259, *dragéifié*	...	...	1.25
Chaque produit renferme environ: Sulfate de Fer déshydraté, 0 gr. 032; Aloès des Barbades, 0 gr. 065; Poudre Composée de Cannelle, 0 gr. 097.			
‡ ,, Aloès et Myrrhe (Pil. Pharm. Brit.), 0 gr. 259, *dragéifié ou non* ...	...	...	1.25
Chacun renferme environ: Aloès Socotrin, 0 gr. 13; Myrrhe, 0 gr. 065.			
‡ ,, Aloïne, 0 gr. 0065	100	1.05	...
,, ,, 0 gr. 032, *dragéifié* ...	25	0.75	1.65
,, **Aloïne, Composé d'**, *dragéifié ou non*	50	0.75	1.45
Aloïne ... ... 0 gr. 013 Sulfate de Strychnine ... 0 gr. 00108 Ext. de Belladone ... 0 gr. 008 Poudre d'Ipécacuanha ... 0 gr. 004			
,, Alun *(voir* Produits 'Soloid,' *page* 255*)*			
‡ ,, Ammoniaque, Bromhydrate d', 0 gr. 50	25	0.65	1.25
‡ ,, ,, ,, 1 gr.	25	0.95	...
‡ ,, Ammoniaque, Carbonate d', 0 gr. 25	...	...	1.65
‡ ,, Ammoniaque, Chlorhydrate d', 0 gr. 25	25	0.65	1.25
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 50	25	0.85	1.90
,, Ammoniaque, Chlorhydrate d', et Borax	...	...	1.55
,, Ammoniaque, Chlorhydrate d', et Réglisse	25	0.65	1.45
Chlorhydr. d'Ammoniaque 0 gr. 194 Ext. de Réglisse ... 0 gr. 13			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — Tabloid.

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,, **Ammoniaque, Composé de Chlorhydrate d'**	25	0.65	1.45
Chlorhydr. d'Ammoniaque 0 gr. 065 Chlorate de Potasse ... 0 gr. 13 Poudre de Cubèbe ... 0 gr. 016 Ext. de Réglisse ... 0 gr. 065			
,, Ammoniaque, Hippurate d', 0 gr. 065	...	...	2.10
,, Analgésine *(voir* Antipyrine*)*			
,, Antifébrine (Acétanilide), 0 gr. 10 ...	25	0.65	...
,, ,, ,, 0 gr. 25 ...	25	0.75	1.45
,, Antifébrine, Composé d'	...	...	1.65
Antifébrine (Acétanilide, Ph. Br.) ... ... 0 gr. 13 Camphre monobromé ... 0 gr. 065 Citrate de Caféine ... 0 gr. 065			
,, Antimoine Tartarisé (Tartre Stibié), 0 gr. 0013	100	0.95	...
,, **Antipyrine** (Phénazone) 0 gr. 25, *dragéifié ou non*	25	0.65	1.90
,, ,, ,, 0 gr. 50	25	0.95	2.85
,, **'Aol'** *(Marque de Fabrique)*, 0 gr. 30 (Capsule), (Dérivé du *Santalum album*), boîtes de 50, la boîte Fr. 4.40			
,, Apomorphine, Chlorhydrate d', 0 gr. 0025	25	1.05	...
,, Apomorphine, Chlorhydrate d', et de Morphine, āā 0 gr. 0025 ...	25	1.25	...
,, Apomorphine, Composé d'	25	0.85	1.90
Chlorhydr. d'Apomorphine 0 gr. 0013 Chlorhydr. d'Ammoniaque 0 gr. 194 Ext. de Réglisse ... 0 gr. 097			
,, Arsenic, Composé d', *dragéifié* ...	...	...	1.65
Acide Arsénieux ... ... 0 gr. 00065 Sulfate de Fer desséché... 0 gr. 065 Sulfure de Calcium ... 0 gr. 016 Ext. de Gentiane... ... 0 gr. 13			
,, Asa fœtida, Pilule Composée d' *(voir* Galbanum, *page* 278*)*			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi : — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Asa fœtida et d'Opium, Composé d'	...	...	2.85
Contient Asa fœtida, Camphre, Poudre d'Opium et Poudre de Poivre Noir āā 0 gr. 065.			
‡ ,, 'Aspirin,' 0 gr. 50	25	1.65	5.05
‡ ,, Atropine, Sulfate d', 0 gr. 0005 ...	25	0.65	...
,, Bandes et Pansements *(voir page 239)*			
,, Belladone, Teinture de, Pharm. Brit.—			
‡*2 gtt. 5 (0 cmc. 059)	100	0.85	...
*13 gtt. (0 cmc. 296)	48	0.85	1.25
,, Benzonaphtol, 0 gr. 324	...	...	2.25
‡ ,, Bétanaphtol, 0 gr. 25	...	...	1.65
,, Bétanaphtol, Composé de, *recouvert de gélatine*	25	0.95	2.25
Bétanaphtol ... ... 0 gr. 065 Charbon de Bois ... ... 0 gr. 259 Essence de Menthe Poivrée *1 gtt. 25 (0 cmc. 03)			
‡ ,, Bismuth, Carbonate de, 0 gr. 50 ...	25	1.25	3.75
,, **Bismuth, Composé de Sous-santonate de,** flacons de 25, Fr. 3.15	...	...	11.35
Sous-santonate de Bismuth ... ... 0 gr. 25 Phénolphtaléine ... 0 gr. 097 *(A base de chocolat)*			
,, Bismuth et Poudre de Dover ...	...	...	2.10
Sous-Nitrate de Bismuth 0 gr. 162 Poudre d'Ipéca Opiacée 0 gr. 162			
,, **Bismuth avec Rhubarbe et Soude**	25	0.65	1.70
Sous-Nitrate de Bismuth 0 gr. 194 Poudre de Rhubarbe ... 0 gr. 065 Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 13			
,, Bismuth, Salicylate de *(physiologiquement pur)*, 0 gr. 30	25	1.05	3.15
,, ,, ,, ,, 0 gr. 50	...	...	4.20
,, Bismuth et Soude, N° 2	25	0.65	1.90
Sous-Nitrate de Bismuth 0 gr. 25 Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 25			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — *Tabloid*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale : Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100 : Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Bismuth, Sous-Gallate de, 0 gr. 324	25	0.85	2.50
,, Bismuth, Sous-Nitrate de, 0 gr. 30...	25	0.75	2.10
,, ,, ,, 0 gr. 50...	25	0.95	2.85
,, **Blaud** (Pil. Fer.), 0 gr. 25 = 20% de carbonate de fer, *dragéifié* ...	...	...	0.95
,, Blaud (Pil. Fer.), 0 gr. 648 = 20% de carbonate de fer, *dragéifié* ...	...	...	1.25
,, Blaud et Aloïne, N° 2, *dragéifié* ...	...	...	1.05
Masse de Blaud ... 0 gr. 25 (=20% de carbonate de fer) Aloïne ... ... 0 gr. 005			
,, Blaud et Arsenic, N° 2, *dragéifié* ...	...	...	1.05
Masse de Blaud ... 0 gr. 25 (=20% de carbonate de fer) Acide arsénieux ... 0 gr. 001			
,, Blaud avec Arsenic et Strychnine, N° 2, *dragéifié*	...	...	1.25
Masse de Blaud ... 0 gr. 25 (=20% de carbonate de fer) Acide Arsénieux ... 0 gr. 0005 Strychnine ... ... 0 gr. 0005			
,, Blaud et Cascara, N° 2, *dragéifié* ...	...	...	1.05
Masse de Blaud ... 0 gr. 25 (=20% de carbonate de fer) Extrait Sec de Cascara ... 0 gr. 025			
,, Blaud, Composé N° 2 de, *dragéifié*...	...	...	1.25
Masse de Blaud ... 0 gr. 50 (=20% de carbonate de fer) Poudre de Capsicum ... 0 gr. 015 Aloïne ... ... 0 gr. 002 Strychnine ... ... 0 gr. 002 Acide Arsénieux ... 0 gr. 002			
,, Bleu de Méthylène, 0 gr. 15, *dragéifié*	25	1.05	...
,, Borax, 0 gr. 324	25	0.65	1.05
,, Bromures, Composé de *(voir* Sodium, Composé de Bromure de, *page* 295*)*			
,, Butyl-Chloral Hydraté et Gelsémine	...	...	2.75
Butyl-Chloral Hydraté ... 0 gr. 194 Chlorhydrate de Gelsémine ... ... 0 gr. 00032			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi : — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Cacao, Essence de, 3 gr. 89, boîtes de 12 ... la boîte, Fr. 1.45			
,, Caféine, Citrate de, 0 gr. 01 ...	25	0.65	...
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 10... ...	...	...	2.10
‡ ,, Caféine, Citrate Effervescent de, Pharm. Brit., 3 gr. 89, tubes de 25 ... ... le tube, Fr. 1.25			
Chaque produit contient 0 gr. 15 de Citrate de Caféine.			
,, Caféine, Composé N° 2 de	25	0.85	2.50
Caféine ... ... 0 gr. 05 Antipyrine (Phénazone)... 0 gr. 25			
‡ ,, Calcium, Sulfure de, 0 gr. 0065, *dragéifié*	100	0.85	...
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 016 ,,	...	...	0.95
,, ,, ,, 0 gr. 032 ,,	...	...	1.05
,, ,, ,, 0 gr. 065 ,,	...	...	1.25
‡ ,, **Calomel**, 0 gr. 005	100	0.85	...
‡ ,, ,, 0 gr. 01	100	0.85	...
,, ,, 0 gr. 032	100	0.85	...
‡ ,, ,, 0 gr. 065	...	...	0.95
,, ,, 0 gr. 10	100	0.95	...
,, ,, 0 gr. 194	...	...	1.15
,, ,, 0 gr. 324	...	...	1.45
Préparé avec du Protochlorure de Mercure sublimé pur.			
,, Calomel, 0 gr. 032, et Bicarbonate de Soude, 0 gr. 162	25	0.75	1.25
,, Calomel, 0 gr. 065, et Bicarbonate de Soude, 0 gr. 324	25	0.75	1.45
‡ ,, Calomel, Composé de (Pilule de Plummer, Pharm. Brit.), 0 gr. 259	25	0.75	1.45
Chaque produit renferme environ : Calomel, 0 gr. 065 ; Sulfure d'Antimoine. 0 gr. 065 ; Résine de Gaïac, 0 gr. 13.			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi : — — — *Tabloid*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Calomel et Créosote	...	...	1.90
Calomel ... ... 0 gr. 011 Créosote *2 gtt. 5 (0 cmc. 059)			
,, Calomel et Jalap	...	...	2.10
Calomel ... ... 0 gr. 065 Poudre de Jalap ... 0 gr. 13			
,, Calomel et Pipérine, āā 0 gr. 032 ...	...	...	2.75
,, Camphre, Essence (saturée) de ...	25	0.75	1.45
,, Camphre, Teinture Composée de (Parégorique, Pharm. Brit.), *recouvert de gélatine*—			
*4 gtt. 5 (0 cmc. 118) ,,	100	0.85	...
,, *11 gtt. 5 (0 cmc. 296) ,,	48	0.85	1.25
,, *35 gtt. (0 cmc. 888) ,,	36	0.85	1.25
,, Cannabis Indica, Teinture de, Pharm. Brit. (au 10e), *5 gtt. (0 gr. 10)	48	0.85	1.65
,, Capsicum, Teinture de (Pharm. Brit.)—			
‡*2 gtt. 5 (0 cmc. 059) ...	100	0.85	...
,, *13 gtt. (0 cmc. 296) ...	...	...	1.25
,, **Capsules**—			
(*Voir* Acide Phénique, *page* 265; 'Aol,' *page* 267; Chaux, Iodo-ricinoléate de, *page* 272; Essence de Santal, *page* 294; Essence de Térébenthine, rectifiée, *page* 297; Huile de Genièvre, *page* 278; Huile de Ricin, *page* 294; Phénol et de Menthol, Composé de, *page* 288; Moelle d'Os, *page* 285; Térébène, *page* 297)			
,, Carlsbad, Sel de *(Effervescent, Artificiel)*, tubes de 25, le tube, Fr. 0.95			
,, Cascara, Composé de, *dragéifié ou non*	25	0.95	2.10
Ext. de Cascara ... 0 gr. 065 Ext. Sec d'Évonymus ... 0 gr. 032 Iridine... ... ... 0 gr. 032 Ext. de Noix Vomique ... 0 gr. 004 Ext. Vert de Jusquiame 0 gr. 022			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Cascara et de Gentiane, Composé de, *dragéifié*	25	0.95	2.10
Ext. de Cascara ... 0 gr. 13 Ext. de Noix Vomique ... 0 gr. 013 Ext. de Belladone ... 0 gr. 0065 Ext. de Gentiane ... 0 gr. 065 Capsicine ... ... 0 gr. 0065			
‡ ,, **Cascara Sagrada** (Extrait Sec), 0 gr. 065, *dragéifié ou non*	25	0.55	1.05
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 15 ,, ,,	25	0.65	1.45
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 25 ,, ,,	25	0.95	2.10
‡ ,, **Cathartique, Composé,** *dragéifié ou non*	25	0.75	1.45
Ext. Composé de Coloquinte ... ... 0 gr. 086 Calomel ... ... 0 gr. 065 Ext. de Jalap ... ... 0 gr. 065 Poudre de Gomme Gutte 0 gr. 016			
,, Cérébrine, 0 gr. 30	...	...	2.50
‡ ,, Cérium, Oxalate de, 0 gr. 324 ...	...	...	2.50
‡ ,, Charbon *(de Saule pur)*, 0 gr. 25 ...	25	0.65	1.25
,, Chaux, Composé de Carbonate de ...	25	0.75	2.10
Carbonate de Chaux précip. ... ... 0 gr. 227 Carbonate de Magnésie pesant... 0 gr. 162 Carbonate de Bismuth ... 0 gr. 13			
,, Chaux, Iodo-ricinoléate de, 0 gr. 194, (Capsule), la boîte de 50, Fr. 3.75			
,, Chaux, Lactate de, 0 gr. 324 ...	25	0.65	1.90
,, "Chemical Food" (Composé de Phosphates), 2 gr. 30, *dragéifié* ...	25	0.75	1.65
Contient les Phosphates combinés de Fer, de Chaux, de Soude et de Potasse. Un produit équivaut à 1 cmc. 8 du Sirop-type de Composé de Phosphates.			
,, "Chemical Food" (Composé de Phosphates), 4 gr. 60, *dragéifié* ...	25	1.05	2.25
Représente 3 cmc. 5 du Sirop-type de Composé de Phosphates.			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,, Chinosol, 0 gr. 324, *dragéifié* ...	25	1.05	3.15
,, Chloralamide, 0 gr. 324	...	...	2.75
,, Chloral Hydraté, 0 gr. 25	25	0.65	1.55
,, ,, ,, 1 gr.	25	1.45	...
,, Chocolat, 3 gr. 89, boîtes de 12 la boîte, Fr. 1.25			
Cocaïne, Chlorhydrate de *(voir* Produits 'Soloid,' *page* 256*)*			
,, **Cocaïne avec Chlorate de Potasse et Borax, Composé de** *(voir* Voix, *page* 300*)*			
,, Codéine, 0 gr. 016	25	1.55	4.75
,, ,, 0 gr. 032	25	2.50	6.95
,, Codéine et Noix Vomique	25	3.80	...
Phosphate de Codéine ... 0 gr. 065 Ext. de Noix Vomique ... 0 gr. 016			
,, Codéine, Phosphate de, 0 gr. 03 ...	100	5.65	...
,, **'Coffee-Mint'** *(Café-Menthe)* ...	25	0.65	1.25
Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 194 Bicarbonate d'Ammoniaque 0 gr. 004 Ext. de Café ... ... 0 gr. 032 Oxalate de Cérium ... 0 gr. 016 Essence de Menthe Poivrée *q.s.*			
,, **Cola, Composé de** *(autrefois* 'Forced March' 'Tabloid'), flacons de 25... le flacon, Fr. 1.45	...	...	4.20
Contient les principes actifs combinés de la noix de Cola et de la feuille de Coca.			
,, Colchicine, Salicylate de, 0 gr. 002	...	...	2.10
,, Colchique, Composé de	...	...	1.90
Ext. de Colchique ... 0 gr. 032 Acide Salicylique ... 0 gr. 194			
,, Coloquinte, Composé de (Pil. Pharm. Brit.), 0 gr. 259, *dragéifié ou non*	...	...	2.50
Chaque produit renferme environ: Pulpe de Coloquinte, 0 gr. 043; Aloès des Barbades, 0 gr. 086; Résine de Scammonée, 0 gr. 086; Essence de Girofle, *0 gtt. 4 (0 cmc. 01).			

* Compte gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
‡ ,, Coloquinte et Jusquiame (Pil. Pharm. Brit.), 0 gr. 259, *dragéifié ou non*	...	...	2.50
Chaque produit renferme: Masse de Coloquinte Composée, 0 gr. 173, et Extrait Vert de Jusquiame, 0 gr. 086			
,, Cotarnine, Chlorhydrate de, 0 gr. 049, flacons de 25 le flacon, Fr. 3.15			
‡ ,, Craie et Opium, Poudre Aromatisée de, Pharm. Brit., 0 gr. 324 ...	25	0.85	1.65
Chaque produit renferme environ: Craie, 0 gr. 065; Opium, 0 gr. 008; le tout aromatisé.			
,, Cubèbe et Belladone, Effervescent ...	...	...	2.50
Poudre de Cubèbe ... 0 gr. 032 Ext. de Belladone ... 0 gr. 0032			
,, Cubèbe, Composé de	25	0.65	1.90
Oléo-Résine de Cubèbe... 0 gr. 016 Chlorhydrate d'Ammoniaque 0 gr. 032 Glycyrrhizine ... ... 0 gr. 016			
,, Dentifrice	...	...	1.25
,, Désaltérant, Le	25	0.75	1.45
Combinaison de Bicarbonate de Soude avec de l'Acide Tartrique. L'addition de Citron et 'Saxin' lui donne un goût agréable.			
,, Didymine (Substance Orchitique), 0 gr. 30	...	...	3.15
,, Digitale, Teinture de (au 10ᵉ), *5 gtt. (0 gr. 10)	48	0.85	...
,, Digitaline Amorphe, 0 gr. 00065 ...	50	0.95	...
,, Digitaline (Cristalline), 0 gr. 00026...	50	1.90	...
‡ ,, Donovan, Solution de, *5 gtt. (0 cmc. 296)	...	...	1.90
Chaque produit représente 0 cmc. 296 de Liqueur d'Iodure de Mercure et d'Arsenic, Pharm. Brit., et renferme Iodure d'Arsenic et Iodure Mercurique, āā 0 gr. 003.			
‡ ,, Dover, Poudre de (Poudre d'Ipécacuanha Opiacée), 0 gr. 016 ...	100	0.95	...
Chaque produit renferme Opium et Ipécacuanha, āā 0 gr. 0016.			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles, 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — *'Tabloid'*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Dover, Poudre de (Poudre d'Ipécacuanha Opiacée), 0 gr. 25 ...	25	0.65	1.45
Chaque produit renferme Opium et Ipécacuanha, ãã 0 gr. 025			
,, Easton, Sirop d' (Phosphate de Fer avec Quinine et Strychnine), 2 gr. 60, *dragéifié*	25	0.75	1.65
,, Easton, Sirop d', 5 gr. 20, *dragéifié*...	25	1.05	2.50
Représente les quantités de Fer (à l'état ferrique), Quinine et Strychnine des doses correspondantes du Sirop de la Pharm. Brit.			
,, Effervescents, Produits—			
(*Voir* Caféine, Citrate de, *page* 270; Carlsbad, Sel de, *page* 271; Cubèbe et Belladone, *page* 274; Kissingen, Sel de, *page* 282; Lithine, Citrate de, *page* 282; Lithine, Citrate de, et Sulfate de Soude, *page* 282; Magnésie, Citrate de, *page* 283; Magnésie, Sulfate de, *page* 283; Pipérazine, *page* 289; Quinine, Sulfate Neutre de, et Citrate de Potasse, *page* 293; Seltz, Sel de, *page* 295; Soude, Phosphate de, *page* 296; Soude, Salicylate de, *page* 296; Soude, Sulfate de, *page* 296; Trois Bromures, *page* 298; Vichy, Sel de, *page* 299)			
,, Élatérine, 0 gr. 0016	25	0.95	...
,, Encre	...	...	2.30
(*Voir aussi* Encre 'Soloid,' *page* 256)			
,, 'Epinine,' Composé d'	25	0.85	2.50
(Marque de Fabrique)			
'Epinine' ... ... 0 gr. 000065 Chlorhydrate d'Héroïne 0 gr. 00065 Poudre d'Ipécacuanha ... 0 gr. 0013 Acide Benzoïque ... 0 gr. 0016 Essence de Gaulthérie ... *0 gtt. 08 (0 cmc. 002)			
,, Ergotine (Ext. d'Ergot, Ph. Br.)—			
0 gr. 065, *dragéifié*	...	...	1.90
0 gr. 25 ,, ...	25	1.55	4.65

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' (*Marque de Fabrique*)—	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,, Ergotine et Strychnine, *dragéifié* ...	...	...	4.85
Ergotine (Extrait d'Ergot, Pharm. Brit.) ... 0 gr. 194 Sulfate de Strychnine ... 0 gr. 0022			
,, Érythrol, Tétranitrate d' (Tétranitrine)—			
0 gr. 016, tubes de 25 le tube Fr. 1.65			
0 gr. 032	25	3.15	...
0 gr. 065	12	2.75	...
,, Essence de Santal (*voir* Santal, *page* 294)			
,, Essence de Térébenthine rectifiée (*voir* Térébenthine, *page* 297)			
,, Euquinine, 0 gr. 324	25	3.15	11.35
,, Évonymine (Ext. Sec d'Évonymus, Pharm. Brit.), 0 gr. 008... ...	50	0.85	...
,, Évonymine (Ext. Sec d'Évonymus, Pharm. Brit.), 0 gr. 032... ...	50	0.95	...
,, Exalgine, 0 gr. 13	...	...	3.15
,, Fer et d'Arsenic, Composé de, *dragéifié ou non*	...	...	2.10
Hypophosphite de Fer ... 0 gr. 13 Sulfate de Quinine Basique 0 gr. 065 Acide Arsénieux ... 0 gr. 0013 Sulfate de Strychnine ... 0 gr. 0013			
,, Fer, Arsenic et Digitaline	25	0.85	2.10
Phosphate de fer soluble 0 gr. 194 Acide Arsénieux ... 0 gr. 00065 Digitaline amorphe ... 0 gr. 00065			
,, Fer et Arsenic, Perchlorure de ...	...	...	1.45
Teinture de Perchlorure de Fer ... *22 gtt. (0 cmc. 592) Acide Arsénieux ... 0 gr. 0022			
,, Fer, Composé de Citrate de, *dragéifié*	25	1.05	2.75
Citrate de Fer Ammoniacal 0 gr. 194 Sulfate de Quinine ... 0 gr. 065 Acide Arsénieux ... 0 gr. 00108			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,, Fer, Glycérophosphate de, 0 gr. 194	25	1.15	2.75
,, Fer, Perchlorure de, *22 gtt. (0 cmc. 592)	...	...	1.45
Un produit représente la quantité de Chlorure ferrique contenue dans 0 cmc. 592 de Teinture de Perchlorure de Fer, Pharm. Brit. Ce produit contient, comme véhicule, un peu de Chlorhydrate d'Ammoniaque.			
,, Fer, Phosphate de, avec Quinine et Strychnine *(voir* Easton, Sirop d', *page* 275*)*			
,, Fer, Pilule de *(voir* Blaud [Pil. Fer.] *et combinaisons*, *page* 269*)*			
,, Fer et de Quinine, Citrate de, Pharm. Brit., 0 gr. 20, *dragéifié*	25	0.95	2.10
,, Fer Réduit, 0 gr. 13	...	...	1.25
,, **Fer Réduit, Composé de**	25	0.75	1.90
Fer Réduit ... ... 0 gr. 13 Ext. de Jusquiame ... 0 gr. 065 Ext. de Noix Vomique ... 0 gr. 032 Huile de Carvi ... *0 gtt. 6 (0 cmc. 015)			
,, **Fer Réduit et de Rhubarbe, Composé de**	25	0.75	1.90
Fer Réduit ... ... 0 gr. 13 Ext. de Jusquiame ... 0 gr. 065 Ext. de Noix Vomique ... 0 gr. 032 Pilule de Rhubarbe Composée ... ... 0 gr. 065 Huile de Carvi ... *0 gtt. 6 (0 cmc. 015)			
,, Fer, Saccharure de Carbonate de, 0 gr. 324	...	...	1.65
,, Fer et de Strychnine, Phosphates de, *dragéifié*	25	0.85	2.10
Phosphate de Fer soluble 0 gr. 065 Phosphate de Strychnine 0 gr. 002			
,, Fer, Sulfate Déshydraté de, 0 gr. 194	...	...	1.45
,, Fer, Valérianate de, 0 gr. 065, *dragéifié*	...	...	1.90

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — *Tabloid*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Ferrugineux *(voir* Blaud [Pil. Fer.] *et combinaisons, page* 269*)*			
,, Fiel de Bœuf purifié, 0 gr. 259, *kératinisé*	...	...	2.75
,, Fiel de Porc purifié, 0 gr. 259, *kératinisé*	...	...	2.75
Forced March' *(voir* Cola, Composé de, *page* 273*)*			
,, Gaïacol, Camphorate de, 0 gr. 50 ...	25	3.75	...
‡ ,, Gaïacol, Carbonate de, 0 gr. 30 ...	25	1.15	3.45
,, Gaïac et de Quinine, Composé de Résine de Gaïac ... 0 gr. 13 Soufre ... ... 0 gr. 13 Salicylate de Quinine ... 0 gr. 032	...	...	2.75
,, Gaïac, Résine de, 0 gr. 324 ...	25	0.85	2.10
,, Gaïac et Soufre	25	0.85	2.10
Résine de Gaïac ... 0 gr. 194 Soufre Précipité ... 0 gr. 194			
,, Galbanum, Composé de (Asa fœtida, Composé d') (Pil. Pharm. Brit.), 0 gr. 259	...	...	1.45
Chaque produit renferme environ: Asa fœtida, Galbanum et Myrrhe, āā 0 gr. 074.			
‡ ,, Gelsémium, Teinture de, Pharm. Brit., *12 gtt. 5 (0 cmc. 296)...	48	0.85	1.25
,, Genièvre, Huile Volatile de (Capsule), *7 gtt. (0 cmc. 178), boîtes de 50 la boîte, Fr. 2.75			
,, Gentiane et de Soude, Composé de (Mist. Gent. Alc.)...		...	1.45
Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 194 {Carbonate d'Ammoniaque = Alcoolat Ammoniacal Composé *8 gtt. (0 cmc. 178) Infusion Composée de Gentiane ... ... 8 gr. 9			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid' — *suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,, **'Gingament'** *(Marque de Fabrique)* (Composé neutralisant)	25	0.55	1.05
Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 324 Bicarbonate d'Ammoniaque ... ... 0 gr. 0054 Oléo-résine de Gingembre, Saccharine, Essence de Menthe Poivrée ... ... āā *q.s.*			
,, Gingembre, Essence de (Teinture de Gingembre concentrée, Pharm. Brit. 1885), *11 gtt. 5 (0 cmc. 296)	48	0.85	1.25
,, Gingembre, Essence de (Teinture de Gingembre concentrée, Pharm. Brit. 1885), *23 gtt. (0 cmc. 592)	...	...	1.25
,, **Glycérophosphates, Composé de,** 2 gr. 60, *dragéifié*	25	1.25	3.75
Renferme un mélange de Glycérophosphates de Chaux, de Soude, de Potasse, de Magnésie et de Fer uni au Glycérophosphate de Strychnine (0 gr. 00009), à la Pepsine, la Diastase et la Cola, équivalant à 2 gr. 60 de Sirop de Glycérophosphates.			
,, Gomme Rouge	25	0.65	1.55
,, Goudron, 0 gr. 065	50	0.75	1.15
,, Goudron et Codéine	25	1.05	3.15
Goudron liquide ... 0 gr. 065 Codéine ... ... 0 gr. 008			
,, Gregory, Poudre de (Poudre Composée de Rhubarbe), 0 gr. 324, *dragéifié ou non*	25	0.65	1.25
Chaque produit renferme: Rhubarbe, 0 gr. 072; Magnésie pesante, 0 gr. 216; et Gingembre, 0 gr. 036.			
,, 'Hemisine' *(Marque de Fabrique)* 0 gr. 0003, le tube de 12, Fr. 1.25 0 gr. 001 ,, ,, 12, Fr. 1.90 *(Voir aussi page 224)*			

* Compte-gouttes normal international. Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — *Tabloid*;

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid' — *suite*

'TABLOID' (*Marque de Fabrique*)	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,, Hémoglobine, 0 gr. 324, *dragéifié* ...	...	...	2.50
‡ ,, Héroïne, Chlorhydrate d', 0 gr. 0025	25	0.75	1.65
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 0065	...	...	2.30
,, Huile de Ricin (*voir* Ricin, *page* 294)			
,, Hydrastine, Chlorhydrate d', 0 gr. 016	25	2.95	8.80
,, **Hydrastine, Composé d'**, *dragéifié ou non*	25	2.50	9.45
Chlorhydrate d'Hydrastine 0 gr. 016 Ext. d'Ergot (Ergotine), Ph.B. ... ... 0 gr. 032 Tannate de Cannabine ... 0 gr. 032			
,, **Hydrastine avec Chlorhydrate de Cotarnine, Composé d'**, *dragéifié ou non*	25	3.35	10.10
Chlorhydrate d'Hydrastine 0 gr. 016 Ext. d'Ergot (Ergotine), Ph. B. ... ... 0 gr. 032 Tannate de Cannabine ... 0 gr. 032 Chlorhydrate de Cotarnine 0 gr. 016			
,, Hydrastis Canadensis (Extrait fluide), *gtt. 10	25	0.85	...
,, Hyoscine, Bromhydrate d', 0 gr. 0003	...	...	2.50
,, Hypodermiques, Produits (*voir p.* 228)			
‡ ,, **Hypophosphites, Composé d'**, 0 gr. 10, *dragéifié*	25	0.75	1.65
Contient les Hypophosphites de Chaux, de Potasse, de Soude, de Manganèse, de Fer et de Quinine, plus 0 gr. 0005 d'Hypophosphite de Strychnine; il représente une demi-cuillerée à café de Sirop-type Composé d'Hypophosphites.			
‡ ,, Hypophosphites, Composé d', 0 gr. 20, *dragéifié*	25	1.05	2.50
Correspond à une cuillerée à café de Sirop-type Composé d'Hypophosphites; il contient 0 gr. 001 d'Hypophosphite de Strychnine.			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,, Hypophosphites, Composé d', et Créosote	...	...	3.15
Contient: Créosote, *2 gtt. (0 cmc. 059) et 0 gr. 194 du mélange des Hypophosphites de Chaux, de Soude, de Potasse, de Manganèse, de Fer et de Quinine et 0 gr. 001 d'Hypophosphite de Strychnine (équivalant à une cuillerée à café de Sirop-type Composé d'Hypophosphites).			
,, **Hypophyse**, 0 gr. 13	...	...	7.90
‡ ,, Ichthyol, 0 gr. 10, *kératinisé, ou bien kératinisé et ensuite dragéifié* ...	25	0.95	2.85
,, Iodure de Mercure et de Potassium *(désigné auparavant sous le nom* Iodic-Hydrarg.*) (voir* Mercure et de Potassium, Iodure de, *page* 285*)*			
,, Ipécacuanha, dépourvu des principes émétiques, 0 gr. 324	...	...	3.35
,, Ipécacuanha et Opium *(voir* Dover*)*			
‡ ,, Ipécacuanha avec Scille (Pil. Pharm. Brit.), 0 gr. 259, *dragéifié ou non*	...	...	1.45
Chaque produit renferme approximativement: Ipécacuanha et Opium, āā 0 gr. 013; Poudre de Scille et Poudre de Gomme Ammoniaque, āā 0 gr. 043.			
‡ ,, Ipécacuanha, Poudre d', 0 gr. 0065...	100	0.85	...
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 25 ...	...	...	2.10
,, ,, ,, 0 gr. 324 ...	...	...	2.30
,, Ipécacuanha et Tartre Stibié, āā 0 gr. 005	25	0.65	...
,, ,, ,, āā 0 gr. 00065	...	...	0.85
,, Ipécacuanha, Vin d', Pharm. Brit. *9 gtt. 5 (0 cmc. 296)	50	0.95	1.45
,, Iridine, Composé de	25	1.15	3.45
Iridine ... ... 0 gr. 13 Ext. Vert de Jusquiame 0 gr. 032 Pil. de Composé de Rhubarbe ... ... 0 gr. 097			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Jalap, 0 gr. 324	...	...	1.25
,, Jusquiame, Teinture de, Pharm. Brit., *26 gtt. (0 cmc. 592) ...	36	0.85	1.25
,, Kino, Poudre Composée de, Pharm. Brit., 0 gr. 324	...	...	1.65
Chaque produit renferme: Kino, 0 gr. 243; Opium, 0 gr. 016; et Cannelle, 0 gr. 065.			
,, Kissingen, Sel de *(Effervescent, Artificiel)*, tubes de 25, le tube, Fr. 0.95			
,, Kola *(voir* Cola, *page* 273*)*			
,, Kramérie *(voir* Ratanhia, *page* 293*)*			
,, Laudanum *(voir* Opium, Teinture d', *page* 286*)*			
,, **Laxatif Végétal,** *dragéifié ou non*...	25	0.75	1.55
Ext. de Coloquinte Comp. 0 gr. 065 Ext. de Jalap ... ... 0 gr. 032 Résine de Podophyllum 0 gr. 016 Leptandrine ... ... 0 gr. 032 Ext. Vert de Jusquiame 0 gr. 016 Ext. de Taraxacum ... 0 gr. 016 Essence de Menthe Poivrée *q.s.*			
‡ ,, Lithine, Carbonate de, 0 gr. 15 ...	...	...	1.65
‡ ,, **Lithine, Citrate de,** 0 gr. 25, *Effervescent*	25	1.05	3.15
‡ ,, **Lithine, Citrate Effervescent de,** Pharm. Brit., 3 gr. 89, tubes de 25 ... le tube, Fr. 1.25			
,, Lithine, Citrate de, et Sulfate de Soude, *Effervescent*, tubes de 25 le tube, Fr. 1.65			
Citrate de Lithine ... 0 gr. 324 Sulfate de Soude ... 1 gr. 944			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Lithine, Composé de Benzoate de, *dragéifié ou non*	...	...	3.45
Benzoate de Lithine ... 0 gr. 194 Soufre Précipité ... 0 gr. 13 Salicylate de Quinine ... 0 gr. 022			
Livingstone Rouser *(voir* Quinine et de Rhubarbe, Composé de, *page* 292*)*			
,, **'Lodal'** *(Marque de Fabrique)* (Chlorure de 6 : 7-Diméthoxy-2-méthyle-3 : 4-dihydro-*iso*-quinolinium), 0 gr. 065, *dragéifié* ...	25	2.10	6.30
,, Magenta d'Aniline, 1 gr. 944, tubes de 12 ... le tube, Fr. 1.45			
,, Magnésie, Citrate de *(Véritable)*, Effervescent, 3 gr. 89, tubes de 25 ... le tube, Fr. 1.25			
,, Magnésie, Composé de Carbonate de,	25	0.75	1.65
Carbonate de Magnésie... 0 gr. 194 Bicarbonate de Potasse... 0 gr. 194 Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 194			
,, **Magnésie, Composé de Sulfate de, Effervescent,** tubes de 25 le tube, Fr. 1.25			
Sulfate de Magnésie ... 0 gr. 972 Sulfate de Soude ... 0 gr. 972 Carbonate de Magnésie 0 gr. 324 Liqueur de Gingembre *6 gtt. 9 (0 cmc. 208)			
,, Magnésie, Sulfate de, Effervescent, (Pharm. Brit.), 3 gr. 89, tubes de 25 ... le tube, Fr. 1.25			
Chaque produit représente 1 gr. 944 de Sulfate de Magnésie.			
,, Magnésie, Sulfite de, 0 gr. 324 ...	...	...	2.10
,, **'Mamos'** *(Marque de Fabrique) (portant autrefois le nom de* Glande Mammaire 'Tabloid'*)*, 0 gr. 324	...	...	3.80

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Manganèse, Citrate de *(soluble)*, 0 gr. 194	25	0.85	...
,, ,, ,, ,, 0 gr. 324	25	1.05	...
,, **Manganèse et de Fer, Citrate de** *(soluble)*, 0 gr. 194, *dragéifié* ...	25	0.85	2.50
,, Manganèse et de Fer, Citrate de *(soluble)*, 0 gr. 324, *dragéifié* ...	25	1.05	3.15
‡ ,, Manganèse, Peroxyde de, 0 gr. 13...	25	0.75	1.55
,, Mélange d'Herbes à fumer, 3 gr. 24, boîtes de 16 la boîte, Fr. 1.25			
,, Menthol, 0 gr. 016, flacons de 40 le flacon, Fr. 0.75	...	...	1.45
,, **Menthol, Composé de**	...	...	1.45
Menthol ... ... 0 gr. 032 Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 194 Saccharine ... ... 0 gr. 011			
‡‡ ,, Mercure, Bichlorure de (Sublimé Corrosif), 0 gr. 00065	100	0.85	...
‡‡ ,, ,, ,, ,, 0 gr. 004	100	0.85	...
,, ,, ,, ,, 0 gr. 01	100	0.95	...
,, Mercure, Bichlorure de, 0 gr. 002, avec Iodure de Potassium, 0 gr. 162	...	...	2.10
,, Mercure, Bichlorure de, 0 gr. 004, avec Iodure de Potassium, 0 gr. 324	...	...	3.35
‡‡ ,, Mercure, Bi-Iodure Rouge de, 0 gr. 004	50	0.85	...
‡‡ ,, ,, ,, ,, 0 gr. 01	100	1.25	...
,, Mercure avec Coloquinte et Jusquiame *(voir* Pilule Bleue avec Coloquinte et Jusquiame, *page* 288*)*			
,, Mercure à la Craie *(voir* Poudre Grise *et ses combinaisons, page* 290*)*			
,, Mercure Doux *(voir* Calomel, *page* 270*)*			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — *'Tabloid'*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, **Mercure, Iodure Jaune de,** 0 gr. 008	25	0.65	1.45
,, ,, ,, ,, 0 gr. 025	100	1.90	...
,, Mercure et de Potassium, Iodure de *(désigné auparavant sous le nom de* Iodic-Hydrarg.*)*, 0 gr. 011	...	...	0.95
,, Mercure, Proto-Chlorure et combinaisons *(voir* Calomel, *pages* 270–271*)*			
,, Mercure, Proto-Iodure Vert de, 0 gr. 008	50	0.85	...
,, **Mistura Alba**	...	...	2.10
Carbonate de Magnésie pesant ... ... 0 gr. 162 Sulfate de Magnésie ... 0 gr. 972 Essence de Menthe Poivrée *0 gtt. 08 (0 cmc. 002)			
,, **Mixture Astringente** *(selon la formule du* "Board of Health" [Commission Sanitaire], Londres)	...	...	3.15
Poudre aromatique de Craie (Pharm. Brit.) ... 0 gr. 292 Poudre pour faire du Mélange de Craie ... 1 gr. 296 Bicarb. d'Ammoniaque ... 0 gr. 032 Teinture de Gambir *41 gtt. 5 (0 cmc. 888) Teinture Composée de Cardamome ... *24 gtt. (0 cmc. 533) Teinture d'Opium *3 gtt. 5 (0 cmc. 089) Essence de Cannelle *0 gtt. 3 (0 cmc. 007)			
,, Moelle Épinière, 0 gr. 162	...	...	4.20
,, Moelle d'Os, 0 gr. 324 (Capsule), boîtes de 50 la boîte, Fr. 2.50			
,, Morphine, Chlorhydrate de, 0 gr. 01	100	1.90	...
,, Morphine et Émétine, flacons de 50 le flacon, Fr. 1.55 Sulfate de Morphine ... 0 gr. 0016 Bromhydrate d'Émétine 0 gr. 0008			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire a marque en toutes lettres, ainsi : — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Morphine, Strychnine et Belladone...	25	0.85	2.50
Sulfate de Morphine ... 0 gr. 0054 Sulfate de Strychnine ... 0 gr. 00108 Ext. de Belladone ... 0 gr. 0032			
‡ ,, Morphine, Sulfate de, 0 gr. 005 ...	100	1.65	...
,, ,, ,, 0 gr. 008 ...	50	1.25	...
‡ ,, ,, ,, 0 gr. 01 ...	100	1.90	...
,, Mucine, Composé de...	25	2.30	7.00
Mucine ... ... 0 gr. 324 Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 324			
(Voir aussi Mucine 'Elixoid,' *page* 217, *et* Mucine en paillettes, *page* 236*)*			
Nasal *(voir* Produits 'Soloid,' *page* 258*)*			
,, **Nitroglycérine** *(voir* Trinitrine*)*			
,, **Noix Vomique, Composé de,** *dragéifié*	25	0.85	2.10
Ext. de Noix Vomique, Aloïne, Sulfate de Fer, Poudre de Myrrhe, Poudre de Savon ... aa 0 gr. 032			
,, Noix Vomique, Teinture de (au 10c). *5 gtt. (0 gr. 10)	48	0.85	...
Chaque produit contient 0 gr. 0001 de Strychnine.			
,, Nucléine, 0 gr. 065	...	...	4.65
,, Œuf et Lait, le flacon de 25, Fr. 1.35			
‡ ,, **Opium,** 0 gr. 025	...	..	1.25
‡ ,, ,, 0 gr. 065	...	...	1.65
,, Opium, Teinture d' (au 10c), *10 gtt. (0 gr. 20)	25	0.65	1.25
Chaque produit contient 0 gr. 02 d'Opium			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — *Tabloid'*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale : Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100 : Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Orme Fauve, le flacon de 25, Fr. 0.95	...	...	3.15
Chaque produit contient 0 gr. 324 de mucilage d'écorce d'Orme Fauve.			
,, Ouate *(voir* Coton 'Tabloid,' *page* 241*)*			
,, Ovarienne, Substance *(voir* 'Varium'*)*			
,, Pancréatine *(voir* Zymine 'Pepule,' *page* 222, *et* 'Pepana' *ci-dessous)*			
,, Pansements *(voir page* 239*)*			
,, Papaïne, 0 gr. 13	25	1.70	5.00
,, Parégorique *(voir* Camphre, Teinture Composée de, *page* 271*)*			
,, **Pastilles** *(voir page* 243*)*			
,, Pelletiérine, Tannate de, 0 gr. 13 ...	25	5.00	...
,, **'Pepana'** *(Marque de Fabrique)*, *dragéifié*	25	1.05	3.45
Pepsine ... ... 0 gr. 065 Pancréatine ... ... 0 gr. 065 Lactophosphate de Chaux 0 gr. 065			
,, **Pepsine, Bismuth et Charbon** ...	25	0.95	3.15
Pepsine ... ... 0 gr. 13 Carbonate de Bismuth ... 0 gr. 13 Charbon de Bois ... 0 gr. 13			
,, Pepsine, Bismuth et Strychnine ...	25	0.95	3.45
Pepsine ... ... 0 gr. 13 Carbonate de Bismuth ... 0 gr. 194 Sulfate de Strychnine ... 0 gr. 00065			
,, Pepsine, Saccharure de, 0 gr. 324 ...	...	...	1.70
,, Pepsine et Strychnine	25	0.95	2.50
Pepsine ... ... 0 gr. 13 Sulfate de Strychnine ... 0 gr. 00065			
,, **Phénacétine** (Acet-Phénétidine), 0 gr. 065	25	0.50	0.90
,, ,, ,, 0 gr. 10	25	0.50	1.05
,, ,, ,, 0 gr. 25	25	0.55	1.25
,, ,, ,, 0 gr. 50	25	0.75	1.90

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi : — — — Tabloid!

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,, **Phénacétine, Composé N° 2 de** Phénacétine ... ... 0 gr. 25 Caféine ... ... 0 gr. 05	25	0.75	2.10
,, Phénacétine et de Quinine, Composé de Phénacétine ... ... 0 gr. 194 Bromhydrate de Quinine 0 gr. 032 Caféine ... ... 0 gr. 043	...	...	2.75
,, Phénazone *(voir* Antipyrine, *page* 267*)*			
,, Phénol et de Menthol, Composé de (Capsule), la boîte de 25, Fr. 1.90 Phénol .. ... 0 gr. 016 Menthol ... ... 0 gr. 032 Huile de Cajeput *2 gtt. 5 (0 cmc. 059)			
,, Phosphates, Composé de *(voir* "Chemical Food," *page* 272*)*			
,, Photographiques, Produits *(voir page* 245*)*			
,, Pilocarpine, Nitrate de, 0 gr. 0065	25	1.15	...
‡‡ ,, ,, ,, 0 gr. 016	25	2.30	...
La Pilocarpine est sujette à de brusques et sensibles fluctuations de prix.			
,, Pilule Blaud *(voir* Blaud [Pil. fer.]*)*			
‡‡ ,, Pilule Bleue, 0 gr. 259	25	0.65	1.25
Chacune renferme 0 gr. 086 de Mercure métallique pur.			
,, Pilule Bleue avec Coloquinte et Jusquiame	25	0.85	2.50
Pil. Bleue, Pharm. Brit. 0 gr. 13 Pil. Coloquinte et Jusquiame, Pharm. Brit. 0 gr. 259			
,, Pilule Bleue et Composé de Rhubarbe Pil. Bleue, Pharm. Brit. 0 gr. 162 Pil. de Composé de Rhubarbe, Pharm. Brit. ... 0 gr. 162	...	...	2.10
,, Pilule Bleue, Scille et Digitale, *dragéifié*	...	...	1.25
Pil. Bleue, Pharm. Brit. 0 gr. 065 Poudre de Scille ... 0 gr. 097 Poudre de Digitale ... 0 gr. 065			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100 Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)* —			
,, Pipérazine, 0 gr. 324, flacons de 25 le flacon, Fr. 5.00			
,, Pipérazine, 0 gr. 324, *Effervescent*, tubes de 12 le tube, Fr. 3.15			
,, **Pituitaire, Glande** *(voir* Hypophyse*)*			
,, Plomb avec Opium, N° 2 ... ... Chaque produit renferme: Acétate de Plomb, 0 gr. 10; Opium, 0 gr. 03.	25	0.85	...
,, Plummer, Pilule de, Pharm. Brit. *(voir* Calomel, Composé de, *page* 270*)*			
,, Podophylline, 0 gr. 016	100	0.95	...
,, Podophylline, Composé de, *recouvert de gélatine* ... ... Résine de Podophylle ... 0 gr. 011 Pil. de Composé de Rhubarbe ... ... 0 gr. 162 Ext. Vert de Jusquiame... 0 gr. 081	...	...	2.10
,, Podophylline et Évonymine ... ... Résine de Podophylle ... 0 gr. 016 Ext. Sec d'Évonymus ... 0 gr. 065	...	...	2.75
,, Potasse, Bicarbonate de, 0 gr. 30 ...	40	0.65	0.95
,, **Potasse et Borax, Chlorate de**— Boîtes en métal blanc guilloché: la boîte de 40 ... Fr. 0.50 ,, ,, 100 Fr. 0.85	40	0.55	0.85
,, Potasse, Chlorate de, et Borax, N° 2 Chaque produit renferme: Chlorate de Potassium, 0 gr. 15, et Borax, 0 gr. 10.	40	0.50	0.80
,, **Potasse avec Borax et Cocaïne, Composé de Chlorate de** *(voir* Voix, *page* 300*)*			
,, **Potasse, Chlorate de,** 0 gr. 10, la boîte de 100, Fr. 0.80	40	0.50	0.80
,, ,, ,, 0 gr. 25	25	0.55	0.85
,, ,, ,, 0 gr. 324 ... ... Boîtes en métal blanc guilloché: la boîte de 40 ... Fr. 0.50 ,, ,, 100 Fr. 0.85	40	0.55	0.85

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes. "*Tabloid, London*"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
++ ,, Potasse, Nitrate de (Sal Prunella), 0 gr. 324	...	...	0.85
++ ,, Potasse, Permanganate de, 0 gr. 065	...	...	0.75
++ ,, ,, ,, 0 gr. 13	...	...	0.85
++ ,, Potassium, Bromure de, 0 gr. 50 ...	25	0.65	1.25
++ ,, ,, ,, 1 gr.	25	0.95	...
++ ,, Potassium, Iodure de, 0 gr. 065 ...	...	...	1.45
++ ,, ,, ,, 0 gr. 10 ...	...	...	1.65
++ ,, ,, ,, 0 gr. 50 ...	...	...	3.35
,, Poudre Aromatisée *(voir* Craie et Opium, *page* 274*)*			
,, Poudre de Dover *(voir* Dover*)*			
,, **Poudre Grise** (Mercure à la Craie), 0 gr. 05	100	0.75	...
++ ,, ,, ,, ,, ,, 0 gr. 065	100	0.75	...
++ ,, ,, ,, ,, ,, 0 gr. 15	...	...	0.85
,, Poudre Grise, 0gr. 032, et Bicarbonate de Soude, 0 gr. 162	...	...	1.25
,, Poudre Grise, 0gr. 065, et Bicarbonate de Soude, 0 gr. 324	25	0.65	1.25
,, Poudre Grise et Opium	...	...	1.05
Mercure à la Craie ... 0 gr. 065 Poudre d'Opium ... 0 gr. 011			
,, Poudre Grise, Opium et Quinine ...	...	...	2.30
Mercure à la Craie ... 0 gr. 097 Extrait d'Opium ... 0 gr. 011 Sulfate de Quinine ... 0 gr. 097			
,, Poudre Grise et Poudre de Dover, āā 0 gr. 032	...	...	1.05
Chaque produit renferme : Mercure, 0 gr. 011 ; Opium et Ipécacuanha, āā 0 gr. 0032			
,, Poudre Grise et Poudre de Dover, āā 0 gr. 065	...	...	1.25
Chaque produit renferme : Mercure, 0 gr. 022 ; Opium et Ipécacuanha, āā 0 gr. 0065			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi : — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

; Qu'on peu obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale : Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100 : Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Prostatique, Glande, 0 gr. 15 ...	...	...	5.00
,, Pyramidon, 0 gr. 30...	25	3.35	...
,, ,, 0 gr. 50...	25	4.65	...
,,†Quinine, Acétyl-Salicylate de *(voir* 'Xaxaquin,' *page* 300*)*			
,,†**Quinine Ammoniacale,** *dragéifié* ...	25	1.05	2.50
Chaque produit renferme une quantité de Quinine et de Bicarbonate d'Ammoniaque correspondant à 3 cmc. 5 de la teinture de la Pharm. Brit.			
,,†Quinine, Arsenic et Strychnine ...	...	...	2.10
Sulfate de Quinine Neutre 0 gr. 065 Acide Arsénieux ... 0 gr. 0032 Strychnine ... ... 0 gr. 0022			
,,†Quinine, Belladone et Camphre ...	25	0.85	2.30
Sulfate de Quinine Basique 0 gr. 016 Ext. de Belladone ... 0 gr. 008 Camphre ... ... 0 gr. 016			
,,†Quinine, Bromhydrate Basique de, 0 gr. 065, *dragéifié ou non*	25	0.65	1.65
,, ,, ,, 0 gr. 10 *dragéifié* ...	25	0.65	1.90
,, ,, ,, 0 gr. 25 ,, ...	25	1.05	2.95
,,†Quinine et Camphre	25	0.65	1.65
Sulfate de Quinine Neutre 0 gr. 065 Camphre ... ... 0 gr. 013			
,,†Quinine, Camphre et Aconit ...	25	0.95	2.30
Sulfate de Quinine Neutre 0 gr. 016 Camphre ... ... 0 gr. 016 Teinture d'Aconit, Ph. Brit. *2 gtt. 5 (0 cmc. 059)			
,,†Quinine, Chlorhydrate Basique de, 0 gr. 065, *dragéifié ou non*	25	0.45	1.05
,, ,, ,, 0 gr. 10 ,, ,,	25	0.55	1.55
,, ,, ,, 0 gr. 25 ,, ,,	25	0.85	2.65
,, ,, ,, 0 gr. 50	25	1.55	4.75

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

† Les prix des sels de Quinine variant parfois beaucoup, il est nécessaire de changer fréquemment les prix des produits 'Tabloid' de cette substance.

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi : — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid' — *suite*

'TABLOID' (*Marque de Fabrique*)—	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,,†Quinine, Chlorhydrate Neutre de (Bichlorhydrate de Quinine) 0 gr. 10, *dragéifié ou non*	25	0.65	1.90
,, ,, ,, 0 gr. 13 ,, ,,	25	0.65	1.90
,, ,, ,, 0 gr. 194 ,, ,,	25	0.85	2.55
,, ,, ,, 0 gr. 25 ,, ,,	25	1.05	3.15
,, ,, ,, 0 gr. 324 ,, ,,	25	1.15	3.55
,, ,, ,, 0 gr. 50	25	1.90	5.90
,, ,, ,, 0 gr. 648	25	2.10	6.90
,,†Quinine, Composé de	25	0.85	2.50
Alcaloïdes du Quinquina 0 gr. 065 Antifébrine (Acétanilide) 0 gr. 078 Camphre Monobromé ... 0 gr. 013 Ipécacuanha en Poudre... 0 gr. 008 Ext. de Cascara ... 0 gr. 016			
,,†Quinine et de Rhubarbe, Composé de (*autrefois* Livingstone Rouser) ...	25	0.95	2.75
Poudre de Jalap ... 0 gr. 097 Calomel ... ... 0 gr. 065 Poudre de Rhubarbe ... 0 gr. 097 Sulfate de Quinine Neutre ... ... 0 gr. 065			
,,†Quinine, Salicylate de (*physiologiquement pur*), 0 gr. 065	25	0.85	1.90
,, ,, ,, ,, 0 gr. 194	25	1.45	4.20
,, ,, ,, ,, 0 gr. 324	25	1.90	5.70
,,†Quinine et Strychnine	25	0.65	1.65
Sulfate de Quinine Neutre ... ... 0 gr. 065 Sulfate de Strychnine ... 0 gr. 00108			
,,†Quinine, Sulfate Basique de, 0 gr. 065	36	0.40	0.85
,, ,, ,, 0 gr. 13	25	0.45	1.25
,, ,, ,, 0 gr. 194	25	0.60	1.80
,, ,, ,, 0 gr. 259	25	0.75	2.20
,, ,, ,, 0 gr. 324	25	0.90	2.75

† Les prix des sels de Quinine variant parfois beaucoup, il est nécessaire de changer fréquemment les prix des produits 'Tabloid' de cette substance.

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,,†Quinine, Sulfate Neutre de (Bisulfate de Quinine), 0 gr. 065, *dragéifié ou non*	36	0.40	0.85
,, ,, ,, 0 gr. 10 ,, ,,	25	0.45	1.25
,, ,, ,, 0 gr. 25 ,, ,,	25	0.75	2.20
,, ,, ,, 0 gr. 50	25	1.35	4.20
,,†Quinine, Sulfate Neutre de, et Citrate de Potasse, Effervescent, tubes de 25 le tube, Fr. 1.25 Sulfate de Quinine Neutre ... ... 0 gr. 065 Citrate de Potasse ... 0 gr. 972			
,,†Quinine, Valérianate de, 0 gr. 10, *dragéifié*	...	...	2.75
,, Quinquina, Teinture de, Ph. Br., 1 gr. 6	36	0.85	1.90
,, Quinquina, Teinture Composée, 1 gr. 6	25	0.85	2.10
,, Ratanhia (Kramérie) et Cocaïne ... Ext. de Ratanhia ... 0 gr. 065 Chlorhydrate de Cocaïne 0 gr. 0032	25	0.65	1.45
,, Rate, Substance de la, 0 gr. 324 ...	...	...	4.20
Réactifs *(voir* Produits 'Soloid' pour Analyses, *pages* 261 *et* 262*)*			
,, **Réglisse, Poudre Composée de,** 2 gr.	25	0.75	1.65
Chaque produit représente: Séné, 0 gr. 30; Racine de Réglisse, 0 gr. 30; Soufre sublimé, 0 gr. 15, etc.			
,, Residuum Rubrum, 0 gr. 324 ...	...	...	1.90
,, Résorcine, 0 gr. 194...	...	...	2.10
,, Rhubarbe, 0 gr. 25	25	0.75	1.90
,, ,, 0 gr. 50	25	0.95	2.85
,, Rhubarbe, Extrait de, 0 gr. 13 ...	25	0.75	1.65

† Les prix des sels de Quinine variant parfois beaucoup, il est nécessaire de changer fréquemment les prix des produits 'Tabloid' de cette substance.

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — *'Tabloid'*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

' Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid' — *suite*

	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Rhubarbe et de Gentiane, Composé de (Composé Stomachique) ... ... Inf. de Gentiane Composée 7 gr. 12 Inf. de Rhubarbe ... 3 gr. 60 Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 324 Essence de Menthe Poivrée *0 gtt. 4 (0 cmc. 01)	...	...	2.10
‡ ,, Rhubarbe, Pil. Composée de, Pharm. Brit., 0 gr. 259, *dragéifié ou non* Renferme environ: Rhubarbe, 0 gr. 065; Aloès Socotrin, 0 gr. 049; Myrrhe et Savon dur, āā 0 gr. 032; Essence de Menthe Poivrée, *0 gtt. 13 (0 cmc. 003).	25	0.65	1.25
,, Rhubarbe, Poudre Composée de *(voir* Gregory, Poudre de, *page* 279*)*			
,, **Rhubarbe et Soude N° 2,** *dragéifié* Poudre de Rhubarbe ... 0 gr. 20 Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 10 Poudre de Gingembre ... 0 gr. 03	25	0.65	1.25
,, Rhubarbe avec Soude et Magnésie ... Poudre de Rhubarbe ... 0 gr. 065 Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 097 Carbonate de Magnésie pesant ... ... 0 gr. 13 Poudre de Gingembre ... 0 gr. 032	25	0.65	1.25
,, Ricin, Huile de, 0 gr. 285 (0 cmc. 296) (Capsule), la boîte de 50, Fr. 1.90			
,,†**Saccharine,** 0 gr. 032	100	0.75	...
,, ,, le flacon de 500, Fr. 2.75	200	1.15	...
‡ ,, Salicine, 0 gr. 25	25	1.05	3.15
,, Salol, 0 gr. 50	25	0.95	2.10
,, Santal, Essence de— *11 gtt. 5 (0 cmc. 296) (Capsule), boîtes de 25, la boîte, Fr. 2.50 *22 gtt. 5 (0 cmc. 592) (Capsule), boîtes de 20, la boîte, Fr. 3.15			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

† La maison B. W. & Cie n'offre pas ces produits pour la vente en France

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid' — *suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Santonine, 0 gr. 025	100	2.20	...
,, ,, 0 gr. 065	50	2.50	4.40
,, Santonine et Calomel...	25	1.55	4.75
Santonine ... ... 0 gr. 065 Calomel ... ... 0 gr. 065			
,, *'**Saxin**' *(Marque de Fabrique)*—			
0 gr. 016, le flacon de 200, Fr. 1.15	...	...	0.75
0 gr. 016 ,, 500, Fr. 2.75			
,, **Sels d'Eaux Minérales** *(Effervescents, Artificiels)*			
(Voir Carlsbad, Kissingen, Seltz, Vichy*)*			
,, Seltz, Sel de *(Effervescent, Artificiel)*			
tubes de 25 le tube, Fr. 0.95			
,, '**Soamin**' *(Marque de Fabrique)* (Para-aminophénylarsonate de Sodium), 0 gr. 065	...	...	3.00
,, ,, ,, ,, 0 gr. 20			
flacons de 25, le flacon, Fr. 2.20			
(Voir aussi page 254*)*			
,, **Soda-Mint** *(Neutralisant)*... ...	30	0.55	1.05
Bicarbonate de Soude ... 0 gr. 259 Bicarbonate d'Ammoniaque 0 gr. 0054 Essence de Menthe Poivrée *q.s.*			
,, Sodium, Bromure de, 0 gr. 50 ...	25	0.85	...
,, ,, ,, 1 gr.	25	1.25	...
,, Sodium, Composé de Bromure de ...	...	...	1.90
Bromure de Sodium .. 0 gr. 13 Bromure de Strontium ... 0 gr. 13 Bromhydrate d'Ammoniaque ... ... 0 gr. 065 Arséniate de Soude, Anhydre, Pharm. Brit. 0 gr. 00108			
,, Soude, Bicarbonate de, 0 gr. 50 ...	25	0.75	1.35
,, Soude, Citrate de, 0 gr. 13 ...	...	...	1.90
,, ,, ,, 0 gr. 324 ...	25	0.85	2.55

* La maison B. W. & Cie n'offre pas ces produits pour la vente en France

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

† Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale : Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100 Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Soude, Phosphate de, Effervescent, Pharm. Brit., 3 gr. 89, tubes de 25 le tube, Fr. 1.25			
Chaque produit représente 1 gr. 944 de Phosphate de Soude.			
‡ ,, **Soude, Salicylate de** *(Naturel)*, 0 gr. 194	25	1.25	...
‡ ,, ,, ,, ,, ,, 0 gr. 324	25	1.90	...
‡ ,, Soude, Salicylate de *(physiologiquement pur)*, 0 gr. 50	25	1.05	2.10
‡ ,, ,, ,, ,, ,, 1 gr. ...	25	1.55	...
,, Soude, Salicylate de *(physiologiquement pur)*, 0 gr. 324 *(Effervescent)*, tubes de 25 le tube, Fr. 1.25			
,, Soude, Salicylate de, et Bicarbonate de Potasse, āā 0 gr. 324	25	1.05	2.10
,, **Soude, Composé de Sulfate de, Effervescent,** le tube de 20, Fr. 1.25			
Sulfate de Soude desséché 1 gr. 944 Bitartrate de Potasse ... 0 gr. 648 Bicarbonate de Potasse ... 0 gr. 162 Essence de Gingembre ... *q.s.* Sel Effervescent ... *q.s.*			
,, Soude, Sulfate de, Effervescent, Pharm. Brit., 3 gr. 89, tubes de 25 le tube, Fr. 1.25			
,, Soude, Sulfophénate de, 0 gr. 324 ...	...	...	2.10
‡ ,, **Soufre, Composé de**	25	0.65	1.05
Soufre Précipité ... 0 gr. 324 Bitartrate de Potasse ... 0 gr. 065			
,, Spartéine, Sulfate de, 0 gr. 065, flacons de 25 le flacon, Fr. 0.95			
,, Stomachique, Composé *(voir* Rhubarbe et de Gentiane, Composé de*)*			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi : — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Strontium, Bromure de, 0 gr. 324 ...	...	...	1.90
,, ,, ,, 0 gr. 50 ...	...	...	2.20
,, **Strophanthus, Teinture de** (au 10e), *5 gtt. (0 gr. 10)	25	0.55	1.25
Chaque produit représente 0 gr. 01 de semences de Strophanthus.			
++ ,, Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 001	100	1.25	...
++ ,, ,, ,, 0 gr. 0022	50	0.95	...
++ ,, ,, ,, 0 gr. 0032	50	0.95	...
++ ,, ,, ,, 0 gr. 0043	50	0.95	...
,, Sublimé Corrosif *(voir* Mercure, Bichlorure de, *page* 284*)*			
,, Sucre de Canne, 0 gr. 194	...	...	0.95
,, Sucre de Lait, 0 gr. 194	...	...	0.95
,, **Sulfonal,** 0 gr. 25	25	0.75	2.20
,, ,, 1 gr., le flacon de 25, Fr. 1.90	...	...	5.70
++ ,, Surrénale, Glande, 0 gr. 30	...	...	5.70
,, Tanin, 0 gr. 10	25	0.55	...
++ ,, ,, 0 gr. 162	...	...	1.25
,, Tartre stibié *(voir* Antimoine tartarisé, *page* 267*)*			
,, **Teintures (Alcoolés)**—			
(Voir Aconit, Belladone, Camphre, Cannabis Indica, Capsicum, Digitale, Gelsémium, Gingembre, Jusquiame, Noix Vomique, Opium, Quinquina, Composé de Quinquina, Strophanthus, et Warburg*)*			
,, Térébène, *11 gtt. 5 (0 cmc. 296), (Capsule), la boîte de 50, Fr. 2.10			
,, Térébenthine Rectifiée, Essence de, *25 gtt. 5 (0 cmc. 592), (Capsule), boîtes de 20 ... la boîte, Fr. 1.25			
,, Tétranitrine *(voir* Érythrol*)*			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Thé *(voir page 301)*			
,, Thymol, 0 gr. 065	25	0.75	...
,, ,, 0 gr. 13	25	1.05	...
,, ,, 0 gr. 324	...	...	3.75
,, Thymus, Glande, 0 gr. 30 ...	...	...	3.45
,, Thyroïde-Colloïde, 0 gr. 032 ...	...	...	3.45
,, Thyroïde, Glande *(Titrée)*,			
0 gr. 0065	...	...	0.65
,, ,, ,, ,, 0 gr. 016	...	...	0.75
,, ,, ,, ,, 0 gr. 05	...	...	1.15
++ ,, ,, ,, ,, 0 gr. 10	...	...	1.45
++ ,, ,, ,, ,, 0 gr. 30	...	...	2.50
Le titrage est fait par des moyens chimiques.			
,, Tonique, Composé, *dragéifié ou non*	25	0.95	2.10
Pyrophosphate de Fer ... 0 gr. 13 Sulfate de Quinine Neutre 0 gr. 065 Sulfate de Strychnine ... 0 gr. 00065			
,, Trinitrine (Nitroglycérine),			
0 gr. 00032	25	0.75	1.45
++ ,, ,, ,, 0 gr. 0005	25	0.75	1.45
++ ,, ,, ,, 0 gr. 00065	25	0.75	1.45
,, Trinitrine, Composé de	25	1.15	2.75
Trinitrine ... ... 0 gr. 00065 Capsicine ... ... 0 gr. 00032 Menthol ... ... 0 gr. 00065			
,, Trional, 0 gr. 25	25	1.25	3.75
,, ,, 1 gr.	25	3.15	10.10
,, Trois Bromures, Effervescent, tubes de 25 ... le tube, Fr. 1.55			
Bromure de Potassium ... 0 gr. 40 Bromure de Sodium ... 0 gr. 40 Bromure d'Ammonium ... 0 gr. 20 Sel Effervescent ... *q.s.*			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits 'Tabloid'—*suite*	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Trois Sirops, *79 gtt. (3 cmc. 50), *dragéifié* ... ... Sirop de Phosphate de Fer avec Quinine et Strychnine (Easton) *19 gtt. (0 cmc. 888) Sirop Composé d'Hypophosphites ... *20 gtt. 5 (0 cmc. 888) Sirop Composé de Phosphates (Parrish) *39 gtt. 5 (1 cmc. 776) Chaque produit contient 0 gr. 00076 de Strychnine.	25	1.05	2.75
,, **Trois Valérianates**, *dragéifié* ... Valérianate de Quinine... 0 gr. 065 Valérianate de Fer ... 0 gr. 065 Valérianate de Zinc ... 0 gr. 065	...	...	3.45
,, Urotropine, 0 gr. 50	25	1.90	6.30
,, **'Varium'** *(Marque de Fabrique) (portant autrefois le nom de* Substance Ovarienne*)*, 0 gr. 30	...	...	5.25
,, Végétal, Laxatif *(voir page* 282*)*			
,, Véronal, 0 gr. 50, flacons de 25 le flacon, Fr. 6.00			
,, Vert d'Aniline, 1 gr. 944, tubes de 12 le tube, Fr. 1.45			
,, Viburnum Prunifolium, Extrait de, 0 gr. 13	...	...	1.90
,, Vichy Grande Grille, Sel de *(Effervescent, Artificiel)*, tubes de 25 le tube, Fr. 0.95			
,, Vichy Grande Grille, Sel de *(Effervescent Artificiel)*, avec Citrate de Lithine, tubes de 25, le tube Fr. 0.95 Chaque produit contient 0 gr. 065 de Citrate de Lithine en addition aux constituants essentiels de l'eau de Vichy.			
,, Vin d'Ipécacuanha *(voir* Ipécacuanha, Vin d', *page* 281*)*			
,, Violet d'Aniline, 1 gr. 944, tubes de 12 ... le tube, Fr. 1.45			

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

Produits 'Tabloid'—*suite*

'TABLOID' (*Marque de Fabrique*)—	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
,, **Voix** (Composé de Cocaïne avec Chlorate de Potasse et Borax) ...	25	0.65	...
Boîtes en métal blanc guilloché— la boîte de 25 ... Fr. 0.65 ,, ,, 80 ... Fr. 1.05 le flacon de 80 ... Fr. 1.25			
,, Warburg, Teinture de, 1 gr. 50 ...	...	...	2.50
,, ,, ,, ,, 6 gr.	25	2.50	7.50
,, '**Xaxa**' (*Marque de Fabrique*) (Acide Acétyl-salicylique), 0 gr. 50 ...	25	1.05	2.50
,, 'Xaxa' et Caféine	25	0.85	2.50
'Xaxa' ... ... 0 gr. 259 Caféine ... ... 0 gr. 065			
,, 'Xaxa' et Phénacétine, āā 0 gr. 162	25	0.85	2.10
,, 'Xaxa' et Poudre de Dover, āā 0 gr. 162	25	0.85	2.10
,, 'Xaxa' et 'Xaxaquin'	25	0.85	2.50
'Xaxa' ... ... 0 gr. 194 'Xaxaquin' ... ... 0 gr. 13			
,, '**Xaxaquin**' (*Marque de Fabrique*) (Acétyl-salicylate de Quinine), 0 gr. 25	25	1.25	4.20
,, Zinc, Oxyde de, 0 gr. 13	...	...	0.95
Zinc, Sulfate de, etc. (*voir* Produits 'Soloid,' *page* 260)			
,, **Zinc, Valérianate de,** 0 gr. 13, *dragéifié*	...	...	2.50
,, Zinc, Composé de Valérianate de, *dragéifié*	...	...	2.50
Valérianate de Zinc ... 0 gr. 065 Poudre de Rhubarbe ... 0 gr. 065 Ext. de Belladone ... 0 gr. 008 Poudre de Gingembre ... 0 gr. 065			
,, Zinc, Composé de Valérianate de, et d'Asa fœtida, *dragéifié*	...	...	2.50
Valérianate de Zinc ... 0 gr. 065 Asafœtida ... ... 0 gr. 065 Myrrhe ... ... 0 gr. 032			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi : — — — — *'Tabloid,*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

Produits 'Tabloid'—*suite*

	Chaque ovale contient	Prix à Londres: Le flacon ovale: Fr.	Prix à Londres: Le flacon de 100: Fr.
'TABLOID' *(Marque de Fabrique)*—			
,, Zinc, Valérianate de, avec Fer et Arsenic, *dragéifié*		...	2.50
Valérianate de Zinc ... 0 gr. 13			
Fer Réduit ... ... 0 gr. 065			
Acide Arsénieux ... 0 gr. 00108			
Ext. de Gentiane ... 0 gr. 065			

Les Produits 'Tabloid' sont non dragéifiés à moins de spécification contraire

D'autres produits sont aussi fournis sous la marque 'Tabloid'

Teintures 'Tabloid' *(voir page 297)*

Térébène, Pur (B. W. & Cie)—		Prix à Londres Fr.
Flacons de 28 cmc.	le flacon	0.95
,, 55 cmc.	,,	1.45
,, 450 cmc.	,,	5.00

‡THÉ 'TABLOID' MARQUE DE FABRIQUE

Le Thé 'Tabloid' permet de préparer avec rapidité, de la manière la plus commode et la plus pratique, une infusion de thé d'une force constante. Il est de plus très facile à transporter, étant livré dans d'élégantes boîtes métalliques qui tiennent dans le gousset et renferment de quoi faire 50 ou 100 tasses d'infusion. C'est le thé par excellence des voyageurs, sportsmen, cyclistes, excursionistes, etc.

‡**Thé 'Tabloid'**—	Prix à Londres: la boîte Fr.
Thé pur de première qualité, d'un goût très agréable et d'un arome très fin.	
Boîtes métalliques de 100	0.65
,, ,, 200	1.25
‡**Thé 'Tabloid,' Mélange Spécial**—	
Mélange unique des meilleures variétés, donnant une infusion d'un parfum sans égal, d'une saveur délicieuse. Très apprécié des connaisseurs.	
Boîtes métalliques de 100	1.25
,, ,, 200	2.50

Trousses 'Soloid' et 'Tabloid' *(voir pages 205 à 215)*

Écrire la marque en toutes lettres, ainsi: — — — 'Tabloid'

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

TUBERCULINES marque 'WELLCOME'

Le mot 'WELLCOME' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, cette marque devrait toujours être spécifiée en faisant les commandes.

Les Tuberculines 'Wellcome,' préparées dans les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques, sont titrées avec précision et sont soumises à des essais particuliers au point de vue de leur stérilité et ce, avant leur émission.

La Nouvelle Tuberculine (W) est préparée par un procédé spécial désigné pour faciliter l'absorption, les constituants lipoïdes des bacilles ayant été retirés.

Burroughs Wellcome & Cie agissent comme agents suppléants pour les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques.

En ampoules

Endotoxiques

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—	Prix à Londres: l'ampoule Fr.
,, Nouvelle Tuberculine (W), Humaine—	
1 cmc. contenant 0 mgm. 00001 de substance bacillaire de tubercule	0.95
1 cmc. ,, 0 mgm. 0001 ,, ,,	0.95
1 cmc. ,, 0 mgm. 001 ,, ,,	0.95
*1 cmc. ,, 2 mgm. ,, ,,	10.10
,, Nouvelle Tuberculine (W), Bovine—	
1 cmc. contenant 0 mgm. 00001 de substance bacillaire de tubercule	0.95
1 cmc. ,, 0 mgm. 0001 ,, ,,	0.95
1 cmc. ,, 0 mgm. 001 ,, ,,	0.95
*1 cmc. ,, 2 mgm. ,, ,,	10.10
,, Vaccin de Tubercule, Humaine—Émulsion de Bacilles (B.E.)—	
1 cmc. contenant 0 mgm. 00001 de substance bacillaire de tubercule	1.25
1 cmc. ,, 0 mgm. 0001 ,, ,,	1.25
1 cmc. ,, 0 mgm. 001 ,, ,,	1.25
*1 cmc. ,, 5 mgm. ,, ,,	1.55

* Cette dose doit être diluée par le praticien

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

Tuberculines—*suite*

Prix à Londres : l'ampoule Fr.

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

,, Vaccin de Tubercule Bovine—Émulsion de Bacilles (P.B.E.)—

1 cmc. contenant	0 mgm. 00001 de substance bacillaire de tubercule				1.25
1 cmc.	,,	0 mgm. 0001	,,	,,	1.25
1 cmc.	,,	0 mgm. 001	,,	,,	1.25
*1 cmc.	,,	5 mgm.	,,	,,	1.55

(Voir aussi Nouvelle Tuberculine (W) marque 'Tabloid' [Hypodermique], *page* 232*)*

Exotoxiques

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

,, Vieille Tuberculine, Humaine (T)—

1 cmc. contenant	0 cmc. 0002 de Vieille Tuberculine, Humaine				1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 001	,,	,,	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 01	,,	,,	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 1	,,	,,	1.25
*1 cmc. de Vieille Tuberculine, Humaine, non diluée					1.55

,, Vieille Tuberculine, Bovine (P.T.)—

1 cmc. contenant	0 cmc. 0002 de Vieille Tuberculine, Bovine				1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 001	,,	,,	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 01	,,	,,	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 1	,,	,,	1.25
*1 cmc. de Vieille Tuberculine, Bovine, non diluée...					1.55

,, Bouillon Filtré de Tuberculine, Humaine (T.O.A.)—

1 cmc. contenant	0 cmc. 0001 de T.O.A. ...			...	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 001	,, ,, ...	...	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 01	,, ,, ...	...	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 1	,, ,, ...	...	1.25
*1 cmc. de T.O.A. non diluée			... ...	...	1.55

,, Bouillon Filtré de Tuberculine, Bovine (P.T.O.)—

1 cmc. contenant	0 cmc. 0001 de P.T.O. ...			...	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 001	,, ,, ...	...	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 01	,, ,, ...	...	1.25
1 cmc.	,,	0 cmc. 1	,, ,, ...	...	1.25
*1 cmc. de P.T.O. non diluée			... ...	...	1.55

* Cette dose doit être diluée par le praticien

Tuberculines —*suite*

Prix à Londres Fr.

Pour le Diagnostic Seulement

Tuberculine (Humaine), B. W. & Cie. Pour la Réaction Ophthalmique de Calmette.—Tubes hermétiquement scellés contenant une solution stérile dont chaque cmc. renferme 10 mgm. de Tuberculine desséchée et purifiée. Boîtes de 6 tubes la boîte 3.80

Tuberculine (Bovine), B. W. & Cie. Pour la Réaction Ophthalmique de Calmette.—Tubes hermétiquement scellés contenant une solution stérile dont chaque cmc. renferme 10 mgm. de Tuberculine desséchée et purifiée. Boîtes de 6 tubes la boîte 3.80

Tuberculine (Humaine), B. W. & Cie. Pour la Réaction Cutanée de von Pirquet.—Tubes hermétiquement scellés. Boîtes de 6 tubes ... ... la boîte 3.80

Tuberculine (Bovine), B. W. & Cie. Pour la Réaction Cutanée de von Pirquet.—Tubes hermétiquement scellés. Boîtes de 6 tubes ... ... la boîte 3.80

(*Voir aussi* Tuberculine 'Tabloid' [Ophthalmique], *page* 238)

Pour le Diagnostic Vétérinaire

'WELLCOME' (*Marque de Fabrique*)—

,, Tuberculine. Pour le diagnostic vétérinaire.—Ampoules de 4 cmc. 1.25

Pour Essais de Laboratoires

'WELLCOME' (*Marque de Fabrique*)—

,, Bacilles de Tubercule (Humaine)—*stérilisés*—pour les déterminations opsoniques ... le tube 6.30

,, Bacilles de Tubercule (Bovine) — *stérilisés* — pour les déterminations opsoniques ... le tube 6.30

,, Bacilles de Tubercule (Humaine)—*stérilisés et broyés finement*—pour les essais d'agglutination le tube 6.30

,, Bacilles de Tubercule (Bovine)—*stérilisés et broyés finement*—pour les essais d'agglutination le tube 6.30

Télégrammes et Radiotélégrammes: "*Tabloid, London*"

‡**Tympans Artificiels** (Modèle du Dr. Ward Cousins)

	Prix à Londres : la boite Fr.
Destinés au traitement de la surdité occasionnée par la perforation ou le collapsus du tympan.	
N° 1, boîtes de 36	2.50
N° 2 ,, ,, ...	2.50
N° 3 ,, ,, ...	2.50
N° 4 ,, ,, (modèle le plus grand)	2.50
Sonde et extracteur combinés pour l'insertion et l'extraction du tympan artificiel ... la pièce	1.25

'Tyramine' *(Marque de Fabrique)* (Para-hydroxy-phényléthylamine) *(voir page 233)*

Urines, Boîte 'Soloid' pour Analyses d', *(voir page 214)*

VACCINS

Marque **'WELLCOME'** de Fabrique

Le mot 'WELLCOME' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie.

Les Vaccines 'Wellcome' sont préparées dans les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques sous la surveillance directe de spécialistes possédant une expérience approfondie. Burroughs Wellcome & Cie agissent comme agents suppléants pour les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques.

En ampoules

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—	Prix à Londres : l'ampoule Fr.
,, Vaccin d'Acné, Mélangé—	
1 cmc. contenant 10 millions de bacilles d'Acné et 250 millions de Staphylocoques, mélangés ...	3.15
,, Vaccin de Bacille d'Acné—	
1 cmc. contenant 10 millions d'organismes ...	3.15
,, Vaccin de Bacille du Côlon—	
1 cmc. contenant 10 millions d'organismes... ...	3.15
1 cmc. ,, 50 millions ,, ...	3.15
,, Vaccin de Choléra—	
1 cmc. contenant 1000 millions d'organismes ...	3.15

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Vaccins 'Wellcome'—*suite*

Prix à Londres : l'ampoule Fr.

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

,, Vaccin de Coryza—

N° 1.	1 cmc. contenant 100 millions de *B. septus*	3.15
N° 2.	,, ,, 100 millions *M. catarrhalis*	3.15
N° 3.	,, ,, 100 millions de chacun ...	5.05

,, Vaccin de la Fièvre Méditerranéenne

1 cmc. contenant 100 millions d'organismes	...	3.15

,, Vaccin Gonococcique—

1 cmc. contenant 5 millions d'organismes	...	2.50
1 cmc. ,, 20 millions ,,	...	2.50
1 cmc. ,, 200 millions ,,	...	4.40
1 cmc. ,, 1000 millions ,,	...	7.55

,, Vaccin de l'Influenza—

1 cmc. contenant 10 millions de *B. Influenzæ*	...	3.80
1 cmc. ,, 50 millions ,, ,,	...	3.80

,, Vaccin Pneumococcique—

1 cmc. contenant 10 millions d'organismes	...	3.80
1 cmc. ,, 50 millions ,, ...	...	3.80

,, Vaccin Staphylococcique, Aureus—

1 cmc. contenant 200 millions d'organismes	...	1.90
1 cmc. ,, 1000 millions ,,	...	1.90

,, Vaccin Staphylococcique, Mélangé—

1 cmc. contenant 200 millions d'organismes	...	1.90
1 cmc. ,, 1000 millions ,,	...	1.90

,, Vaccin Streptococcique, Dentaire—

1 cmc. contenant 10 millions d'organismes	...	2.50
1 cmc. ,, 50 millions ,, ...	...	2.50

,, Vaccin Streptococcique, Polyvalent—

1 cmc. contenant 10 millions d'organismes	...	2.50
1 cmc. ,, 50 millions ,, ...	...	2.50

,, Vaccin Streptococcique du Rhumatisme Articulaire Aigu—

1 cmc. contenant 10 millions d'organismes	...	3.15
1 cmc. ,, 50 millions ,, ...	...	3.15

Vaccin Typhoïde—

1 cmc. contenant 500 millions d'organismes	...	3.80
1 cmc. ,, 1000 millions ,,	...	3.80
1 cmc. ,, 2000 millions ,,	...	3.80

Télégrammes et Radiotélégrammes : "Tabloid, London"

PRODUITS

Marque **'VALOID'** de Fabrique

Le mot 'VALOID' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie.

Les Produits 'Valoid' présentent des extraits de titre déterminé. Le dosage est indiqué sur les étiquettes.

		Prix à Londres Fr.
'VALOID' *(Marque de Fabrique)*—		
,, Cascara Sagrada Aromatisé ...	le flacon de 112 cmc.	3.15
,, Ergot ... ... ,,	,, 112 cmc.	3.15

D'autres préparations sont également fournies sous la marque 'Valoid.'

'Valule,' Produits marque *(voir ci-après)*

PRODUITS

Marque **'VALULE'** de Fabrique

Le mot 'VALULE' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie.

Produits pour l'administration aisée de médicaments purs en doses exactes.

		Prix à Londres Fr.
'VALULE' *(Marque de Fabrique)*—		
,, Moelle d'Os. Capsules molles: chaque capsule représente 0 gr. 324 de substance fraîche.		
Flacons de 100	le flacon	6.30

(Voir aussi Moelle d'Os 'Tabloid,' *page* 285*)*

D'autres produits sont également fournis sous la marque 'Valule.'

'Vana,' VIN TONIQUE
(Marque de Fabrique)

Flacons de 450 cmc.	le flacon	3.15

‡ **Vaporisateur 'Paroleine'**
(Marque de Fabrique)

‡ Vaporisateur Naso-Pharyngien 'Paroleine'	la pièce	5.05
‡ Son abaisse-langue	,,	3.80

(Voir aussi 'Paroleine,' *page* 242*)*

'Vaporole,' Inhalateur au Chlorhydrate d'Ammoniaque *(voir page* 310*)*

'Vaporole,' Produits marque *(voir pages suivantes)*

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

PRODUITS

Marque **'VAPOROLE'** de Fabrique

Le mot 'VAPOROLE' est une marque désignant des produits fins de la maison Burroughs Wellcome & Cie. Pour être certain d'obtenir ces produits purs et dignes de confiance, avoir soin de toujours spécifier cette marque en faisant les commandes.

Les Produits 'Vaporole' comprennent une importante série de médicaments purs, constants et effectifs, présentés de façon à en assurer la stabilité, la précision et la commodité d'administration.

Les Produits 'Vaporole' destinés à l'usage hypodermique sont fournis dans des ampoules en verre hermétiquement scellées, tandis que les produits pour inhalation sont contenus dans des capsules en verre friable entourées de coton recouvert de soie.

Pour l'Injection Hypodermique—

Fournis dans des ampoules de verre d'un modèle spécial. Chaque produit renferme le poids marqué de médicament, dissous dans l'eau ou en suspension dans un véhicule liquide, stérilisé et prêt pour l'injection hypodermique immédiate. A moins de spécification contraire, le contenu de chaque produit sera de 1 cmc.

'VAPOROLE' *(Marque de Fabrique)*—	Prix à Londres : la boite de 10 ampoules Fr.
,, Apomorphine, Chlorhydrate d', 0 gr. 005	3.15
,, Atropine, Sulfate d', 0 gr. 0005	3.15
,, Caféine, Sodio-benzoate de, 0 gr. 25	3.15
,, **Calomel**, 0 gr. 05. Suspension stérile dans un véhicule gras neutre, avec Créosote et Camphre ...	3.15
,, Camphre, 0 gr. 10. Solution dans l'huile d'olive ...	3.15
,, Cocaïne, Chlorhydrate de, 0 gr. 01	3.15
,, ,, ,, 0 gr. 02	3.15
,, Digitaline (Cristallisée), 0 gr. 0001	3.15
,, **Émétine, Chlorhydrate d'**, 0 gr. 02	3.75
,, **'Epicaine'** ('Epinine' et Chlorhydrate de Cocaïne) *(Marque de Fabrique)*	3.15

'Epinine' ... ... 0 gr. 0003
Chlorhydrate de Cocaïne 0 gr. 02
Eau ... ... ad 1 cmc.

,, **'Epinine'** *(Marque de Fabrique)* (3 : 4 dihydroxyphényléthylméthylamine), au 100e	3.15

(Voir aussi 'Epinine' et 'Epicaine,' page 220)

,, **'Ernutin'** *(Marque de Fabrique)*, 0 cmc. 60, la boîte de 6 ampoules, Fr. 3.75

'Vaporole,' Produits—*suite*

Prix à Londres : la boîte de 10 ampoules Fr.

'VAPOROLE' *(Marque de Fabrique)*—

,, Eucaïne, Lactate d', 0 gr. 01 ... ... 3.15

,, **Fer et Arsenic** 3.15
Citrate de Fer Vert ... 0 gr. 05
Arséniate de Soude ... 0 gr. 002
Eau ... ... ad 1 cmc.

,, 'Hemisine' *(Marque de Fabrique)*, au 1000e ... 3.15

,, 'Hemisine' et Chlorhydrate de Cocaïne 3.15
'Hemisine' ... ... 0 gr. 00003
Chlorhydrate de Cocaïne 0 gr. 02
Eau ... ... ad 1 cmc.

,, 'Hemisine' et Chlorhydrate d'Eucaïne 3.15
'Hemisine' ... ... 0 gr. 00016
Chlorhydrate d'Eucaïne ... 0 gr. 02
Eau ... ... ad 1 cmc.

,, **Huile Grise**, Suspension de 0 gr. 10 de Mercure dans un véhicule gras neutre 3.15

,, Hyoscine, Bromhydrate d', 0 gr. 0005 ... ... 3.15

,, **Hypophyse (Infundibulaire), Extrait d'**—
0 cmc. 50 d'extrait stérile, boîtes de 6 ampoules, la boîte Fr. 2.95
1 cmc. ,, ,, ,, ,, Fr. 5.05

,, Morphine, Chlorhydrate de, 0 gr. 01 ... ... 3.15

,, ,, ,, 0 gr. 02 ... ... 3.15

,, Quinine, Chlorhydrate Neutre (Bichlorhydrate) de, 0 gr. 20 3.15

,, ,, ,, ,, ,, 0 gr. 40 3.15

,, Strychnine, Sulfate de, 0 gr. 001 ... ... 3.15

,, ,, ,, 0 gr. 002 ... ... 3.15

Pour l'Inhalation—

Fournis dans des capsules de verre fin entourées de coton absorbant et enveloppées d'un filet de soie.

La boîte de 12 ampoules Fr.

'VAPOROLE' *(Marque de Fabrique)*—

‡‡ ,, **Ammoniaque Aromatique**, à employer comme "sels" 1.90

,, Chloroforme et Iodure d'Éthyle, Composé de, boîtes de 6 ampoules, la boîte Fr. 1.25
Chloroforme ... ... 0 gr. 88
Iodure d'Éthyle... *30 gtt. (0 cmc. 296)
Menthol ... ... 0 gr. 008

,, Nitrite d'Amyle, *8 gtt. (0 cmc. 178) 2.50

,, ,, ,, *13 gtt. (0 cmc. 296) 3.15

* Compte-gouttes normal international, Bruxelles 1902

Télégrammes et Radiotélégrammes : "*Tabloid, London*"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

'Vaporole,' Produits—*suite*

Prix à Londres : Fr.

Inhalateur marque 'Vaporole'

'VAPOROLE' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, **Inhalateur au Chlorhydrate d'Ammoniaque**

Appareil de peu de volume pour la préparation commode et prompte de vapeurs de Chlorhydrate d'Ammoniaque parfaitement neutres.

Fourni avec un approvisionnement d'Acide 'Vaporole' et d'Alcali 'Vaporole' (12 de chaque sorte)

l'appareil complet 6.30

‡ ,, **Acide,** pour emploi dans l'Inhalateur, la boîte de 12 1.55

‡ ,, **Alcali,** pour emploi dans l'Inhalateur ,, ,, 12 1.55

‡ **Accessoire nasal,** pour emploi avec l'Inhalateur, dans une boîte ... ... la pièce 0.65

D'autres produits sont également fournis sous la marque 'Vaporole.'

Viande, Suppositoires 'Enule' de *(voir* Suppositoires Rectaux 'Enule,' *page* 219*)*

'Wellcome,' Produits Chimiques marque
(voir la page suivante et le Prix-Courant spécial des Produits 'Wellcome'*)*

Prix à Londres Fr.

Wyeth, Fer Dialysé—

Flacons de 112 cmc. avec compte-gouttes le flacon 2.75

,, 450 cmc. ... ... ,, 4.40

Wyeth, Jus de Viande de Bœuf Perfectionné—

Préparation de viande de bœuf idéale pour les malades et les convalescents ... ... le flacon 3.50

Wyeth, Vin de Goudron—

Flacons de 450 cmc. ... ... le flacon 2.75

'Xaxa' (Acide Acétyl-salicylique *(voir* Produits *(Marque de Fabrique)* marque 'Tabloid,' *page* 300*)*

'Xaxaquin' (Acétyl-salicylate de Quinine) *(voir (Marque de Fabrique) page* 300*)*

Zinc *(*sels de—*voir*: marque 'Tabloid,' *pages* 238, 300 *et* 301 ; marque 'Soloid,' *page* 260 ; 'Nizin,' *page* 237, *et* 'Nizin' 'Soloid,' *page* 259*)*

'Zymine' et ses préparations *(voir* Produits *(Marque de Fabrique)* Digestifs 'Fairchild,' *page* 222*)*

Télégrammes et Radiotélégrammes: "Tabloid, London"

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens



‡ PRODUITS

MARQUE 'WELLCOME' DE FABRIQUE

LES préparations médicinales titrées sont l'essentiel de la thérapeutique scientifique. Lorsqu'il s'agit de nombreux produits galéniques dérivés de drogues brutes connues comme variant remarquablement dans leur valeur et dans leurs principes actifs, la Pharmacopée s'abstient de communiquer toute méthode pour leur titrage. Parmi ces médecines actives il y a lieu de citer l'aconite, la digitale, l'ergot et le strophanthus, qui sont inconstants et varient fortement.

Titrages requis

Lorsqu'il prescrit les préparations galéniques ordinaires de ces médecines, le médecin n'a, par conséquent, aucune garantie au point de vue de la quantité précise de principes actifs que son patient recevra. Il en est de même dans les cas de produits chimiques bien connus, et voire même employés depuis longtemps, car les essais officiels concernant leurs impuretés sont fréquemment indignes de confiance et en tous cas complètement insuffisants.

C'est donc pour ces raisons que Burroughs Wellcome & Cie ont institué les Titrages 'Wellcome,' qui sont des titrages réels et pratiques, compréhensifs dans leur portée et d'une rigoureuse valeur ; ils sont le résultat de recherches approfondies et d'expérience étendue.

A ces titrages se conforment exactement les Produits Chimiques et galéniques de la marque 'Wellcome'—tous ceux qui sont employés dans les diverses préparations des produits 'Tabloid,' 'Soloid' et 'Vaporole,' sans omettre également les autres produits émis par la maison.

C'est par des essais chimiques, ou alors, lorsque l'application de ces derniers n'a pu avoir lieu, par des méthodes physiologiques, que les Produits Galéniques de la marque 'Wellcome' sont assurés de leur uniformité.

Préparations dignes de confiance

En ce qui concerne les produits chimiques, les essais officiels pour éprouver leur pureté ont été soumis à une revision complète, et conséquemment les Produits Chimiques de la marque 'Wellcome' sont obligés de se conformer aux titrages qui, dans nombre de cas, leur assurent un plus haut degré de pureté que celui qui est atteint ordinairement.

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

Le maintient rigoureux des titrages 'Wellcome' est l'objet de recherches continuelles, et les titrages, ainsi que les méthodes employés, sont revisés autant de fois que cela est nécessaire pendant le cours des investigations.

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Aconitine *(Alcaloïde pur)*, Codex Franç.

Alcaloïde cristallisé pur extrait de l'*Aconitum Napellus*. Exempt de pseudo-aconitine et de japaconitine et ne contenant pas d'aconine non toxique, ni de benzaconine. La dose moyenne est de 0 gr. 00015 (Formulaire des États-Unis). L'aconitine étant un poison très violent, on ne doit la prescrire et l'administrer qu'avec la plus grande prudence.

Dose—De 0 gr. 0001 à 0 gr. 00015

Tubes de 0 *gr.* 25

‡ ,, Aconitine, Bromhydrate d'

C'est le sel d'aconitine le plus propre aux usages thérapeutiques, car il est très soluble dans l'eau, parfaitement stable et d'une composition invariable. Les remarques faites sur la pureté et la dose de l'alcaloïde s'appliquent à ce sel.

Dose—De 0 gr. 0001 à 0 gr. 00015

Tubes de 0 *gr.* 25

‡ ,, Aloïne, Pharm. Brit.

C'est de la barbaloïne exempte de résine. Elle est de couleur plus légère et donne une solution plus claire que l'article ordinaire du commerce.

Dose—De 0 gr. 03 à 0 gr. 13

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Aloïne Cristallisée

Barbaloïne en cristaux bien nets, exempte de résine.

Dose—De 0 gr. 03 à 0 gr. 13

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Apomorphine, Chlorhydrate d', Codex Franç.

Le point de fusion de ce sel pur est 295–300° C. au lieu de 276° C. qu'on lui attribue généralement.

Dose—Par injections hypodermiques, 0 gr. 0032 à 0 gr. 0065
Par la bouche, 0 gr. 0065 à 0 gr. 015

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

: ,, Atropine *(Alcaloïde pur)*, Codex Franç.

Alcaloïde pur, exempt d'hyoscyamine et d'hyoscine.

Dose—De 0 gr. 0003 à 0 gr. 0006

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

: ,, Atropine, Sulfate d', Codex Franç.

Préparé avec de l'atropine pure.

Dose De 0 gr. 0003 à 0 gr. 0006

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

: ,, Berbérine, Sulfate de

Sel d'un alcaloïde tiré de l'*Hydrastis canadensis.*

Dose—De 0 gr. 15 à 0 gr. 30

Flacons de 25 *gr.*

‡ ,, Bismuth, Carbonate de

Dose—De 0 gr. 30 à 1 gr. 30

Boîtes de 250 *gr. et* 500 *gr.*

‡ ,, Bismuth, Citrate de

Ce sel est presque exempt de nitrate ; il contient moins de 0,05 pour cent de Az^2O^5 et donne une solution claire avec l'ammoniaque.

Dose—De 0 gr. 15 à 0 gr. 30

Flacons de 100 *gr.*

‡ ,, Bismuth, Oxychlorure de

Ce sel, présenté sous forme de poudre très légère et très fine, convient spécialement comme préparation de toilette.

Dose—De 0 gr. 30 à 1 gr. 30

Flacons de 250 *gr. et* 500 *gr.*

‡ ,, Bismuth, Salicylate *(Physiologiquement pur)* de, Codex Franç.

Ce sel renferme l'équivalent chimique du bismuth combiné avec de l'acide salicylique pur ; sa composition est constante.

Dose—De 0 gr. 30 à 1 gr. 30

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Bismuth, Sous-gallate

Ce sel est en poudre très fine, ce qui est d'une importance toute particulière pour les applications locales.

Dose—De 0 gr. 65 à 1 gr. 30

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Bismuth, Sous-nitrate de

Dose—De 0 gr. 30 à 1 gr. 30

Boîtes de 250 *gr. et* 500 *gr.*

‡ ,, Bismuth, Tartrate *(Soluble)* de

Ce sel, très soluble dans l'eau, donne une solution claire et stable. Étant légèrement acide, il est compatible avec les préparations de pepsine.

Dose—De 0 gr. 15 à 0 gr. 30

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Bismuth et de Fer, Citrate *(Soluble)* de

Cette préparation, en paillettes d'un jaune verdâtre, est facilement soluble dans l'eau et contient du citrate de bismuth et citrate ferrique dans des proportions équivalant à d'égales parties-poids des sels anhydres respectifs.

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Bismuth et de Lithine, Citrate *(Soluble)* de

Ce sel contient de la lithine et du bismuth dans une proportion correspondant à environ 25–30 pour cent de son poids de citrate de lithine anhydre.

Dose—De 0 gr. 15 à 0 gr. 30

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Brucine

Exempte de strychnine.

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

‡ ,, Caféine, Codex Franç.

Dose—De 0 gr. 06 à 0 gr. 30

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Caféine, Citrate de

Dose—De 0 gr. 15 à 0 gr. 65.

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

,, Calomel *(voir* Mercure, Protochlorure de, *page* 322*)*

: ,, Cantharidine, Codex Franç.

Principe actif cristallin de la *Cantharis vesicatoria.*

Tubes de 1 *gr.*

: ,, Capsicine

Dose—De 0 gr. 008 à 0 gr. 015

Pots de 25 *gr.*

: ,, Chaux, Glycérophosphate de, Codex Franç.

Dose—De 0 gr. 15 à 0 gr. 30

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

: ,, Chaux, Hypophosphite de, Codex Franç.

Se dissout rapidement dans l'eau et donne une solution parfaitement claire.

Dose—De 0 gr. 20 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

: ,, Chloroforme

Préparé spécialement pour l'anesthésie et marquant un progrès important par son exactitude constante. Ce produit, résultat des recherches les plus récentes, fournit un anesthésique de la plus haute qualité, exempt d'irritants produits de décomposition.

Livré en flacons de verre ambré bouchés à l'émeri et en tubes hermétiquement scellés.

Flacons de 100 *gr.*, 500 *gr. et* 1000 *gr. ; tubes de* 30 *cmc. et* 60 *cmc.*

++ ,, Choline, Chlorhydrate de

Sel cristallin de choline, pur et blanc.

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

++ ,, Chrysarobine, Codex Franç.

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

++ ,, Cocaïne *(Alcaloïde pur)*, Codex Franç.

Flacons de 5 *gr. et* 20 *gr.*

++ ,, Cocaïne, Chlorhydrate de, Codex Franç.

Dose—De 0 gr. 013 à 0 gr. 03

Flacons de 5 *gr.*, 20 *gr. et* 50 *gr.*

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Codéine *(Alcaloïde pur)*, Codex Franç.

Dose—De 0 gr. 015 à 0 gr. 13

Flacons de 10 *gr. et* 25 *gr.*

‡ ,, Codéine, Phosphate de

Dose—De 0 gr. 015 à 0 gr. 13

Flacons de 10 *gr.*, 25 *gr. et* 50 *gr.*

‡ ,, Coniine, Chlorhydrate de

Sel pur et blanc de l'alcaloïde du *Conium maculatum.*

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

‡ ,, Cotarnine, Chlorhydrate de

Cette substance est obtenue par l'oxydation de la narcotine et est exempte d'autres produits d'oxydation qui s'y trouvent ordinairement associés.

Dose—De 0 gr. 015 à 0 gr. 05

Flacons de 5 *gr.*

‡ ,, Émétine *(Alcaloïde pur)*

C'est l'alcaloïde essentiel de l'ipécacuanha et non le mélange d'alcaloïdes connu auparavant sous le nom d'émétine.

Dose—Comme expectorant, de 0 gr. 0003 à 0 gr. 0013; comme émétique, de 0 gr. 01 à 0 gr. 02

Tubes de 1 *gr.*

‡ ,, Émétine, Bromhydrate d'

C'est le sel d'émétine le plus propre aux usages thérapeutiques.

Dose—Comme expectorant, de 0 gr. 0003 à 0 gr. 0013; comme émétique, de 0 gr. 01 à 0 gr. 02

Tubes de 1 *gr.*

‡ ,, Ergotinine, Codex Franç.

Alcaloïde cristallin pur de l'ergot.

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

‡ ,, Ergotoxine, Phosphate d'

Sel cristallin de l'alcaloïde ergotoxine, l'un des principes actifs de l'ergot.

Tubes de 0 *gr.* 10, *de* 0 *gr.* 50 *et de* 1 *gr.*

‡ ,, Ésérine (Physostigmine) *(Alcaloïde pur)*

Tubes de 0 *gr.* 25

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

,, Ésérine, Bromhydrate d' (Bromhydrate de Physostigmine)

Sel très soluble, non déliquescent et stable, et par conséquent préférable au sulfate.

Dose—De 0 gr. 001 à 0 gr. 003

Tubes de 0 *gr.* 50 *et* 1 *gr.*

,, Ésérine, Salicylate d' (Salicylate de Physostigmine)

Dose—De 0 gr. 001 à 0 gr. 003

Tubes de 0 *gr.* 50 *et* 1 *gr.*

: ,, Ésérine, Sulfate d' (Sulfate de Physostigmine)

Dose—De 0 gr. 001 à 0 gr. 003

Tubes de 0 *gr.* 50

: ,, Éther (Pur)

Préparé spécialement pour l'anesthésie. Densité 0,720 à 0,722.

Tubes de 30 *cmc. et* 60 *cmc.*

: ,, Éthyle, Chlorure d', Codex Franç.

Préparé spécialement pour l'anesthésie générale.

Boîtes de 12 *tubes hermétiquement scellés de* 3 *cmc. et* 5 *cmc.*

‡ ,, Fer ammoniacal, Citrate de, Pharm. Brit.

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 100 *gr. et* 250 *gr. et boîtes de* 500 *gr.*

‡ ,, Fer Ammoniacal, Citrate (Vert) de

Différant un peu par sa composition du sel officinal de la Pharm. Brit., il contient environ 15 pour cent de fer. Très soluble dans l'eau, il donne une solution verte bien claire.

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 50 *gr.*, 100 *gr. et* 250 *gr.*

‡ ,, Fer, Arséniate *(Soluble)* de

Ce sel est en belles paillettes verdâtres. Il contient une quantité d'arsenic sous forme d'arséniate, correspondant à 34 ou 35 pour cent d'arséniate ferrique anhydre.

Dose—De 0 gr. 001 à 0 gr. 015

Flacons de 25 *gr.*

: Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Fer, Glycérophosphate de

En belles paillettes très solubles dans l'eau chaude.

Dose—De 0 gr. 20 à 0 gr. 40

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Fer, Hypophosphite *(Soluble)* de

En belles paillettes verdâtres ; se distinguant de l'hypophosphite de fer ordinaire par sa grande solubilité dans l'eau. Il contient environ 12 pour cent de fer.

Dose—De 0 gr. 06 à 0 gr. 30

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Fer, Phosphate *(Soluble)* de

C'est un phosphate ferrique soluble, présenté sous forme de paillettes vertes très brillantes. Il correspond au produit de la Pharmacopée des États-Unis.

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Fer, Pyrophosphate *(Soluble)* de

C'est un pyrophosphate ferrique présenté sous forme de paillettes vertes. Il est soluble et correspond au produit de la Pharmacopée des États-Unis.

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Fer et Citrate de Quinine, Pharm. Brit.

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 50 *gr.*, 100 *gr. et* 250 *gr.*

‡ ,, Gaïacol, Camphorate de

Dose De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 20 *gr.*

‡ ,, Gelsémine, Chlorhydrate de (Gelsemininum hydrochlorienm cryst. Ger.)

Sel de l'alcaloïde cristallisable de *Gelsemium nitidum.*

Dose—De 0 gr. 0005 à 0 gr. 002

Tubes de 0 *gr.* 50

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

,, Hémoglobine

C'est un produit sous forme de paillettes promptement solubles dans l'eau. Il est préparé avec le plus grand soin au moyen de sang frais, et il est exempt de fibrine, de sérum, de graisse et autres constituants peu désirables.

Dose—De 0 gr. 30 à 1 gr. 30

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

,, Homatropine *(Alcaloïde pur)*

Tubes de 0 *gr.* 50

,, Homatropine, Bromhydrate d'

Sous une forme exceptionnellement pure.

Dose—De 0 gr. 0008 à 0 gr. 003

Tubes de 0 *gr.* 50

,, Homatropine, Méthylbromure d'

Bien qu'analogue, par son action physiologique, au bromhydrate d'homatropine, ce sel dérange moins le patient parce que son action est plus rapide et son effet mydriatique moins persistant.

Tubes de 0 *gr.* 50

,, Hordenine

Représente sous une forme pure l'alcaloïde contenu dans le germe des grains de malt.

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

,, Hydrastine *(Alcaloïde pur)*, Codex Franç.

Alcaloïde cristallisé, blanc, de l'*Hydrastis canadensis.*

Dose—De 0 gr. 015 à 0 gr. 06

Tubes de 1 *gr.*

,, Hydrastine, Chlorhydrate d'

Ce sel de l'alcaloïde blanc pur est très soluble dans l'eau.

Dose—De 0 gr. 015 à 0 gr. 06

Tubes de 1 *gr.*

,, Hydrastinine, Chlorhydrate d', Codex Franç.

Cette substance est un produit d'oxydation de l'alcaloïde hydrastine et est exempte d'autres bases formées simultanément qui s'y trouvent ordinairement associées.

Dose—De 0 gr. 015 à 0 gr. 03

Tubes de 1 *gr.*

; Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Hyoscine, Bromhydrate d'

L'*hyoscine* est aussi appelée *scopolamine* en raison de son origine. On a choisi ici le nom adopté par la Pharmacopée Britannique.

Dose—De 0 gr. 0003 à 0 gr. 0006

Tubes de 1 *gr.*

‡ ,, Hyoscyamine *(Alcaloïde pur)*

Hyoscyamine lévogyre, exempte d'atropine et d'hyoscine. Ce produit sera toujours fourni à moins qu'on ne spécifie l'hyoscyamine dextrogyre.

Dose—De 0 gr. 0003 à 0 gr. 0006

Tubes de 0 *gr.* 50

‡ ,, Hyoscyamine dextrogyre

Ce produit, isomérique de l'hyoscyamine lévogyre, lui est très inférieur comme activité physiologique.

Tubes de 0 *gr.* 50

‡ ,, Hyoscyamine, Sulfate d'

C'est le sel de l'hyoscyamine lévogyre pure : il est exempt du dextrogyre isomérique physiologiquement beaucoup moins actif.

Dose—De 0 gr. 0003 à 0 gr. 0006

Tubes de 0 *gr.* 50

‡ ,, Ipécacuanha dépourvu d'Émétine

C'est de l'ipécacuanha dont les principes émétiques ont été extraits. Presque exempt d'alcaloïdes.

Dose—De 0 gr. 65 à 2 gr.

Flacons de 25 *gr.*

‡ ,, Leptandrine

Résine, principe véritable du *Veronica (Leptandra) virginica* ; diffère totalement d'un grand nombre de leptandrines du commerce, qui ne sont que des extraits.

Dose—De 0 gr. 015 à 0 gr. 13

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Lithine, Benzoate de

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Lithine, Citrate de

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Lithine, Formiate de

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr.*

‡ ,, Lithine, Salicylate de *(Physiologiquement pur)*

Dose—De 0 gr. 30 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Magnésie, Glycérophosphate de

Dose—De 0 gr. 20 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Manganèse, Bioxyde *(Pur)* de, Codex Franç.

Contient approximativement 85 pour cent de bioxyde de manganèse (MnO^2).

Dose—De 0 gr. 15 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Manganèse, Citrate *(Soluble)* de

En très belles paillettes, presque incolores, facilement solubles dans l'eau, renfermant environ 12 pour cent de manganèse en combinaison organique.

Dose—De 0 gr. 20 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Manganèse, Hypophosphite de

Dose—De 0 gr. 06 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Manganèse et de Fer, Citrate *(Soluble)* de

Sel en paillettes très soluble dans l'eau ; contient environ 7 pour cent de manganèse et 14 pour cent de fer, en combinaison organique.

Dose—De 0 gr. 20 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Manganèse et de Fer, Phosphate *(Soluble)* de

En paillettes solubles à chaud ; contient environ 7 pour cent de manganèse et 14 pour cent de fer.

Dose—De 0 gr. 20 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Manganèse et de Fer avec Arsenic, Citrate *(Soluble)* de

Contient 0,5 pour cent d'acide arsénieux ; autrement identique au Citrate de Manganèse et de Fer *(Soluble)*.

Dose—De 0 gr. 20 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Manganèse et de Fer avec Quinine, Citrate *(Soluble)* de

Contient 15 pour cent de quinine, mais est autrement identique au Citrate de Manganèse et de Fer *(Soluble)*.

Dose—De 0 gr. 20 à 0 gr. 65

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Manganèse et de Fer avec Strychnine, Citrate *(Soluble)* de

Contient 1 pour cent de strychnine ; mais est autrement identique au Citrate de Manganèse et de Fer *(Soluble)*.

Dose—De 0 gr. 06 à 0 gr. 20

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Mercure, Bi-iodure de, Codex Franç. (Iodure Rouge de Mercure).

Dose—De 0 gr. 002 à 0 gr. 004

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Mercure, Oléate de

Cette préparation contient une quantité de mercure équivalant à 20 pour cent d'oxyde mercurique.

Pots de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Mercure, Oxyde Jaune de, Codex Franç. (Oxyde Mercurique Jaune).

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Mercure, Protochlorure de (Calomel)

Ce produit, préparé par sublimation, possède des caractères physiques uniformes. Il est exempt de bichlorure de mercure et autres impuretés et possède, en conséquence, une grande uniformité d'action.

Dose—De 0 gr. 03 à 0 gr. 30

Flacons de 100 *gr. et* 250 *gr.*

‡ ,, Mercure, Proto-iodure (Iodure Jaune) de, Codex Franç.

Proto-iodure de mercure véritable, d'une composition constante et déterminée. Ne contient pas de mercure libre.

Dose—De 0 gr. 008 à 0 gr. 06

Flacons de 25 *gr.*

‡ ,, Mercure et de Potassium, Iodure *(Soluble)* de

Dose—De 0 gr. 005 à 0 gr. 02

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Morphine, Acétate de

Dose—De 0 gr. 008 à 0 gr. 03

Flacons de 25 *gr.*

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

Produits marque 'Wellcome'—*suite*

'WELLCOME' *(Marque de Fabrique)*—

‡ ,, Morphine, Chlorhydrate de, Codex Franç.

Dose—De 0 gr. 008 à 0 gr. 03

Flacons de 25 *gr.*, 100 *gr. et* 250 *gr.*

‡ ,, Morphine, Sulfate de

Dose—De 0 gr. 008 à 0 gr. 03

Flacons de 5 *gr.*, 25 *gr.*, 100 *gr. et* 250 *gr.*

‡ ,, Morphine, Tartrate de, Pharm. Brit.

Strictement conforme à la Pharmacopée Britannique.

Dose—De 0 gr. 008 à 0 gr. 03

Flacons de 25 *gr. et* 100 *gr.*

‡ ,, Nicotine

Pur alcaloïde redistillé de la *Nicotiana tabacum.*

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

‡ ,, Nicotine, Tartrate de

Sel défini bien cristallisé, très soluble dans l'eau.

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

‡ ,, Pelletiérine, Tannate de

Produit amorphe renfermant les alcaloïdes totaux de l'écorce du grenadier.

Dose—De 0 gr. 13 à 0 gr. 50

Tubes de 1 *gr.*

,, Physostigmine, Sels de *(voir* Ésérine, *pages* 316–317*)*

‡ ,, Pilocarpine, Chlorhydrate de

Les sels de Pilocarpine marque 'Wellcome' sont exempts d'*iso*pilocarpine moins active et de pilocarpidine inerte. Leur pureté est garantie par le point de fusion indiqué sur chaque paquet.

Dose—De 0 gr. 003 à 0 gr. 03

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

‡ ,, Pilocarpine, Nitrate de, Codex Franç.

Ce sel est stable et est le plus propre à l'usage thérapeutique général.

Dose—De 0 gr. 003 à 0 gr. 03

Tubes de 1 *gr. et flacons de* 5 *gr.*

‡ ,, Pipérine

Alcaloïde pur et cristallisé du poivre noir.

Dose—De 0 gr. 06 à 0 gr. 30

Flacons de 25 *gr.*

‡ Qu'on peut obtenir en France par tous les pharmaciens

SERINGUE HYPODERMIQUE ASEPTIQUE TOUT EN VERRE, B. W. & CIE

Entièrement faite en verre, en quatre parties seulement, à savoir : barillet, piston, extrémité et aiguille. Facilement stérilisée. Un médecin fait le rapport suivant sur sa durabilité :

> " J'ai employé l'incluse régulièrement pendant dix années ou plus . . . . Je regrette bien qu'à la fin elle se soit brisée, ayant été laissée dans le stérilisateur qui s'est desséché."

(Voir page 225)

PRODUITS OPHTHALMIQUES

MARQUE 'TABLOID' DE FABRIQUE

Cette série renferme tous les médicaments importants qu'on emploie dans la pratique de l'ophthalmie.

Chaque produit présente une dose exacte de médicament pur et sous forme stable, lequel peut être appliqué aux yeux d'une manière directe, évitant ainsi l'inexactitude, le gaspillage et la détérioration qui se présentent dans l'emploi des solutions.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 49)

PRODUITS DE MALT

MARQUE 'KEPLER' DE FABRIQUE

Une série de produits divers sont émis, ayant comme base l'Extrait de Malt 'KEPLER.'

Ils sont tous d'une grande valeur diététique dans la convalescence lors de certains cas d'amaigrissement, comme dans la tuberculose, etc.

Ils refont de la graisse, de la chair, des muscles et des os, fortifient le cerveau, procurent force et vitalité.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 37)

VIN FERRUGINEUX A L'EXTRAIT DE VIANDE

MARQUE 'BIVO' DE FABRIQUE

Préparé par des procédés scientifiques pour suppléer aux besoins des médecins. L'un des principaux journaux de médecine Anglais, à la suite d'examens attentifs, entrepris par son propre analyste indépendant sur une série de vins divers aux extraits de viande, démontre sous forme de tabulaire que le Vin Ferrugineux à l'Extrait de Viande 'BIVO' renferme le plus grand pourcentage d'extrait de viande.

(Voir page 205)



Vue partielle. côté droit de la Salle d'Exposition Permanente de B. W. & Cie,
au No 54. Wigmore Street. Londres. W. (Angleterre)

DANS le but de mettre à la disposition de nos clients professionnels les nombreuses informations accumulees pendant bien des années de recherches et de travaux expérimentaux. nous avons ouvert dans le West End de Londres une Salle d'Exposition permanente.

Ici. faisant abstraction du côte commercial. le côté scientifique de l'œuvre de la maison est mis en relief. et nous pouvons offrir aux membres du Corps médical les conseils d'une grande expérience acquise relativement à l'équipement médical et démontrer la valeur et les avantages des produits exposés. sans aucune obligation d'achat de la part du visiteur.

A cette Salle d'Exposition.

54, WIGMORE STREET
LONDRES, W. (ANGLETERRE)

nous serons heureux de fournir à MM. les membres du Corps medical tous les renseignements que nous pourrons leur communiquer et considérer toutes les suggestions qu'ils voudront bien nous exposer.

BURROUGHS WELLCOME & Cie

Heures : 9h a.m. à 6h p.m. *Samedis : 9h a.m. à 1h p.m.*

Toutes communications doivent être adressées directement à SNOW HILL BUILDINGS, LONDRES, E.C.



QUELQUES-UNS DES BUREAUX, MAGASINS ET USINES DE BURROUGHS WELLCOME & Cie

Pour les villes de Montréal, Shanghaï et Bombay, les illustrations des édifices indiquent les emplacements où se trouvent situés les bureaux et magasins de B. W. & Cie.

RÉCOMPENSES CARACTÉRISTIQUES

DÉCERNÉES DANS LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES

A BURROUGHS WELLCOME & CIE

POUR L'EXCELLENCE SCIENTIFIQUE DES

PRODUITS DE LA MAISON

LIÉGE 1905	SIX GRANDS PRIX TROIS DIPLÔMES D'HONNEUR TROIS MÉDAILLES D'OR
MILAN 1906	TROIS GRANDS PRIX TROIS DIPLÔMES D'HONNEUR UNE MÉDAILLE D'OR
LONDRES (Franco-Britannique) 1908	SEPT GRANDS PRIX UN DIPLÔME D'HONNEUR DEUX MÉDAILLES D'OR
LONDRES (Anglo-Japonaise) 1910	CINQ GRANDS PRIX UNE MÉDAILLE D'OR
BRUXELLES 1910	HUIT GRANDS PRIX TROIS DIPLÔMES D'HONNEUR UNE MÉDAILLE D'OR
BUENOS AIRES 1910	UN GRAND PRIX
LONDRES (Festival of Empire) 1911	DEUX GRANDS PRIX UNE MÉDAILLE D'OR
TURIN 1911	HUIT GRANDS PRIX DEUX DIPLÔMES D'HONNEUR TROIS MÉDAILLES D'OR

FAISANT EN TOUT

PLUS DE 260 HAUTES RÉCOMPENSES



LABORATOIRES WELLCOME DES RECHERCHES CHIMIQUES
KING STREET. LONDRES. ANGLETERRE

Bien que ces Laboratoires effectuent un travail scientifique important pour le compte de la maison BURROUGHS WELLCOME & Cie, ils constituent une INSTITUTION autonome placée sous une direction séparée et distincte de la maison.

RÉCOMPENSES

DÉCERNÉES DANS LES

GRANDES EXPOSITIONS MONDIALES

AUX

LABORATOIRES WELLCOME DE RECHERCHES CHIMIQUES

ST.-LOUIS 1904	UN GRAND PRIX TROIS MÉDAILLES D'OR
LIÉGE 1905	UN GRAND PRIX UN DIPLÔME D'HONNEUR DEUX MÉDAILLES D'OR
MILAN 1906	UN GRAND PRIX
LONDRES (Franco-Britannique) 1908	DEUX GRANDS PRIX
LONDRES (Anglo-Japonaise) 1910	UN GRAND PRIX
BRUXELLES 1910	TROIS GRANDS PRIX UN DIPLÔME D'HONNEUR
TURIN 1911	TROIS GRANDS PRIX UN DIPLÔME D'HONNEUR

POUR

TRAVAUX CHIMIQUES ET PHARMACOGNOSTIQUES, ETC.

1 — Laboratoire pour la préparation des Vaccins. 2 — Une des [illegible]. 3 — Laboratoire de physiologie. 4 — Vue générale. 5 — Laboratoire du [illegible]. 6 — Laboratoire de chimie [illegible]. 7 — Laboratoire des Sérums.

LABORATOIRES WELLCOME DE RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES, HERNE HILL, PRÈS DE LONDRES (ANGLETERRE)

Bien que ces Laboratoires effectuent un travail scientifique important pour le compte de la maison BURROUGHS WELLCOME & Cie, ils constituent une INSTITUTION autonome placée sous une direction séparée et distincte de la maison.

RÉCOMPENSES

DÉCERNÉES DANS LES

GRANDES EXPOSITIONS MONDIALES

AUX

LABORATOIRES WELLCOME DE RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

ST.-LOUIS 1904	UN GRAND PRIX UNE MÉDAILLE D'OR
LIÉGE 1905	UN GRAND PRIX DEUX MÉDAILLES D'OR
MILAN 1906	UN GRAND PRIX
LONDRES (Franco-Britannique) 1908	DEUX GRANDS PRIX
LONDRES (Anglo-Japonaise) 1910	UN GRAND PRIX
BRUXELLES 1910	QUATRE GRANDS PRIX
TURIN 1911	TROIS GRANDS PRIX

POUR

TRAVAUX PHYSIOLOGIQUES, PREPARATIONS, ETC

PRODUITS POUR CAS URGENTS

MARQUE 'EPININE' DE FABRIQUE

L'HÉMOSTATIQUE SYNTHETIQUE

Possède l'action physiologique caractéristique de l'extrait de la glande surrénale, étant approximativement d'un dixième aussi actif que le principe actif de la glande surrénale selon examens comparatifs établis de leurs effets sur la pression sanguine d'une chatte.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 29)

EXTRAIT D'HYPOPHYSE

(Infundibulaire)

MARQUE 'VAPOROLE' DE FABRIQUE

DANS LE SHOCK OU COLLAPSUS

Produit une élévation prompte et persistante de la pression sanguine, tout en ralentissant et renforçant les battements du cœur. Lors d'un cas sévère de collapsus faisant suite à la pratique de l'hystérectomie, la malade fut remise au lit, les battements du pouls étant imperceptibles au poignet. L'Extrait d'Hypophyse 'VAPOROLE' fut injecté juste avant qu'elle quittât la table d'opération et des infusions salines furent ensuite administrées. Cette malade se rétablit dans d'excellentes conditions.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 38)

PRODUITS

MARQUE 'ERNUTIN' DE FABRIQUE

ERGOT IDEALISÉ

L'ERNUTIN' présente la 'Tyramine,' l'Ergamine,' l'Ergotoxine, en somme tous les principes thérapeutiques actifs connus de l'Ergot, en solution stable et dans un état chimiquement pur.

L'ERNUTIN' est beaucoup plus digne de confiance que les préparations ordinaires de l'Ergot. Sa supériorité est particulièrement marquée dans l'hémorrhagie *post partum*.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 35)

MARQUE 'LODAL' DE FABRIQUE

(Chlorure de 6 : 7 - Diméthoxy - 2 - méthyle - 3 : 4 - dihydro*iso*quinolinium)

UN STYPTIQUE UTÉRIN IMPORTANT

Le 'LODAL' augmente la pression sanguine et ralentit les battements du cœur.

Il occasionne une contraction tonique marquée de l'utérus, soit dans les cas ordinaires ou de grossesse.

Le 'LODAL' a donné d'excellents résultats chimiquement dans les cas d'hémorrhagie utérine douloureuse.

Le 'LODAL' marque 'TABLOID,' 0 gr. 065, est émis et dragéifié pour l'administration orale.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 46)

SÉRUMS ET VACCINS

MARQUE 'WELLCOME' DE FABRIQUE

Ces produits sont préparés dans les Laboratoires Wellcome de Recherches Physiologiques, Londres (Angleterre), suivant les méthodes les plus modernes et les plus scientifiques.

Avant leur émission, ces produits sont soumis à des épreuves rigoureuses de stérilité et peuvent dès lors être employés avec la confiance la plus absolue, sans la crainte d'aucun risque.

(Voir pages 251 et 305)

TUBERCULINES

MARQUE 'WELLCOME' DE FABRIQUE

Des séries complètes de Tuberculines sont emises, parmi lesquelles on peut particulièrement distinguer la Nouvelle Tuberculine (W) marque 'WELLCOME.' Celle-ci est obtenue par un procédé perfectionné, désigné pour rendre l'absorption plus facile par l'éloignement des constituants lipoïdes. Elle contient un certain poids défini de substance tuberculeuse bacillaire.

(Voir page 302)

SUPPOSITOIRES RECTAUX

MARQUE 'ENULE' DE FABRIQUE

Leur forme rationnelle assure une introduction facile ainsi qu'une certaine rétention. Leurs principes actifs sont exceptionnellement purs et actifs et se trouvent incorporés uniformément à la totalité de la masse.

La Glycérine marque 'ENULE' est digne d'attention, car elle renferme 95 pour cent de glycérine pure (anhydre).

(Voir Notes Thérapeutiques, page 28)

MARQUE 'PAROLEINE' DE FABRIQUE

Liquide dérivé du pétrole, pur, neutre, incolore, sans saveur ni odeur. Administré intérieurement contre la constipation, il agit comme lubrifiant de la voie alimentaire et modifie la consistance des matières fécales.

Les résultats cliniques démontrent que la 'PAROLEINE' agit utilement dans les genres de constipation dans lesquels elle se trouve indiquée.

(Voir page 242)

ANTISEPTIQUES

MARQUE 'SOLOID' DE FABRIQUE

Présentent les agents antiseptiques familiers à l'état pur et en quantités précises. Ils sont sans dangers, donnent satisfaction et sont agréables dans leur emploi. Des solutions de force définie peuvent être aisément et rapidement préparées. Par exemple, pour préparer une solution au 1000e, faire dissoudre un produit 'SOLOID' de Sublimé Corrosif de 1 gr. dans un litre d'eau.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 55)

CRÈME 'HAZELINE'

(Marque de Fabrique)

Conserve à la peau des mains douceur, souplesse et blancheur, malgré les immersions fréquentes dans les solutions aseptiques ou l'emploi de savons fortement alcalins. Les hommes qui se rasent apprécieront son effet adoucissant sur la peau du visage. Les tubes en métal compressibles sont très pratiques en voyages.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 40)

MARQUE 'NIZIN' DE FABRIQUE

SEL DE ZINC DE L'ACIDE SULFANILIQUE

Les rapports cliniques concernant la gonorrhée aiguë démontrent la supériorité du 'NIZIN' sur les autres sels de zinc qui ont été employés jusqu'à ce jour. Des injections de 0 gr. 4 à 1 gr. 20 dans 100 gr. d'eau ne sont ni irritantes ni toxiques.

Le 'NIZIN' marque 'SOLOID' présente ce sel sous une forme facilement soluble et de poids exact.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 48)

BANDAGES ET PANSEMENTS PLIÉS ET COMPRIMÉS

MARQUE 'TABLOID' DE FABRIQUE

Les Bandages et Pansements Pliés et Comprimés furent originairement introduits par Burroughs Wellcome & Cie.

En ce qui concerne la qualité du matériel employé, ainsi que la sécurité présentée contre la contamination jusqu'au moment de leur emploi, ils présentent les exigences absolues qui sont requises par la science chirurgicale moderne. Ils sont remarquablement compacts et pratiques.

Le Bandage Ajustable comprimé 'TABLOID' pour la Tête est une invention pratique simplifiant le bandage de la tête.

(Voir Notes Thérapeutiques, page 49)

1912

| JANVIER | | |

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

MEMORANDA

Plan de Londres

Souvenir du

XVIIe Congrès Médical International

Londres, 1913

Démontrant les Édifices d'un caractère particulier
pour MM. les Membres du Corps Médical
en visite à Londres

N° 1



N° 3

CLEFS DES PLANS DE LONDRES

Voir aussi les notes figurant à la page précédant le premier Plan

N° 2

N° 4



CLEFS DES
PLANS DE
LONDRES

Voir aussi les notes figurant à la page précédant le premier Plan

PLAN DE LONDRES

Le Plan de Londres qui suit est divisé en quatre sections. Pour faciliter les recherches, des clefs figurent sur les deux pages précédentes.

La Section N° 1 comprend les quartiers Ouest et Nord-Ouest de Londres.

La Section N° 2 comprend les environs du Nord et du Nord-Est, la "City" et l'"East End" de Londres au nord de la Tamise.

La Section N° 3 comprend le district du Sud-Ouest et les environs du Sud-Ouest.

La Section N° 4 comprend la "City of Westminster," le district du Sud-Est et les environs du Sud-Est.

Les Chemins de Fer sont indiqués en Noir et Blanc pointillé.

Les Jardins Publics et les espaces libres sont colorés en Vert.

Les "Tubes Railways" sont colorés en Rouge.

LISTE DES "TUBES RAILWAYS" DE LONDRES

Bakerloo Tube.—De Edgware Road par Baker Street à Piccadilly, Charing Cross et Waterloo jusqu'à Elephant and Castle.

Central London Railway.—De Liverpool Street et de la Bank, par Holborn et Oxford Street, jusqu'à Shepherd's Bush et Wood Lane.

City and South London Railway.—De Euston, par King's Cross (St.-Pancras), Moorgate Street et la Bank, jusqu'à Kennington et Clapham.

District Railway.—De Whitechapel, par Mansion House, Charing Cross, Westminster et Victoria, à Kew, Richmond, Hammersmith et Wimbledon.

Great Northern and City Tube.—De Finsbury Park à la "City."

Hampstead Tube.—De Hampstead ou de Highgate, par Euston, Oxford Street et Leicester Square, à Charing Cross.

Metropolitan Railway.—De Aldgate et de la "City," par King's Cross, à Paddington, South Kensington et Shepherd's Bush, et de Baker Street à Harrow et Ruislip.

Piccadilly Tube.—De Finsbury Park, par King's Cross et Holborn, au Strand et au "West End."

Waterloo and City Railway.—De la Bank à Waterloo.

HOSPITALS

1. Paddington Green Hospital, Paddington Green, W. ..... C 5
2. Hospital for Epilepsy and Paralysis 4, Maida Vale, W. ..... B 5
3. Samaritan Free Hospital, Marylebone Road, N.W. ... C 6
4. St. Saviour's Hospital for Ladies, 10, Osnaburgh Street, N.W. B 8



HOSPITALS

5. French Hospital, 172, Shaftesbury Ave., W.C. C 9
6. Italian Hospital, Queen's Square, W.C. ..... C 10
7. London Homœopathic Hospital, Great Ormond Street, W.C.... B 10
8. Alexandra (Orthopædic) Hospital, Queen's Square, W.C. ... B 10
9. Hospital for Sick Children, Great Ormond Street, W.C.... B 10
10. National Dental Hospital, Great Portland Street, W. .. B 8
11. St. Mark's (Fistula) Hospital, City Road, E.C. ..... A 12
12. National (Heart) Hospital, 32, Soho Square, W. . . . C 9
13. British (Lying-in) Hospital, Endell Street, W.C . C 10
14. National Hospital, Queen's Square, W.C. .. B 10
15. West End Hospital, Welbeck Street, W. ..... C 8
17. City Orthopædic Hospital, 234 Great Portland St. W. ... B 8
17. Royal National Hospital, 234, Great Portland Street, W. B 8
18. British (Skin) Hospital, Euston Road, N.W. ..... A 10
19. St. John's (Skin) Hospital, 49, Leicester Square, W.C. D 9
20. St. Paul's (Skin) Hospital, Red Lion Square, W.C. C 10
21. Western (Skin) Hospital, 44-46 Rampstead Rd W. B 9
22. St. Peter's Hospital (Stone), 27, Henrietta Street, W.C. .. D 10
23. Hospital for Diseases of Throat, Nose, and Ear, Golden Sq. W. D 8
24. London (Throat) Hospital, Great Portland Street, W. C 8
25. Metropolitan (Ear, Nose & Throat) Hospital 2 Fitzroy Sq. W. B 8
26. Municipal Infirmary, Throat and Ear, City Road, E.C. ..... A 12
27. Hospital for Women, Soho Square, W. ..... C 9
28. New Hospital for Women, Euston Road, N W B 9
29. Alexandra Society, St. Bartholomew's Hosp., E.C. C 12
30. Anatomical Soc. of Gt. Bt. & Ire. Charing Cross Hospital, W.C. D 10
31. Assoc. of Physicians & Surgeons, Cranburn Mans. Ch'n St. W.C. D 9
32. Assoc. of Phys'ns of Gt. Bt. & Ire. 40, Wimpole Street, W. ..... C 8
33 Assoc. of Public Vaccinators, 1, Mitre Court Buildings, E.C. D 11
34. Brit. Assoc. for Advancem't of Sc. Burlington House, W. ..... D 8
35. British Dental Association 19, Hanover Square, W. ..... D 8
36. British Homœopathic Society, Great Ormond Street, W.C. B 10

MEDICAL SOCIETIES, etc.

37. Brit. Medical Temperance Assoc. 124, Harley Street, W. . . . B 8
38. British Orthopædic Society, 30, New Cavendish Street, W. C 8
39. Harveian Society of London, Stafford R'ms, Tichb'rne St. W. C 6
40. Hospital Saturday Fund, 54, Gray's Inn Road, W.C. ... C 11
41. Hunterian Society, Finsbury Circus, E.C. ..... C 13
42. Imp. Cancer Research Fund, Exam. Hall, Queen's Sq. W.C. B 10
43. Imp. Vaccination League, 53, Berners Street, W. ..... C 9
44. Incorp. Institution of Hygiene, 34, Devonshire Street, W C 7
45. Incorp. Soc. of Med. Officers of Health, Up. Montague St., W.C. B 9
46. "Lancet" Relief Fund, "Lancet" 423, Strand, W.C. D 10
47. Lond. & Co. Med. Protection Soc., 32, Craven Street, W.C. D 10
48. London Dermatological Society 49, Leicester Square, W.C. . D 9
49. Medical Defence Union, Ltd., 4, Trafalgar Square, W.C. .... D 10
50. Medical Off'rs of Schools Assoc., 15, Devonshire Place, W. . . . B 7
51. Medical Society of London, 11, Chandos Street, W. ..... D 10
51. Medical Legal Society, 11, Chandos Street, W D 10
51. Medical Psychological Assoc., 11, Chandos Street, W. ..... D 10
52. Nat. Assoc., Prev. of Consumption 20, Hanover Square, W. . D 8
53. National Health Society 53, Berners Street, W. ..... C 9
54. New Lond. Dermatological Soc., 11, Dermnshire Street, W. B 8
51. Ophthalmological Soc. of U.K., 11, Chandos Street, W. ..... D 10
55. Pharmaceutical Soc. of Gt. Britain 17, Bloomsbury Square, W.C. C 10
56. Physiological Society, Gower Street, W.C. ..... B 9
57. Poor Law Medical Association, 9, Copthall Avenue, E.C. C 13
58. Röntgen Association, 13, Wimpole Street, W. C 8
59. Royal Anthropological Institute, 50, Gt. Russell Street, W.C. C 10
60. Royal Institute of Public Health, 37, Russell Square, W.C. ... C 9
61. Royal Institute of Great Britain, 21, Albemarle Street, W. .... D 8
62. Royal Society of London, Burlington House, W. ..... D 8
63. Royal Society of Medicine, 1, Wimpole Street, W. ..... C 8
51. Society for Relief of Widows and Orphans of Medical Men, 11, Chandos Street, W. ..... D 10
64. Society of Members of the R.C.S., 1, Upper Montague St., W.C. B 9

Congress Hall
XVIIth International Congress of Medicine.

Theatres shown thus
Music Halls

Divided into Half Mile squares

Scale 0 ¼ ½ Mile

Railways & Stations

Electric Railways & Stations
Interchange Stations

HOSPITALS

69. Cheyne Hospital.
Chelsea, S.W. ..... H 6

70. Belgrave Hospital,
77, Gloucester Street, S.W. ... G 8

MEDICAL SOCIETIES, etc.

71. United Services Medical Society
Grosvenor Road, S.W. ..... G 9

72. Lister Institute of Preventive Medicine
Chelsea Bridge Road, S.W. ..... G 8

HOSPITALS

73. Hospital for Diseases of the Skin, 52, Stamford Street, S.E. ..... D 11
74. General Hospital, York Road, Lambeth, S.E. ..... E 10
75. Gordon (Fistula) Hospital, Vauxhall Bridge Road, S.W. . F 8
76. Evelina Hospital, Southwark Bridge Road, S.E. .. E 12
77. Grosvenor Hospital for Women, Vincent Square, S.W. .... F 9

MEDICAL SOCIETIES, etc.

78. Pathological Society of Gt. Britain and Ireland Guy's Hospital, S.E. .... E 13
79. British Red Cross Society, 9, Victoria Street, S.W. . ..... F 9

THE

Trade Marks

'Tabloid'
AND
'Soloid'

Invented by B. W. & Co.

Are B. W. & Co. **Hall Marks**

They *mark* the work of
Burroughs Wellcome & Co.

They *mean* : "Issued by
Burroughs Wellcome & Co."

They *stand* for

24 CARAT products